





1008





T a b e l l a r i s c h e
A r z n e i m i t t e l l e h r e
für

praktische Aerzte und Wundärzte.

Von

Dr. Adolph Pachur.

Vita brevis, ars longā.

Berlin, 1824.

In der Maurerschen Buchhandlung.

Entstehen und Vergehen ist das große Gesetz der Natur — nichts
bleibt — und nichts ist unveränderlich, wie die Veränderung.

Benzenberg.

Dem


H e r r n

Dr. Christoph Wilhelm Hufeland,

Königlich Preussischem Staatsrathe, Ritter des rothen Adlerordens
dritter Klasse, wirklichem Leibarzte, Professor der Medizin an der
Universität zu Berlin, Direktor der Königlich medizinisch-chirurgi-
schen Akademie für das Militair, der Akademie der Wissenschaften
zu Berlin und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede,
u. s. w.

in tiefster Hochachtung

gewidmet.



V o r w o r t.

Das Licht der Ueberzeugung
Ist heittrer Forscher Lohn.

W o f.

Schon längst fühlte man das Bedürfniß einer kurz gefaßten Arzneimittellehre, die gleichzeitig für den Praktiker nur alles Nothwendige, und für den Anfänger unsrer Kunst alles Wissenswerthe in einer leicht aufzufindenden und faßlichen Form enthalte. Daher der Zweck dieser kleinen tabellarischen Schrift ganz dahin gerichtet ist, dem praktischen Arzt und Wundarzt ohne Weitschweifigkeit und Zeitverlust eine kurze und gleichsam hinläng-

lich genügende Uebersicht, und dem Schüler ein leichtes und bald zu übersehendes Studium der Arzneimittellehre zu gewähren. Ob es mir gelungen, einigermaßen diesen Forderungen zu entsprechen, überlasse ich dem richtigen Urtheile; und erndte ich den Beifall der Kenner, so wird dies hinlängliche Belohnung für mich seyn.

Graudenz, den 16. Juny 1823.

P a c h u r.

Einleitung.

Die Arzneimittellehre (*Materia medica*, *Pharmacologia*,) ist diejenige Lehre oder Wissenschaft, welche uns bei jeder Krankheit, bei jedem abnormen Zustande des Organismus die Mittel an die Hand giebt und uns lehrt, durch dieselben den normalen Zustand wieder hervorzurufen; diejenigen welche nun diesen Zweck erfüllen, nennen wir Heilmittel. Jedes Heilmittel trägt den Grund zur Genesung in sich, so wie die früher einwirkende Schädlichkeit der Grund der entstandenen Krankheit war. Die nächste Wirkung eines Heilmittels ist also eine wesentliche Veränderung des Organismus, wodurch die Abnormitäten gehoben und der gesunde Zustand wieder herbeigeführt wird. Nur eine wohlbedachte und also richtige Anwendung der Mittel, bestimmt den Begriff des Heilens; denn in der Hand eines Layen kann jedes heilsame Mittel zu einem Gifte umgewandelt werden; so sehen wir z. B. vom Gebrauche und einer richtigen Anwendung des Opium und des Quecksilbers die wünschenswertheften Wirkungen, so daß selbst Sydenham ausruft: „ohne Opium mag ich nicht Arzt seyn.“ Dessen ungeachtet sehen wir durch Opium und Quecksilber in den Händen der Unwissenden vieles Unglück entstehen. Ein absolutes

Heilmittel giebt es daher auch nicht, es ist immer nur relativ und wir finden nur diese Bestimmung bei ihrem richtigen Gebrauch. Hieraus erhellet, daß die Eintheilungen in Heilmittel-, Nahrungsmittel- und Giftmittel- lehre (*Materia medica*, *Materia alimentaria* et *Toxicologia*) unzweckmäßig sind; denn Gifte, so wie Nahrungsmittel, sind der Arzneimittellehre untergeordnet.

Die Nahrungsmittel sind diejenigen, welche als solche dem Organismus ähnliche Stoffe zuführen und bei der Zuführung demselben durch den Verdauungs- und Assimilationsproceß Stoffe abtreten und sich in ähnlicher Qualität beismischen. Arzneimittel hingegen sind die, welche vermöge ihrer Bestandtheile, Qualität und nach den gehörigen Einsichten gestellte Quantität, die krankhaften Organe wieder untereinander ins Gleichgewicht setzen. Eine Trennung zwischen Arznei- und Nahrungsmittel läßt sich nicht denken, indem in vielen Krankheiten auch die Nahrungsmittel als Arzneimittel dienen, so wenden wir z. B. das Isländische Moos, Roggenmehl und überhaupt öhligte, schleimigte Mittel in der Lungenschwindsucht an. Was von den Nahrungsmitteln gilt, gilt auch von den Giften; streng genommen giebt es kein absolutes Gift und wir bezeichnen nur diejenigen Mittel mit dem Namen Gift, die schon in ganz kleinen Gaben, eine auf den Organismus zerstörende Wirkung äußern und selbst oft tödtlich wirken.

Die Arzneimittellehre (*Pharmacologia*) ist daher die Lehre von der Natur der Stoffe, die auf ein körperliches Seyn zweckmäßig angewendet, Krankheiten heilt, und unzweckmäßig benutzt, dieselben erzeugen kann. Wenn die Arzneimittellehre ihren Zweck, Krankheiten zu heilen, erfüllen soll, muß sie uns mit den Eigenthümlichkeiten





und verschiedenen Bestandtheilen eines jeden einzelnen Mittels bekannt machen und sich auf Naturgeschichte, Chemie und Pharmacie stützen. Die Naturgeschichte lehrt uns die äusseren Verschiedenheiten der Körper kennen, die Chemie macht uns mit ihren Mischungen und Bestandtheilen bekannt, und die Pharmacie lehrt uns die Compositionen zubereiten und zweckmäßig einzutheilen, um die Heil- und Unheilbarkeit zu erkennen.

Die Kenntniß von den Wirkungen der Arzneimittel bei ihrer Anwendung in einzelnen Krankheiten, setzt eine gründliche Untersuchung des normalen und krankhaften Zustandes voraus, und die Einwirkung auf den Organismus wird durch die Anwendung der Mittel in Hinsicht der Mischung und Form, durch die Qualität der einzelnen Mittel, und durch die Quantität in welcher wir die Mittel reichen, bestimmt.

Von der Wirkungsart der Heilmittel.

Die Einwirkung der Mittel auf den Organismus ist erstens, mechanisch: dies geschieht nach dem Gesetze der Schwere und Cohæsion, so wirkt z. B. bei heftigen Verstopfungen des Unterleibs Quecksilber rein mechanisch; zweitens, chemisch: hier wirken die Mittel nach den Gesetzen der Wahlverwandtschaft und nach den in ihnen enthaltenen rein chemischen Bestandtheilen, so vermehren z. B. die Säuren den Oxydationsproceß im Körper; drittens, dynamisch: entweder psychisch durch den Einfluß der Einbildungskraft oder auch oft von den Gesetzen der Naturkraft abhängig, so wirken z. B. alle Agentien (*Agentia physica*), als Electricität, Galvanismus. — Die Wirkung hängt ferner von der Mitwirkung der Lebenskraft ab, die sich auf Einheit und Selbst-

ständigkeit, welche sich im Individuo ausspricht, begründet. Diese Lebenskraft deutet sich durch drei Grundfunktionen im Organismus an, als Reproduction, Irritabilität und Sensibilität, vorzüglich aber durch die Reizbarkeit und das Wirkungsvermögen, die in naher Verbindung stehn. Die Reproduction ist diejenige Funktion der Lebenskraft, welche alle in den Körper eingebrachte fremde Stoffe sucht zu realisiren und sich zuzueignen, so wie ebenfalls sich der Gattung nach sucht fortzupflanzen. Die Irritabilität ist der Inbegriff aller Reactionen, insofern ihr die Erscheinungen der Bewegung, so wie die Contractilität und Respiration angehören. Die Sensibilität ist hingegen das Vermögen nicht nur fremde Eindrücke aufzunehmen, sondern sie auch zum Bewußtseyn zu bringen und mittelst der Nervenkraft auf alle Organe zurückzuführen. Hierauf beruht nun die Receptivität, alle äussere Eindrücke aufzunehmen, und das Wirkungsvermögen, die aufgenommenen Eindrücke zu verändern. Daher stehn beide Vermögen in Wechselverhältniß, so daß wenn die Erregbarkeit erhöht, das Wirkungsvermögen verhältnißmäßig geschwächt ist und so umgekehrt.

Was die Wirkung der Mittel, ohne Rücksicht auf die Lebenskraft, betrifft, so hängt sie ab:

- 1) von der Qualität des Mittels selbst, und
- 2) von dem Verhältnisse zwischen Receptivität und Wirkungsvermögen.

Es giebt Gifte die so schnell tödten, daß augenblicklich die Erregbarkeit aufhört, ohne daß erst das Wirkungsvermögen Zeit erhält, zu reagiren, wie dies z. B. die Blausäure beweist. Was die Reizbarkeit des Körpers betrifft, so kann sie entweder zu sehr gesteigert oder zu sehr deprimirt seyn; diese Verschiedenheit kann vom





Alter abhängen, daher wir bei Kindern wegen größerer Reizbarkeit bedeutende Mittel mit der größten Vorsicht anwenden müssen. Jedoch spielt hier die Gewohnheit eine sehr wichtige Rolle, so kann man sich durch den öftern Gebrauch z. B. des Opiums, ohne Nachtheil an ein, zwei und mehrere Gran gewöhnen. Ein Engländer erzählt von einem Türken, der täglich fünf Drachmen nehmen konnte.

Hieraus ergibt sich also im Allgemeinen, daß die Wirkung eines Mittels nicht bloß von den Verhältnissen der Reizbarkeit und des Wirkungsvermögens abhängt, sondern daß auch dieselbe von der Qualität des Mittels selbst und der Qualität der besondern Einwirkungen der verschiedenen Organe bedingt werde.

Die durch ein Heilmittel im Körper hervorgebrachten Veränderungen sind sehr verschieden; entweder sind sie idiopathisch, wenn die nachfolgende Wirkung zunächst in dem Organe zum Vorschein kommt, welches zuerst afficirt wurde; oder sympathisch, wo die Wirkung durch Mitleidenschaft der Nerven den übrigen Organen mitgetheilt wird. Folgt die Veränderung unmittelbar auf die Wirkung der Mittel, so nennen wir es einen nächsten Effect (*Effectus proximus*); wird sie jedoch erst nach einiger Zeit hervorgebracht, so nennen wir es einen entfernten Effect (*Effectus remotus*). Wenn die Wirkung auf alle Organe gleichmäßig und gleichzeitig geschieht, so ist es ein allgemeiner Effect (*Effectus communis*); erfolgt sie hingegen nur auf einzelne Organe ausschließlich, so nennen wir es einen besondern oder specifischen Effect (*Effectus specificus*); so z. B. wirken die Canthariden specifisch auf die Nieren; der Borax auf die Ge-

bärmutter; das Quecksilber auf die Speicheldrüsen u. s. w. Bei den specifischen Wirkungen berücksichtige man aber immer die Idiosynkrasie, die von einer eigenthümlichen Reizbarkeit der Nerven abhängt und wo die Wirkung nicht die der Qualität des Mittels entsprechend ist.

Außerdem ist die Wirkung eines Mittels entweder einfach oder zusammengesetzt, daher auch kein Mittel im Körper rein chemisch, sondern chemisch animalisch wirkt, wie dies z. B. ein Mittel in den Magen gebracht, nicht tödtlich, hingegen in die Venen gespritzt, tödtlich wird, beweist. Ältere Aerzte, wie Sylvius, hielten die Wirkung der Mittel für rein chemisch; wir hingegen erklären sie uns nach den verschiedenen Grundstoffen. Doch ist hier die Frage, wie wirken jene Mittel, welche sich gar nicht chemisch zerlegen lassen und dabei doch die wichtigsten Einflüsse auf unsern Körper haben? — wie z. B. der Galvanismus, die Electricität, u. s. w.

Was eine besondere Wirkung der Mittel anbetrifft, so kann sie:

- 1) auf die Lebensthätigkeit des sensibeln und irritabeln Systems,
- 2) auf die Lebensthätigkeit der Reproduction, und
- 3) auf die im Organismus vorhandenen fremden Körper erfolgen.

1. Auf die Lebensthätigkeit der sensibeln und irritabeln Sphäre wirken sie erhöhend, vermehrend, geben dem Körper einen belebenden, stärkenden Stoff ab und werden roborirende oder stärkende Mittel (Roborantia) genannt; erhöhen sie bloß ohne zu stärken, heißen sie reizende Mittel (Irritantia); wirken sie nur auf das irritable System allein, so nennen wir sie erregende Mittel





(Excitantia), und wirken diese hinwiederum specifisch auf das Uterinsystem, so haben sie den Namen: Pellentia, Uterina, Emmenagoga. Eben so giebt es Mittel, die bloß das Nervensystem reizen, (Nervina) wie z. B. der Moschus, und welche, die dasselbe ganz unzustimmen im Stande sind (Antispasmodica, Anodyna).

Die Lebensthätigkeit dieser beiden Systeme kann aber ebenfalls auch vermindert werden, durch Mittel die das Nervensystem geradezu deprimiren, als durch die Narcotica (Narcotica); eben so indirekt durch starke Ausleerungen, einen bedeutenden Säfteverlust u. s. w. (Debitantia). Mittel die dem Körper entweder indirekt durch Vermehrung der Excretionen, oder direkt durch Application der Kälte selbst, Wärme entziehen, nennt man wärmeentziehende Mittel (Dephlogisticantia); hingegen Mittel, welche auf den Prozeß der Wärmeerzeugung Einfluß haben, nennt man wärmeentwickelnde Mittel (Phlogisticantia), und die ebenfalls direkt durch angewendete Wärme selbst, oder indirekt durch Excitantia, die den Blutumlauf vermehren, bewirkt wird.

2. Auf die Lebensthätigkeit des Reproductionssystems bringen sie ebenfalls wesentliche Veränderungen hervor; vermehren sie die Cohäsion der Faser, so nennen wir sie zusammenziehende Mittel (Adstringentia, Tonica) und bewirken sie dies bloß bei den flüssigen Theilen (Stiptica); vermindern sie hingegen die Cohäsion der festen Theile, werden sie auflockernde Mittel (Relaxantia) genannt. Mittel die des enthaltenen Sauerstoffs wegen die Thätigkeit der Reproduction vermehren, nennt man oxydirende Mittel (Oxydantia); und die durch Entziehung des Sauerstoffs dieselbe vermindern, werden des-

oxydirende Mittel (*Desoxydantia*) genannt, so z. B. läßt man den Kranken Luft einathmen, die wenig Sauerstoff enthält, oder entzieht den Sauerstoff durch Alkalien. Nicht minder wichtig sind die Mittel, welche in der Reproduction die Absonderung und Einsaugung bewirken, als: die Hautausdünstung befördernden Mittel (*Diaphoretica*), die Urinabsonderung vermehrenden Mittel (*Diuretica*), die Laxir- oder Purgirmittel (*Laxantia* s. *Purgantia*), und die ausser den Abführungen, colikartige Beschwerden verursachen (*Drastica*). Mittel die eine Brechen erregende Wirkung haben, heißen Brechmittel (*Emetica* s. *Vomitoria*), und die den Schleimabgang der Nase befördern und Niesen erregen, Niesemittel (*Sternutatoria*). So giebt es Mittel, die eine specifische Wirkung auf die Brust haben; entweder sie erleichtern die Expectoration derselben (*Expectorantia*), oder sie mildern den Husten (*Pthysica*). Ersetzen die Mittel dem Organismus verlohren gegangene Stoffe, so nennt man sie Nahrungsmittel (*Nutrientia*, *Restaurantia*); vermindern sie die Auflösbarkeit der Säfte, werden sie *Antiseptica*, und lösen sie hingegen Säfte auf, *Resolventia* genannt.

3. Was nun endlich die Mittel anbetrifft, die auf die im Organismus vorhandenen fremden Körper wirken, so können diese entweder durch bloße mechanische Berührung, oder durch eine feine, sehr flüchtige Materie, als durch den Magnetismus, Galvanismus u. s. w., oder durch gesteigerte Resorption und vorhergegangene Assimilation, ihrem Zweck entsprechen. Hierher gehören die blähungtreibenden Mittel (*Carminativa*), die steinauflösenden Mittel (*Lithontriptica*), die wurmtreibenden Mittel (*Anthelmintica*), u. s. w.





Von der verschiedenen Anwendungsart der Heilmittel.

Bei der Anwendung eines jeden Mittels berücksichtigt man jedesmal:

- 1) den Ort der Application,
- 2) die Quantität des Mittels, und
- 3) die Form, in welcher das Mittel gegeben wird.

1. Was die Application des Mittels betrifft, so wirkt es erstens auf die Nerven und zweitens wird es resorbirt. Demnach ergibt sich, daß jeder Theil des Organismus zur Aufnahme eines Mittels geschickt ist, sobald er Nerven und Resorptionsgefäße besitzt. Je nachdem nun die Reizbarkeit des Organs und die Resorptionsfähigkeit verschieden ist, je nachdem unterscheidet sich auch die Wirkung der Heilmittel. Auf den Ort der Anwendung kommt viel an und wir finden oft, daß die Verschiedenheit des Orts die entgegengesetzte Wirkung hervorbringt, so erregt z. B. der Brechweinstein (Tartarus stibiatus) in den Magen gebracht, Erbrechen, hingegen auf die Haut applicirt, einen pustelartigen Ausbruch.


Die Hauptanwendung der Mittel geschieht auf den Magen, welcher sich auch besonders durch seine große Reizbarkeit, ungewöhnlich starke Resorption und Assimilation dazu eignet. Alle in den Magen geführten Stoffe leiden durch den Magensaft eine vortreffliche Veränderung, sie werden assimilirt und homogen gemacht, schnell resorbirt und durch den ganzen Körper verbreitet. Da nun der Magen ein sehr reizbares Organ ist und mit dem Nervensystem in großer Mitleidenschaft steht, sey man vorsichtig bei einzelnen Mitteln, damit

nicht Erbrechen, Convulsionen oder Magenentzündung entsteht.

Die Anwendung der Mittel auf die Haut hat den Vortheil, daß dieselben schneller und unveränderter resorbirt werden, und wird da gewählt, wo der Weg durch den Mund verschlossen ist, oder wo der Magen krankheits- halber die Mittel nicht aufnehmen kann; oder wenn Idiosynkrasie dieselben auf den Magen nicht anwenden lassen, oder wenn die Heftigkeit der Krankheit es fordert ein starkes Mittel anzuwenden und der Magen dieß Mittel nicht vertragen kann; oder wenn Mittel unverändert, in ihrer reinsten Gestalt aufgenommen werden sollen, oder wenn endlich dadurch eine Ableitung der Krankheit von innern wichtigen Organen zu berücksichtigen ist, wie z. B. durch die spanischen Fliegen u. s. w.

Was die Anwendung der Mittel auf den Mastdarm (Intestinum rectum) betrifft, so geschieht sie gewöhnlich durch Klystiere und ist nützlich, wenn der Magen sehr schwach in seiner Verdauung ist und von einem Gebrauche der Mittel eine noch größere Schwäche des Magens zu besorgen wäre; bei Kindern welche ungern einnehmen u. s. w. Außerdem wirkt man auch durch sie unmittelbar auf Obstructionen und Blennorrhöen.

Die Anwendung der Mittel auf die Venen geschieht durch Einspritzungen auf doppelte Art, 1) durch die Infusion, wo man ein aufgelöstes Heilmittel in eine geöffnete Vene einzuspritzen sucht und 2) durch die Transfusion, wo man das Blut von Thieren in die geöffnete Ader des Kranken überträgt. Die Infusion gehört zu den wichtigsten Methoden und wird mit Nutzen angewendet,





— 11 —

wenn der Weg durch den Mund oder Schlund ganz verschlossen ist und bei heftigen Nerven- und Gemüthsfrankheiten, um im Körper eine starke Revolution hervorzubringen. Die Transfusion ist bis jetzt zu wenig benutzt und in Anrede gekommen, weshalb man auch über deren Vortheil ein richtiges Resultat noch nicht zu geben im Stande ist.

Die Anwendung der Heilmittel auf die Lungen geschieht entweder in Luft- oder Dunstgestalt, und ist oft von großer Wichtigkeit bei Scheintodten und Brustkrämpfen u. s. w. In Ostindien versucht man beim convulsivischen Asthma den Stechapfel (*Datura stramonii*) in Rauchgestalt anzuwenden.

Die Anwendung der Mittel auf die Mundhöhle findet bei Krankheiten der Zunge, der Zähne, der Speicheldrüsen, des Gaumens u. s. w. Statt. Die Anwendung der Mittel auf die Nasenhöhle geschieht entweder durch Pulver als Niesemittel, oder durch Dämpfe, oder durch Einspritzungen irgend einer Flüssigkeit. Wir benutzen diese Art von Anwendung bei örtlichen Krankheiten der Nase, bei verminderter Schleimabsonderung und um Ableitungen vom Kopfe zu bewirken, als bei Schwindel, Schlagfluß, Geisteszerrüttung.

Die Anwendung der Mittel auf die Harnröhre geschieht entweder durch Bougies oder Einspritzungen, da wo Verengerungen, Exulcerationen u. a. Krankheiten der Harnröhre vorhanden sind.

Was endlich die Anwendung der Heilmittel auf die Mutterscheide und Gebärmutter betrifft, so geschieht dies

selbe entweder in Dampfform oder als Einspritzung irgend einer Flüssigkeit u. s. w.

2. Die Anwendung der Quantität oder Gabe (Dosis) eines Heilmittels ist eben so wichtig, wie die Kenntniß von der Qualität des Mittels selbst, so z. B. bestimmt die Dosis der Brechwurzel (*Radix Ipecacuanhae*) die Wirkung derselben; in kleinen Gaben wirkt sie krampfstillend, in großen Gaben Brechen erregend. Eben so wirkt der Rhabarber (*Radix Rhei*) in großen Gaben abführend, in kleinen Gaben stopfend. Die Dosis hängt jedoch auch immer vom Alter des Subjekts und von dessen Reizbarkeit ab; eben so wichtig ist die Constitution, wie die Individualität eines jeden Kranken. Außerdem kommt bei der Dosis das Clima, die Nahrungsmittel, der Gesundheitszustand, die Gewohnheit (*Consuetudo est altera natura*), die Art der Application der Mittel, der Zweck und die Absicht des Arztes, die Qualität des Mittels selbst und die Gefahr des Kranken in Betracht. Wenn also nach diesen Umständen die specielle Bestimmung der Gabe eines Heilmittels sehr relativ ist, so kann man doch nach der Erfahrung eine gewisse absolute Dosis, das heißt: eine mittlere Größe bei jedem Mittel annehmen, die sich auf gewisse allgemeine natürliche Bestimmungen des Körpers, vorzüglich aber auf das Alter bezieht, und die sich von dem Alter eines völlig erwachsenen Menschen, bis zu dem Alter des Kindes in gewissen Gradationen verringert. Nach einer solchen Stufenfolge können wir ohngefähr annehmen, daß ein Arzneimittel, dessen Gabe für einen 25jährigen erwachsenen Menschen 40 Gran ist, im 15ten Jahre zu 30, im 5ten zu 20, und zu Ende des ersten Jahres zu 10 Gran gereicht werden kann.

Continued in my journal
of the same date.



Eine noch genauere Bestimmung giebt folgende

Tabelle:

Jahre.	Dosis.	Monate.	Dosis.
25 . . .	40	11 . . .	9
20 . . .	35	10 . . .	8
15 . . .	30	9 . . .	8
14 . . .	29	8 . . .	8
13 . . .	28	7 . . .	7
12 . . .	27	6 . . .	6
11 . . .	26	5 . . .	6
10 . . .	25	4 . . .	6
9 . . .	24	3 . . .	5
8 . . .	23	2 . . .	4
7 . . .	22	1 . . .	2
6 . . .	21	$\frac{1}{2}$. . .	1
5 . . .	20		
4 . . .	18		
3 . . .	16		
2 . . .	13		
1 . . .	10		

3. Was nun endlich die Form der anzuwendenden Mittel anbetrifft, so ist ein auf den Magen indicirtes Arzneimittel am besten in Substanz (jedoch ein flüchtiges Mittel am zweckmäßigsten in flüssiger Form) anzuwenden. Durch die verschiedene Form, worin ein Arzneimittel angewandt wird, können dessen Heilkräfte oft sehr verändert und modificirt werden. Diese Veränderung kann entweder von einer wirklichen Veränderung, die das Mittel selbst durch die veränderte Form erleidet, oder von gewissen Eigenheiten der Organisation herrühren. Die allgemeinste Verschiedenheit der Form selbst ist die feste,

flüssige und luftförmige. Zu der festen oder trocknen gehören die Pulver, Pillen, Bolus, Pflaster und trockne Umschläge; zur flüssigen die Potionen, Mixturen, Solutionen, Decocte, Aufgüsse, Salben, Bähungen, Bäder; zu der luftförmigen gehören die Auflösungen fester und flüssiger Körper in Dunst und die chemischen Gasarten. Die verschiedene Auswahl dieser Formen wird theils durch die Eigenheiten des Stoffs, theils durch den Heilzweck, theils durch die Beschaffenheit des Orts, der Affection oder der Anwendung, theils durch die Eigenheiten des Individuums bestimmt.

Vom Heilverfahren im Allgemeinen und von dem verschiedenen Zwecke der Cur.

Der Hauptzweck bei jeder Cur ist Heilung oder Wiederherstellung der krankhaften Funktionen; da aber das Uebelselbst in verschiedenen Formen ausspricht, so muß auch die Art der Heilung und das Heilverfahren sehr mannigfaltig seyn.

1. Die prophylactische Cur (*Cura prophylactica*), ist diejenige Cur, welche nicht nur Krankheiten zu heilen, sondern auch den Ausbruch einer Krankheit zu verhüten sucht. So soll sie z. B. von außen auf den Organismus einwirkende Körper unschädlich machen, schon im Organismus aufgenommene Stoffe, die aber noch nicht eingewirkt haben, entfernen, bössartige Zufälle in Krankheiten verhüten und endlich gefährliche Krankheiten durch die Erzeugung gelinderer Krankheiten aufzuheben suchen.

2. Die radicale Cur (*Cura radicalis*), sie ist oft sehr schwierig und unmöglich, doch aber auch, wenn sie gelingt, der eigentliche Triumph der Heilkunst. Ihre





Nichtausführung liegt in den Krankheiten selbst, weil sie unheilbar sind, wie z. B. die Schwindsucht; in zu großer Schwäche des Organismus oder einzelner Organe und endlich in den äussern Verhältnissen, durch welche die Krankheiten genährt und unterhalten werden.

3. Die palliative Cur (*Cura palliativa*), sie hat bloß den Zweck, eine Beruhigung und Milderung der Schmerzen zu begründen, wie dies bei den wirklich unheilbaren Uebeln, wo die radicale Heilung ganz unmöglich ist, erfordert wird. Sie soll also nur einzelne, höchst beschwerliche oder gefährliche Symptome beseitigen, wie z. B. Krämpfe u. s. w.

4. Die Nachcur, sie beruht darauf, die noch vorhandenen gewesenen Krankheiten, im Organismus zurückgebliebene Schwäche oder fremdartigen schädlichen Stoffe zu heben und zu entfernen.

Von den Heilanzeigen im Allgemeinen.

Man muß bei jeder Anzeige (*Indicatio*) sich bemühen, die zu wählenden Mittel nicht bloß der Krankheit, sondern auch dem einzelnen Subjecte anzupassen. Die Heilanzeigen richtet sich wesentlich nach den verschiedenen Systemen des Organismus, je nachdem die Krankheit das eine oder das andere System vorzüglich oder mehr ergriffen hat.

1. Das irritable System ist entweder gesteigert, erhöht und so entsteht Entzündung (*Inflammatiō*, *Sthenia*), die indirekt durch schwächende, ausleerende und kühlende Mittel (*Antiphlogistica*) gehoben wird, oder es ist Schwäche vorhanden und hier sind stärkende, roborirende Mittel (*Roborantia*) indicirt.

2. Das sensible System spricht sich bei erhöhter Reizbarkeit mit Schwäche aus und wir wenden Nervina, Narcotica an; oder es leidet an verminderter Reizbarkeit mit Schwäche und wir reichen Excitantia, als: Moschus, Castoreum, Opium, späterhin Roborantia.

3. Das reproductive System leidet durch fremdartige Körper u. s. w., welche auf den Organismus schädlich einwirken und die wir durch ausleerende und auflösende Mittel (Evacuantia et Resolventia) zu entfernen suchen.

Die Alten beschrieben das ganze Heilgeschäfst des Arztes mit folgenden Worten: der Arzt sucht die Indicantia auf, d. h. alles, es mag im Gegenwärtigen oder Vergangenen, oder auch in der wahrscheinlichen Zukunft liegen, es mag im Kranken oder außer ihm befindlich seyn, was ihm das wahre Heilungsobject, d. h. die nächsten und entfernten Ursachen der Krankheit, und folglich die Ansprüche der kranken Natur an die Kunst zu erkennen giebt. Daraus entsteht die Indicatio, die Heilungsidee, der Schluß, was die Kunst zu thun habe, und welche Art von Veränderung zu bewirken sey, um die Gesundheit wieder herzustellen. Hieraus werden nun die Indicata abgeleitet, d. h. die Mittel, wodurch jene Heilungsidee am zweckmäßigsten und sichersten ausgeführt werden kann.

Von den verschiedenen Eintheilungen der Arzneimittellehre.

Die älteren Aerzte theilen dieselbe nach den natürlichen Verwandtschaften der einzelnen Körper ein. Linné suchte diese Ansicht durchzuführen, indem er den Grundsatz





satz aufstellte; Pflanzen von gleicher Art enthielten auch gleiche innere Heilkräfte. Diese Ansicht wurde besonders von Isenflam und Humboldt weiter fortgesetzt.

Auch hat man die Heilmittel nach der chemischen Analyse geordnet und eingetheilt, doch diese Eintheilung ist ohne praktischen Werth und wegen der steten Veränderungen der Chemie nicht tauglich, auch entspricht die Wirksamkeit der Mittel nicht immer den besondern Bestandtheilen.

Die Eintheilung nach den Gesetzen der Erregungstheorie oder den Brown'schen Ansichten würde sehr einfach werden, da er nur eine stärkende und eine schwächende Methode annahm.

Cullen theilte die Arzneimittel nach ihren verschiedenen Wirkungen auf den Organismus ein, doch sind dieselben leider sehr relativ und verschieden nach der Art der Krankheit, nach der Individualität des Kranken, ja selbst in der Qualität und Quantität.

Wenn wir die absolute Kraft aller Heilmittel, den ersten Grund ihres Zusammenwirkens mit dem lebenden Organismus, und die materiellen Veränderungen, welche sie hervorbringen, genau und bestimmt angeben könnten, so würden wir darauf ohnstreitig eine vollkommen rationelle und allen Forderungen der Kunst entsprechende Eintheilung der Heilmittellehre gründen können. Das einzige, was wir mit einiger Zuverlässigkeit von der Wirkung der Arzneien wissen, bezieht sich hauptsächlich auf die sinnlichen Veränderungen der Lebensthätigkeit des Organismus. Aber auch diese sind sehr veränderlich, und erfolgen nach gewissen Gesetzen, die wir keinesweges so

genau erforscht haben, daß nicht noch immer sehr beträchtliche Lücken sollten übrig bleiben. Wir wissen nämlich, daß alles, was auf den lebenden Organismus wirkt, zunächst seine Wirkung durch eine Veränderung der Erregung zeigt; aber wir können nicht behaupten, daß diese Veränderung wirklich die ursprüngliche und einzige, und daß ausser ihr auch nicht noch eine materielle oder chemische vorgegangen sey; wir wissen ferner, daß der ganze Organismus mit Erregbarkeit begabt ist, aber wir können nicht bestimmen, ob diese Erregbarkeit durch alle Organe und Systeme gleich vertheilt und von gleicher Art sey; vielmehr widerspricht die Erfahrung dieser Allgemeinheit und Gleichheit der Erregbarkeit, und lehrt uns Mittel kennen, die der besondern Erregbarkeit gewisser Theile vorzüglich angemessen sind, ohne daß die Vernunft davon Rechenschaft geben könnte.


Dergleichen Mängel unsrer Kenntniß und die daraus entspringende Ungewißheit unsrer Kunst sind Ursache, daß sich kein wissenschaftlicher Eintheilungsgrund dieser Lehre auffinden läßt, welcher völlig consequent und in dem innern Wesen der Sache selbst gegründet wäre.

Eine Eintheilung der Heilmittel, die vorzüglich den praktischen Nutzen berücksichtigt und also dem praktischen Arzte am dienlichsten ist, muß

1. die natürlichen Verwandtschaften zu folgen, und
2. die Wirkungen der Mittel auf den lebenden Organismus zu verbinden suchen.

Demnach würde folgende Eintheilung des Hufeland, nach der die vorliegende Arzneimittellehre bearbeitet ist, diesen Zweck erfüllen und in Tabellenform die Heilmittel uns darstellen.





- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Nutrientia. | b. Aetherea aromatica. |
| a. Lactea. | α. Aromata. |
| b. Mucilaginosa s. Mucosa. | β. Nervina. |
| c. Farinosa. | γ. Anthelmintica. |
| d. Gelatinosa. | c. Aetherea resinosa. |
| e. Albuminosa. | α. Balsamica. |
| 2. Oleosa. | β. Gummi-resinosa. |
| a. Pinguedines. | 8. Narcotica. |
| b. Olea. | 9. Acida. |
| 3. Mellaginea. | a. Acida mineralia. |
| 4. Amara. | b. Acida animalia. |
| a. Amara simplicia. | c. Acida vegetabilia. |
| b. Amara aetherea. | 10. Alcalina. |
| c. Amara adstringentia. | 11. Terreä. |
| 5. Adstringentia. | 12. Salia neutra s. |
| 6. Acria. | media. |
| a. Diuretica. | 13. Metalla. |
| b. Drastica. | 14. Aqua. |
| c. Emetica. | a. Aqua simplex. |
| 7. Volatilia s. | b. Aqua mineralis. |
| Aetherea. | 15. Äërea s. Gas. |
| a. Aetherea simplicia. | 16. Agentia physica. |

Von den medicinischen Maaßen und Gewichten.

Das medicinische Maaß und Gewicht ist von dem gemeinen bürgerlichen beträchtlich verschieden. In Deutschland bedient man sich fast durchgehends des sogenannten Nürnberger Medicinalgewichts, wornach das Pfund (Libra, ℔) in 12 Unzen; die Unze (Uncia, ℥) in 8 Drachmen; die Drachme (Drachma, ʒ) in 3 Scrupel, und der Scrupel (Scrupulus, ʒ) in 20 Gran getheilt wird. Ein Gran (Granum, gr.) ist ohngefähr ein Gersten- oder

Pfefferkorn schwer. Das Deutsche Apothekerpfund ist ohngefähr drei Drachmen leichter als das Französische, und drei Drachmen, zwei Scrupel, drelzehn Gran leichter als das Englische, aber um einen Scrupel schwerer als das Schwedische.

Folgende Tabelle gewährt eine schnelle Uebersicht des Deutschen Medicinalgewichts:

℞	℞β	℥	℥β	℥	℥β	℥	℥β	Gran.
1	2	12	24	96	192	288	576	5760.
-	1	6	12	48	96	144	288	2880.
-	-	1	2	8	16	24	48	480.
-	-	-	1	4	8	12	24	240.
-	-	-	-	1	2	3	6	60.
-	-	-	-	-	1	1½	3	50.
-	-	-	-	-	-	1	2	20.
-	-	-	-	-	-	-	1	10.

Das Gewicht flüssiger Dinge bestimmt man gewöhnlich nach den gewissen Gemäßen (Mensurae) oder hohen Behältern von einem bestimmten Inbegriff. Die bei uns im Gebrauche stehen, sind:

der Stos, das Maas oder das Quart (Mensura, M. j) hält drei Pfund medicinisches Gewicht, oder sechs und dreißig Unzen.

Der halbe Stos, Halben oder Rösel (Mensura dimidia, M. β.) hält anderthalb Pfund. Der Schoppen hält zwölf Unzen.

Der viertel Stos oder das Quartier (Mensura quadrans) hält neun Unzen.

Ein kleines Weinglas enthält 1½ — 2½ Unze; ein Eßlöffel etwa ½ Unze oder 200 Tropfen; eine Theetasse wird auf 2 Unzen und ein Tropfen zu einem Gran ge-





rechnet. Auf einen Theelöffel rechnet man 30 Tropfen *).

Man sieht indessen wie unsicher diese Maaße sind und darf sich daher derselben zu nichts weiter, als bloß zu Wassern und dergleichen Flüssigkeiten, die mit denselben eine beinahe gleiche Schwere haben, als Infusionen, Decocte, bedienen. Bei denen, die schwerer oder leichter sind als Säfte, Oehle, Weingeist, muß man die Wage durchaus zur Hand nehmen.

Trockne Kräuter, Blumen und dergleichen in größeren Dosen gebräuchliche, vorzüglich vegetabilische Mittel, werden oft auf eine sehr unbestimmte Art nach dem Umfange bestimmt. Man hat nur folgende drei:

Ein Bund (Fasciculus, Fj.) ist so viel als eine Unze.

Eine Handvoll (Manipulus, Mj.) bedeutet so viel als eine halbe Unze.

Ein Pugill (Pugillus, Pj.) ist so viel als man zwischen drei Finger fassen kann, und hält eine halbe Drachme.

Die Anzahl von Früchten oder gewissen einzelnen Stücken, als Mandeln, Feigen, Gelb vom Ey u. s. f. pflegt man durch Nr. 1, Nr. 2 u. s. w. anzuzeigen.

Von den pharmaceutischen und chemischen Zubereitungen der Arzneien.

1. Unter den pharmaceutischen Zubereitungen begreifen wir solche, die sogleich nach der Vorschrift des Arztes in den Apotheken bereitet werden.

*) Eine Pinte (Pinta) hielt vormals in Frankreich zwei und dreißig, eine Schopine oder ein Seidel sechszehn, ein Demiseptier acht Unzen und ein Gallon (Congius) acht Pfund oder vier Pinten. In England hält die Pinte sechszehn Unzen und der Gallon acht Pinten. Eine Schwedische Kanne (Cantharus) hält fünf und ein halbes Pfund, das Pfund zu sechszehn Unzen gerechnet.

a) Ausgepresster Saft (*Succus expressus*) ist der aus zerschnittenen und zerstoßenen frischen Pflanzen zc. durch eine Leinwand oder durch ein Haartuch gepresster Saft, welcher nachher entweder mittelst der Röhre oder über Feuer durch Abschäumen gereinigt wird.

b) Absud oder Decoct (*Decoctum*) besteht aus den durch Kochen mit Wasser oder anderen Behikeln aufgelösten Bestandtheilen der Arzneien.

c) Aufgüsse (*Infusa*) sind ähnliche Bereitungen, wobei jedoch das Behikel nicht gekocht, sondern entweder kalt oder heiß auf die Arzneien aufgegossen wird.

d) Julep (*Iulapium*) ist eine Mischung aus kräftigen Wassern mit Syrup.

e) Saamenmilch (*Emulsio*) wird aus öhligen Kerzen bereitet, indem dieselben zerstoßen, mit Wasser abgerieben, durchgeseiht und die durchgeseihete Flüssigkeit mit Gummi oder Zucker versetzt wird.

f) Tränkchen, Mixtur (*Potio, Mixtura*) besteht aus Wasser mit Pulver, Essenzen, Syrup u. s. w. versetzt.

g) Gurgelwasser (*Gargarisma*) ist eine Flüssigkeit, die zum Gurgeln gebraucht wird. Eben so verschreibt man auch Flüssigkeiten zu Einspritzungen (*Injectiones*) oder Klystieren (*Clysmata, Enemata*) oder Bähungen (*Fomentationes*), je nachdem die Anwendungsart es fordert.

h) Breiumschlag (*Cataplasma*) ist eine Arzneiform von breiartiger Consistenz; zum äußern Umschlag.

i) Bissen (*Bolus*) ist eine dicke Latwerge in kleine Kugeln geformt, um übel schmeckende Arzneien verschlingen zu können.

k) Pillen (*Pilulae*) sind ziemlich trockne, in kleine Kugeln geformte Arzneien.





l) Pulver (Pulveres) sind Mengungen (Mischungen) von höchst fein zerriebenen Substanzen u. s. w., die gewöhnlich mit gepulvertem Zucker versetzt, eine trockne Form bilden.

m) Salben (Unguenta) sind äußere weiche Arzneimittel, welche aus Fett, Del, Wachs, Harz, Pulvern und dergleichen zusammengesetzt werden. Die dünnste Art derselben heißt Linimentum; die dickste und festeste Art hingegen nennt man Pflaster (Emplastrum).

2. Unter den chemischen Zubereitungen aus einfachen Arzneien verstehen wir hier nur diejenigen, welche immer in den Apotheken vorrätzig und zum Gebrauche fertig seyn müssen. Die wichtigsten darunter sind folgende:

a) Abgezogene Wasser (Aquae destillatae) sind wässrige Dämpfe, welche mit der Kraft des Arzneimittels geschwängert, durch das Feuer in die Höhe getrieben werden, und in der Rehlröhre der Vorlage in Tropfen zusammenfließen. Es sind jedoch nur diejenigen Wasser wirksam, welche über Arzneien mit flüchtigen, riechenden, gewürzhaften, öhlichten, scharfen, geistigen Bestandtheilen abgezogen sind.

b) Geister (Spiritus) sind flüchtige Dünste von mehr oder weniger brennbarer oder salziger Art, die durch die Destillation erhalten werden. Wir haben einfache und zusammengesetzte, leichtere und schwerere, saure, laugenhafte, flüchtige, durch die Gährung hervorgebrachte u. s. w., je nachdem die Substanzen, woraus, und die Art, wie sie bereitet werden, verschieden sind.

c) Aetherische oder destillirte Oele (Olea aetherea, destillata) sind der feinste, wesentliche, verbrennliche, mehr oder weniger flüchtige Theil der mehrsten gewürzhafsten

und wohlriechenden Pflanzen, welche durch die Destillation erhalten werden.

d) Ausgepresste Oele (*Olea expressa unguinosa*) werden aus den Saamen u. s. f. der Pflanzen ausgepresst.

e) Aufgegossene und gekochte Oele (*Olea insolata, cocta*) sind fette Oele, welche man auf gewisse Pflanzen gegossen, oder damit gekocht hat.

f) Brenzlichte Oele (*Olea empyreumatica*) sind die durch die Gewalt des Feuers aus den Körpern getriebenen und dadurch angebrannten ölichten Bestandtheile.

g) Harze (*Resinae*) sind ein eigenthümlicher flüssiger Bestandtheil sehr vieler Vegetabilien, welche entweder von selbst aus ihnen herausquillen (natürliche Harze) oder durch die Kunst daraus geschieden werden (künstliche Harze). So lange sie flüssig sind, nennt man sie auch natürliche Balsame.

h) Tinkturen (*Tincturae*) sind flüssige Arzneien, welche eine meistens angenehme Farbe haben und die Kraft eines Arzneimittels in Alkohol, Wein oder destillirtem Wasser aufgelöst enthalten.

i) Extracte (*Extracta*) sind die wirksamen Bestandtheile der Pflanzen, die durch ein schickliches Menstruum ausgezogen und nachher durch Verdunstung des letzteren eingedickt worden.

k) Latwerge (*Electuarium*) ist eine Bereitung aus einem Syrup mit dem Arzneimittel zusammengemischt und von einer ziemlich dicken Consistenz.

l) Syrup (*Syrupus*) ist ein aus Säften, Abkochungen und Aufgüssen von Kräutern mit Zucker zu einer gewissen Consistenz eingedickter süßer Saft.





m) Muß (Roob) ist ein ausgepreßter Pflanzensaft, zur Honigdicke eingekocht ist.

Außerdem hat man noch die Salze (Salia), die Klee (Gummata), die metallischen Kalke, die Kräuterzucker (Conservae), die Kräuterweine und die Kräuterbiere (Cina medicata, Cerevisiae medicatae), u. a. m. fertig vorhanden.

von den in der Pharmacie früher und auch noch jetzt gebräuchlichen Charakteren.

Man versteht dadurch die Figuren oder Zeichen, bei denen man sich schon von Alters her als einer Abkürzung des Schreibens, um Arzneien, Operationen, Instrumente, Gewichte und dergleichen zu bezeichnen, bedient hat. Da diese Charaktere nur gar zu leicht zu Mißverständnissen Anlaß geben können; so ist es von den neuern Aerzten und Chemisten höchst rühmlich, daß sie sich derselben so wenig als möglich bedienen. Weil sie aber noch nicht ganz und gar aus dem Gebrauche gekommen sind und in manchen Fällen benutzt werden müssen, so wird eine kurze Anzeige der gewöhnlichsten nicht überflüssig seyn.

Acetum, Essig.

Al Acetum destillatum, destillirter Essig.

Acidum, Säure.

Aer, Luft, Gas.

Aerugo, Grünspan.

Alumen, Alaun.

Ammonium, flüchtiges Laugensalz.

Ana, gleich viel.

Aqua, Wasser.

Aqua fortis, Scheidewasser.

- ♃ Aqua pluvialis, Regenwasser.
 ☿ Aqua regia, Goldscheibewasser.
 ☽ Argentum, Luna, Silber.
 ∞ Arsenicum, Arsenik.
 ∞ Auripigmentum, Operment.
 ☉ Aurum, Sol, Gold.
 ☿ Orant. Aurantium, Pomeranzen.
 ♀ Baryta, Schwererde.
 ♂ Bismuthum, Wismuth.
 □ Borax, Borax.
 ♀ Calcaria, Kalk überhaupt.
 ♀va Calcaria usta, lebendiger Kalk.
 ≈ Camphora, Kampher.
 Ⓐ Carbo, Kohle.
 C.B. Carduus benedictus, Karduibenedikt.
 ♀ Cineres clavellati, Pottasche.
 ☿ Cinis, Asche.
 Colat. Colatura, das Durchgeseihete.
 Coq. Coquatur, es werde gekocht.
 C.C. Cornu cervi, Hirschhorn.
 ♀ Cuprum, Kupfer.
 ☿re. & Destillare, destilliren.
 D. in 2plo Detur in duplo, es werde doppelt gemacht.
 D. in p. aequ. Dividatur in partes aequales, es werde
 in gleiche Theile getheilt.
 D. S. detur, signetur, es werde mit folgender Unter-
 schrift gegeben.
 ♂ Ferrum, Mars, Eisen.
 F. Fiat, es werde.
 Fl. Flores, Blumen.
 ♀ Gummi, Gummi.
 gt. Guttula, Tropfen.
 // Saccharum, Zucker.





Hb. B. Herba, Kraut.

H. Hydrargyrum, Quecksilber.

Hydr. Hydrargyrum muriaticum praecipitatum, niedergeschlagenes Quecksilber.

Hydr. corr. Hydrargyrum muriaticum corrosivum, ätzender Quecksilbersublimat.

Inc. inc. Incidenda incidantur, was zu zerschneiden ist, werde zerschnitten.

Inc. et gt. Incisa et contusa, nachdem alles zerschnitten und zerstoßen worden.

K. Kali, Kali.

L. a. Lege artis, nach den Regeln der Kunst.

M. Magnesia, Bittererde.

M. Massa pilularum, Pillenmasse.

M. Misce, mische es.

M. Mixtura, Mischung.

N. Natrum, Natron.

N. Nitrum, Salpeter.

O. Oleum, Del.

O. Oleum aethereum, ätherisches Del.

p. aeq. partes aequales, gleiche Theile.

p. d. per deliquium, an der Luft zerfloßen.

P. Plumbum, Saturnus, Blei.

P. Praecipitare, niederschlagen.

P. Praeparare, präpariren.

P. Pulvis, Pulver.

q. l. Quantum lubet, so viel als beliebig.

q. p. Quantum placet, so viel als gefällig.

q. s. Quantum satis s. sufficit, so viel als zureichend ist.

q. v. Quantum vis, so viel du willst.

R. Radix, Wurzel.

R. Recipe, nimm.

⊖ Sal, Salz.

⊖ Sal alkali, Laugensalz.

⊗ Sal ammoniacum, Salmiak.

⊖ Sal medius, Mittelsalz.

Scat. Scatula, Schachtel.

□ Sapo, Seife.

S. a. Secundum artem, nach der Kunst.

S. Signetur, es werde bezeichnet.

Solv. Solvatur, es werde aufgelöst.

∪ Spiritus, Geist.

∪ ∪ Spiritus vini, Weingeist.

℞. Spiritus vini rectificatus, rectificirter Weingeist.

℞ss. Spiritus vini rectificatissimus, höchst rectificirter Weingeist.

♁ Stannum, Jupiter, Zinn.

♂ Stibium, Spießglanz.

S. S. S. Stratum super stratum, schichtweise übereinander.

≡ Sublimare, Sublimiren.

⊖ Succinum, Bernstein.

♁ Sulphur, Schwefel.

♂ Tartarus, Weinstein.

∇ Terra, Erde.

∇ Terra foliata, geblätterte Erde.

℞ Tinctura, Tinktur.

⊖ Vitriolum, Vitriol.

XX Vitrum, Glas.

□ Urina, Urin.

⊖ Zincum, Zink.

♂ Dies, Tag.

♀ Nox, Nacht.

♂♀ Dies et Nox, Tag und Nacht.





M a t e r i a m e d i c a.

In's Innre der Natur dringt kein erschaffner Geist.

v. Haller.

Class

Nutri

Die Nahrungsmittel sind entweder Stoffe des Thiers und enthalten mehr Stickstoff. Ihre näheren Bestandtheile Sie besitzen sämmtlich eine ernährende Kraft und ersetzen zeitig wirken sie erweichend, mildernd, einhüllend. An erhöhter Sensibilität, wenn sich dazu Schärfe gesellt, z. Excretion, bei Trockenheit, großer Cohäsion der Faser, in den Animalien die Alcalescenz vorherrscht, so können den Organismus wirken.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Lac. (Lac animale:)	Milch.	1) Eselsmilch. 2) Frauenmilch. 3) Pferd milch. 4) Rennthiermilch. 5) Kuhmilch. 6) Ziegenmilch. 7) Schafmilch.	1) Lac ebutyratum. 2) Serum lactis. S. l. acidum. S. l. tamarindorum. S. l. vinosum. S. l. sinapium. S. l. aluminosum. S. l. aurantiorum. S. l. chalybeatum. 3) Cremor lactis. 4) Butyrum. 5) Saccharum lactis.	1) Milchwasser. 2) Käse. 3) Del. 4) Eignes Salz. 5) Butter.

Wick.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

s i s I.

entia.

oder Pflanzenreichs; die des Thierreichs sind nahrhafter
sind: Gallerte, Kraftmehl, Zuckerstoff und Eiweißstoff.
dem organischen Körper verlohren gegangene Stoffe; gleich-
wendung: bei Vergiftungen; bei allen Krankheiten mit
B. bei Diarrhöen; bei ungewöhnlich vermehrter Ge- und
Entzündung. Da in den Vegetabilien die Säure, und
diese Mittel bei einem langen Gebrauche nachtheilig auf

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Nahr- haft und leicht verdau- lich, da- bei ein- hüllend, erschlaf- end.	1) Als Restaurans. 2) Bei Vergiftungen und fremdartigen Stoffen. 3) Bei sehr hartnäckigen Krankheiten, als der Gicht. — 4) Bei allen Nervenkrankheiten. 5) Bei chronischem Erbrechen. 6) Als Corrigens.	Milch But- ter- milch. Mol- ken. Zu- ker. Bad. Kly- stier.	3vj. = = 3j—3j $\frac{1}{3}$	Um ein Pfund Mol- ken zu erhal- ten, sind 16 Unzen süße Milch nö- thig. Ein halb Quent- chen gerei- nigter Wein- stein macht ein Pfund Milch gerin- nen und gibt süße Molken.

Officineller Name.	Ertröial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Amygdalae dulces.	Süße Mandeln.	Amygdalus communis.	1) Syrupus amygdali- nus s. emul- sivus. 2) Oleum amygdala- rum dul- cium. <i>3 Mandeln</i> <i>in 1 Pf.</i>	1) Del. 2) Schleim.
Semina papaveris.	Mohn- saamen, Mohn.	Papaver somnia- rum.	1) Oleum papaveris.	1) Del. 2) Narcoti- cum.
Nux jug- landium.	Wal- nuß.	Juglans re- gia.	1) Extrac- tum nuc. jug. 2) Oleum nuc. jug. <i>3 Extr. fol.</i> <i>jug.</i>	1) Del. 2) Bitter aromati- sches Prin- cip.

Almond. 1.

Mangle.

2.

3.

Poppy - Seed.

1.

Walnut.

1.

2.

3.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Rüh- rend be- ruhig- end, krampf- stillend und näh- rend, doch ih- res vie- len Oels wegen schwer verdaulich.	1) Bei Vergiftungen scharfer Stoffe. 2) Gegen den Band- wurm. 3) Beim Tripper. 4) Als Getränk. <i>almond milk</i> 5) Das Oel zu Rhy- stieren.	Emul- sio. Syn- rup. Pul- ver.	℥j — ▽℥ss. ℥j — ▽℥bj.	Der Man- delbaum ist ursprüng- lich in Sy- rien, Ara- bien einhei- misch und wird im süd- lichen Euro- pa cultivirt. XII. Cl. I. Ord.

Die Wirkung, wie An- wendung, ist gleich der der süßen Mandeln.	Emul- sio. Del.	℥j — ▽℥vjii	Der weiße Mohn, eine einjährige Pflanze, wächst in Asien, Per- sien u. Ara- bien wild. XIII. Cl. I. Ord.
---	-----------------------	----------------	---

Anhal- tend rei- zend, stärkend, etwas zusam- menzie- hend, den Ma- gen beläs- tigend.	1) Gegen Würmer. 2) Bei Magenschwäche. 3) Bei der Hypochon- drie. Außerlich bei Ge- schwüren und Fisteln. <i>4) Zum Gebrauch bei Hemorrhoiden</i>	De- coct. Ex- tract. Del.	℥j — ▽℥xj	Der Wall- nußbaum wird bei uns in Gärten cultivirt. XXI. Cl. VII. Ord.
--	---	---	--------------	--

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Semina cannabis.	Hanf- saamen, Hanf.	Cannabis sativa.	1) Oleum cannabis.	1) Del. 2) Schleim. 3) Narcoticum.

2. Mucilaginosa

Alle schleimigen Mittel sind in Wasser lösbar, zähe, Salpetersäure gemischt, Schleimsäure; harzige und ölige schleimige Stoffe, die sich in den Blättern, Wurzeln, Früchten, Stauden und Bäume vorkommen, welcher ausschwitzung: Bei Krankheiten mit erhöhter Reizbarkeit artige heterogene Körper im menschlichen Organismus erhöhter Reizbarkeit.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Gummi arabicum s. mimosae.	Arabisches Gummi.	Mimosa nitida, Senegal. Acacia vera.	1) Pulvis Gummi mimosae. 2) Pasta de alth.	1) Schleim. 2) Zuckersäure.

Hemp-lead,
1.

Gum Arabic.



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Beruhi- gend; einhül- lend, be- tänbend, krampf- stillend.	1) Bei Diarrhoen.	Emul- sio.	℥i — ∇℥vjjj	In Persien einhelmisch, bei uns cul- tivirt. XXII. Cl. V. Ord.
	2) Bei Entzündung der Harnröhre, wie z. B. beim Tripper, bei der Strangurie.	De- coct.	—	

s. Mucosa.

unschmackhaft, vertrocknen leicht an der Luft, erzeugen mit
Stoffe machen sie lösbar. Alle Vegetabilien enthalten
ten vorfinden oder in dem eingedickten Saft mehrerer
Sie sind einhüllend, beruhigend, schmerzstillend. An-
des irritablen Systems, bei Entzündungen, da wo fremd-
sich befinden; bei profusen Se- und Excretionen mit er-

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Beruhi- gend, einhül- lend, näh- rend, er- schlaf- fend, auch oft zusam- menzie- hend.	1) Als Nahrungsmit- tel.	Pul- ver.	gr. v —	Dies Gummi trieft aus dem Stamme und den Aesten die- ser Bäume, die in Arabien u. Aegypten wachsen. Es dient zur in- nigern Ver- bindung der Oele, Harze, Balsame, Kampher, Quecksilber mit Wasser. XXIII. Cl. I. Ord.
	2) Bei Vergiftungen		℥i	
	3) Bei Diarrhoen und Ruhr.	Emul- sio.	℥i — jj	
	4) Bei Entzündungen der Respirationsor- gane u. überhaupt des irritablen Systems.		∇℥vj.	
	5) Bei Entzündungen der Harnwerkzeuge.			
	6) Bei Blutungen.			
	7) Bei Augenkrank- heiten.			

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Gummi tragacanthae.	Traganth.	Astragalus tragacanthae s. creticus.	1) Pulvis Gummi tragacanthae.	1) Schleim. 2) Kleber.
Gummi pruni s. cerasorum.	Pflaumen-gummi.	Prunus Cerasus s. domestica.		
Semina cydoniorum.	Quit-tenför-ner.	Pyrus Cydonia. <i>quince-tree</i>	1) Gummi cydon. 2) Syrupus cydon. 3) Pulpa s. panis cydoniorum.	1) Schleim. 2) Gerbestoff.
Herba et Radix althaeae.	Althäa, Eibisch, Weiße Pappel.	Althaea officinalis.	1) Pasta althaeae. 2) Syrupus althaeae. 3) Unguentum althaeae. 4) Species ad Enema. 5) Species ad Cataplas.	1) Schleim. 2) Extractivstoff.

Common Toadgiant.

Quince - Seed.

Marsh mallow Root.



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Einhül- lend, schmerz- stillend.	Wir benutzen es gleich dem Vorigen; vorzüg- lich aber bei Heiserkeit und Husten und außer- lich als ein einhüllen- des, schmerzstillendes Mittel, z. B. bei Wun- den.	Pul- ver. Emul- sio.	— ℥j — ▽℥vj.	Es kommt von einem dornichten Strauchge- wächs aus Arabien, Griechen- land. XVII. Cl. IV. Ord.
	Es ist ganz den Vo- rigen gleich, doch we- gen seiner Unreinheit nicht zu empfehlen.			XII. Cl. I. Ord.
Beruhi- gend, schmerz- stillend, zusam- menzie- hend.	1) Bei Brustschmerzen, Husten. Aeußerlich bei Augen- entzündungen, Hä- morrhoidalknoten, Aphthen, Brandschäden, Ercoriationen.	Emul- sio.	℥℞—j -▽℥vj.	Auf Creta, an der Do- nau einhei- misch. XII. Cl. IV. Ord.
Schmerz- lindernd, nährend, einhül- lend.	1) Bei entzündlichen Krankheiten. 2) Bei Exanthemen. 3) Bei Krämpfen des Unterleibs. 4) Bei Diarrhoen. Aeußerlich in Umschlä- gen bei Haemorrhoi- dalknoten, zum Rly- stier bei Krämpfen.	De- coct. Sy- rup. Pul- ver. Salz- be.	℥j — ▽℥vjij ℥℞—j.	Es ist eine perennirende Pflanze, die an feuch- ten Orten, in der Schweiz, Holland, England, Frankreich wild wächst. XVI. Cl. VI. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Herba et Flores malvae.	Malve, Feld- Räse- pappel.	Malva vul- garis, ro- tundifo- lia, arbo- rescens.		1) Schleim. 2) Gerbe- stoff.
Folia et Flores ver- basci.	Woll- fraut, Königs- ferze.	Verbascum Tapsus.	1) Oleum verbasci. Die Blumen sind ein Hauptin- gredienz der sogenann- ten Raemp- schen Kly- stiere.	1) Schleim.
Herba Li- nariae.	Lein- fraut.	Antirrh- inum Lina- ria, Linaria vulgaris.	1) Unguen- tum Lina- riae.	1) Schleim.


Herb et flower of Malva.

Foils et flower of Mollin.

3. Fari-

Mehl ist in der Regel ein wesentlicher Bestandtheil theile derselben sind: Kleber, Sagemehl, Eiweißstoff, Zucker: vorzüglich nährend, stopfend. Anwendung: als Nahzündungen und um Eiterung zu bewirken; örtlich als

Officineller Name.	Trivial	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix Salep, Salap.	Salep.	Orchis Morio. Orchis mascula. Orchis maculata. Orchis pyramidalis. Orchis militaris.	1) Pulvis Salep.	1) Schleim in höchst concentrirter Form. 2) Kleber.
Sago, Segu.	Sago.	Cycas circinalis. Caryota urens. (Sagus Rumphii.)	Diese Sagokörner werden aus dem Marke dieser Bäume, durch Auswaschen und Knäten bereitet.	1) Schleim. 2) Kleber.



osa.

Der Getreidearten und Wurzeln. Die chemischen Bestand-
theile sind etwas Acre. Sie sind einhüllend, beruhigend,
Nahrungsmittel, bei Durchfällen, Ruhren, Krämpfen, Ent-
zündungen einhüllendes, beruhigendes Mittel bei der Rose u. s. w.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Stark nährend und zu- gleich stop- fend, dabei leicht verdaulich und die feh- lende Blut- gallerte erset- zend.	1) Als Nahrungsmittel. 2) Als Restauraans bei Kräfteverlust, Aus- zehrung. 3) Bei Durchfällen u. Ruhr. 4) Bei Krankheiten der Brust, Lungen- suchten und Hektik. 5) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge.	Pul- ver. De- coct. Ge- tränk.	ʒj—ʒj. mit ▽ oder R Cinna- mom.	Bei uns auf Wiesen, in Gebölzen und Wal- dungen ein- heimisch. XX. Cl. I. Ord.
Vorzüg- lich näh- rend und stopfend.	1) Als Nahrungsmittel. 2) Bei Durchfällen u. Ruhr.	Sup- pe. Pty- san.	ʒj — ▽ʒj.	In Ostin- dien und auf den moluk- kischen In- seln wach- send. XXII. Cl. XIII. Ord. XXI. Cl. VII. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Semina Fagopyri.	Buch- weizen. Heide- korn.	Polygo- num Fago- pyrum.		1) Schleim. 2) Mehl.
Semina Oryzae.	Reiß.	Oryza sa- tiva.		1) Schleim. 2) Mehl.
Semina Mais.	Mais, Türkis- ches Korn.	Zea Mays.		1) Kraft- mehl. 2) Zucker.
Semina avenae.	Hafer.	Avena sa- tiva.	1) Avena decorti- cata. 2) Panis avenae.	1) Kleber. 2) Aere.



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Näh- rend, aber schwer verdau- lich.	Als Hausmittel bei Durchfällen.	Brei.		In Asien wild, bei uns gebaut. Im 14ten Jahrhun- dert kam derselbe nach Europa. VIII. Cl. III. Ord.
Näh- rend, anhal- tend stopfend.	1) In hitzigen Krank- heiten. 2) Bei Durchfällen. 3) Als Nahrungsmit- tel, es bewirkt je- doch leicht Blähun- gen.	Pty- san. Sup- pe.		In sumpfi- gen Gegen- den Ita- liens, Spa- niens, In- diens ein- heimisch. VI. Cl. II. Ord.
Näh- rend, sätti- gend oh- ne zu stopfen.	Nur als diätetisches Mittel.			Ursprüng- lich in Ame- rika wild. XXI. Cl. III. Ord.
Näh- rend, aber auch sehr leicht Säure erzeu- gend.	1) Bei Krankheiten der Brust. 2) In hitzigen Fiebern. 3) Bei Durchfällen und Ruhr. Außerlich als erwei- chendes, erschlassen- des Mittel bei Ent- zündungen um Eite- rang zu beschleuni- gen.	Ptyf. Sup- pe. Um- schl.	3j — ▽℥ijj.	III. Cl. II. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Semina Secalis.	Roggen.	Secale ce- reale.	1) Roggen- brod. 2) Roggen- mehl. 3) Roggen- kleie. 4) Brannt- wein. 5) Brannt- weinstrank.	Er enthält ein schleimig mehliges Wesen, $\frac{3}{4}$ fei- nes Ge- wichts. Zviii Rog- genkörner bestehen aus: Zi Zviii ß. Hülse, Zvi ß Feuchtig- keit, Zv Zij Mehl.
Semina tritici.	Waizen.	Triticum aestivum, hybernum, composi- tum, turgi- dum, polo- nicum, Spelta.	1) Amylum tritici. 2) Furfur tritici. 3) Farina tritici. 4) Mica pa- nis albi. 5) Panis tri- tici. 6) Perl- graupe.	1 H Mehl soll Zx und Zij Stärkes- mehl, Ziv Kleber, Zvi Zucker ent- halten.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Nährend. Es müssen jedoch bei seinem Genuße Bewegungen und eine gute Verdauung Statt finden, sonst erregt er leicht Säure.	1) Das Brod zu Ptrysanen. 2) Das Mehl als Brei bei Schwindsucht; als Umschlag zur Beförderung der Eiterung, und zur Bereitung der Senfpflaster; als Streupulver. 3) Die Kleie in Bädern bei metastatischer Gicht und trocknen bei Fußoedem. 4) Der Branntwein als Einwaschung bei Gliederschwäche. 5) Der Branntweinstrank als Bad bei Schwäche —.	Ptryf. Suppe. Umschl. Bad.		In Creta wild, bei uns gebaut. 3vjij Roggenmehl enthalten: 3jv 3vj grv. Stärke, 3vj gr.vj Schleim, 3vj gr.jv Kleber, 3j gr.vj Eiweiß- und Zuckerstoff, 3jv gr.v Hülsen. III. Cl. II. Ord.
Vorzüglich nährend und stopfend.	1) Das Stärkemehl wird äußerlich als Klystier bei Durchfällen, dann bei Blutungen und Excoriationen benutzt. Will man z. B. bei Diarrhöen ein Brechmittel geben, und die Wirkung auf den Stuhlgang verhüten, so verbinde man mit demselben das Amylum wie z. B.: 2) Die Kleie als Schönheitsmittel und als trockne Fußbäder bei der Rose. — 3) Die Semmelkrume	Klyst. — Bad.	3j—3ß —	Ursprünglich aus Saurien, bei uns gebaut. ℞ Tart. stibiati gr.j Pulv. rad. Ipecac. 3j

Officineller Name.	Trivial.	Systematisches Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Semina hordei.	Gerste.	Hordeum vulgare.	1) Hordeum prae- paratum. 2) Hordeum excor- ticatum, perlatum. 3) Maltum hordei. 4) Saccha- rum hordei. 5) Die Bier- arten. a) kühlende, b) nährende, c) magen- stärkende.	Sie kommen denen des Kroggens gleich. ℥viii Ger- stenkörner bestehen aus: ℥vß gr. L Mehl, ℥iß Hülse und ℥vii gr. x flüchtige Theile.
Radix Solani tu- beros.	Erdfos- feln, Kartof- feln.	Solanum tuberosum.	1) Amylum solani tu- beros.	1) Wasser. 2) Schleim. 3) Kleber. 4) Amylum.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	zur Bereitung der Quecksilberpillen. 4) Das Brod in allen Krankheiten wo schwache Verdauungskräfte sind.	Umschl.		Amyli tritici gr. x mfp. ss. Emeticum. III. Cl. II. Ord.
Nährend, blutreinigend.	1) Innerlich bei hitzigen Fiebern und acuten Lungenkrankheiten. 2) Als Restaurans in Lungenfuchten, bei Abzehrungen. 3) Bei chronischen Hautkrankheiten. 4) Beim Scorbuto. 5) Bei Scropheln und 6) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge, selbst bei Blutharnen und Exulcerationen der Nieren. Außerlich bei Scropheln, Rhachitis u. s. w. als Bad.	Phys. Decoct. Bier. Malz. Malz.	℥ij — ▽℥ijj. ℥vj — ▽℥ijj.	Sie wird bei uns gebaut. ℥vjij Gerstenmehl geben: ℥v ℥ijj Stärke, ℥ij gr. xv Kleber, ℥ijj gr. xx Zucker, ℥ij gr. Lvj Schleim, gr. vjL Eiweiß, ℥β gr. xx faserige Materie, gr. jii phosphors. Kalk und gr. vj Feuchtigkeit. III. Cl. II. Ord.
Sie geben als Nahrungsmittel wenig Kraft.	Sie sind innerlich von einigen Aerzten gegen Scorbuto empfohlen. Außerlich bei Ver-	Amyl.		Ursprünglich in Chiff oder Peru. Franz Drasce brachte sie zuerst nach Europa,

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
				5) Narcotium.
Semina fabae. Fabae.	Bohnen.	Vicia Faba.	1) Farina fabarum.	1) Schleim 2) Mehl.

4. Gela

Eine von thierischen Substanzen gewonnene Gallerte, das Auskochen gewisser thierischer Theile, z. B. der Knochen, als eine zitternde, weiche, durchscheinende Masse darstellt, bildet, die Tafelgallerte (Gelatina sicca s. tabulata) genannt, in Laugensalzen lösbar, in der Wärme wird sie leicht faulig.



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Die in der Asche gebraten sind am wohl- thätig- sten, weil sie das durch von den narcoti- schen u. wässi- gen Theilen befreit werden.	brennungen ein schät- zenswerthes Mittel. In großer Menge ge- nossen, verursachen sie Scrophelkrank- heit und sollen den Geschlechtstrieb ver- mehren.	Um- schl.	gerie- ben.	Caspar Bauhin hat die Pflanze zuerst 1590 botanisch beschrieben und 1623 brachte Walter Ras- leigh die er- sten aus Virginien nach Ir- land. V. Cl. I. Ord.
Besänf- tigend, einhül- lend.	1) Bei rosenartigen Entzündungen, so wie 2) bei Geschwülsten der Füße, mit Flie- derblumen als Um- schlag.	Mehl.		In Persien und Aegypt- en wild, bei uns culti- viret wach- send. XVII. Cl. IV. Ord.

linosa.

als Hauptbestandtheil dieser Mittel, gewinnen wir durch
den, Muskeln, Knorpel u. a. m., die sich beim Erkalten
und nach längerem Eintrocknen eine spröde, brüchige Masse
bildet. Sie ist in Wasser, Weingeist, Säuren und
bei einer trocknen Destillation giebt sie fauliges Wasser,

festes kohlensaures Ammonium und emphyreumatisches Oel, höchst nährend, denn sie enthält die nahrhaftesten Stoffe Nahrung als 8 lb Fleisch. Nachtheile sind, daß sie zu Kopfweh u. s. w. erzeugt. Anwendung: vorzüglich als Personen, die an schlechte Nahrung gewöhnt waren, haben. Um sie mit Vortheil anzuwenden, muß 1) der Patient stets eine gute oxydirte Luft genießen.


Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Gelatina bubula.	Kinds- gallerte.	Bos taurus.	1) Gluten depuratum. ℥ijj Eisch- lerleim löse in ∇℥xv, mit Eiweiß abgeklärt und ℥ijj Zucker zu- gesetzt. 2) Gelatina ex ossibus bub. ℥j Kno- chen läßt man mit ∇℥ijj ko- chen. 3) Gelatina ex oss. vitul. 2 Füße mit ∇℥ijj ge- kocht, das Fett abge- nommen, setzt dann Wein ℥j u. Zucker ℥iv	



und enthält vorzüglich Phosphor und Kalkerde. Sie ist in concentrirter Gestalt, z. B. 1^{te} H Gallerte giebt so viel schnell resorbirt wird und leicht Plethora, Congestionen, Nustauranz bei fehlenden Kräften und Säften, theils bei theils bei solchen die einen großen Sästeverlust erlitten Reproductionsproceß gehörig von Statten gehen und 2)

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	Neuerdings empfahlen dieselbe einige Aerzte gegen Wechselfieber; siehe Hufelands Journal 18. Bd. 2. St. Ist die Verdauung sehr schwach, so muß man sie mit aromatischen Mitteln versetzen. 2) Bei allen periodischen Krankheiten, Selbstsucht —. 3) Bei allen Abzehrungen durch großen Sästeverlust entstanden. 4) Bei profusen Profluvien, namentlich in der Ruhr. 5) Bei der Harnruhr. Außerlich bei Flechten und Hautausschlägen.	Geslee.	3j —	Seguin, der Erfinder dieses Mittels, zieht sie der China vor, weil sie keine Reizung verursacht, einen ruhigen Schlaf, und eine gelinde Ausdünstung verschafft, von dem schwächsten Magen verdaut wird und ein einheimisches,

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			zu u. klärt das Ganze mit Eiweiß ab. 4) Die Fleischbrü- he, Bouil- lon.	
Cornu cervi.	Hirsch- horn.	Cervus Ele- phas.	1) Cornu cervi ras- patum. 2) Cornu cervi ustum. 3) Gelatina cornu cer- vi.	1) Gallerte. 2) Phos- phorsaurer Kalk.
Gelatina Ichthyocol- la, Colla piscium.	Hausen- blase, Fisch- blase.	Acipenser Sturio (Stör) Acip. stel- latus. Acip. Huso. Acip. ruthe- nus. Silurus Gla- nis.	1) Empla- strum ad- haesivum Woodsto- kii s. ang- licanum. 2) Potio. Rx. Ichtyo- collae 3vj coq. c. ▽. frig. 3ij adde Sacchari albi 3vj Aquae 3vj Vini 3xx m. Cola, D. S. Tassen- weise zu nehmen.	1) Schleim. 2) Gallerte.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
				weit wohlfeileres Mittel ist.
Nährend, einhüllend. —	1) Als Gallerte gegen Wechselfieber. 2) Als Nahrungsmittel.	Ptyf.		Es wird geraspeltes Hirschhorn Zj mit ∇Hj auf Zviii eingekocht.
Nährend, einhüllend, schmerzstillend.	Innerlich bei Wechselfiebern. 2) Als Nahrungsmittel. 3) Bei Durchfällen. 4) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge, Strangurie. Aeußerlich als Klystier bei Durchfällen.	Getrk. Klyst. Pflaster.		Die feinste Sorte wird vom Acipenser Sturio und Acipenser stellatus gewonnen, und vorzüglich am caspischen Meere, in Rußland und Astrachan bereitet.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Lichen Islandicus. (MuscusIs- landicus et herba li- chenis Is- landici.	Islän- disches Moos.	Cetraria Islandica.	1) Species pectora- les.	1) Schleim. 2) Vegetabi- lische Salz- lerte. 3) Adstrin- gens. 4) Bitter- stoff.

5. Albu-

Das Eiweiß (Albumen) ist im kalten Wasser und Zusatz von Säuren, Weingeist, bildet eine dickliche, un-
zuherrschen. Sie stimmen die Sensibilität herab, wirken
mittel, als erschlaffende, einhüllende und schmerzstillende




Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Nähr- rend, stärkend, zusam- menzie- hend. Specificit auf die Brust.	1) Bei allen Erschöp- fungen und Ent- kräftungen. 2) In phthysischen Krankheiten, Lun- gensucht. 3) Bei anfangender Schwindsucht und vernachlässigtem Brustcatarrh, nach gehobener Pneumo- nie. 4) Im letzten Stadium des Sticthustens. 5) Bei Diarrhöen, Dis- senterien und an- dern Profluvien. 6) Bei Atrophie der Kinder.	Des- coct. Pul- ver.	3ß — j ▽ ℥j. ʒi — ʒj.	Dieses Moos, wächst auf- ser in Is- land, auch auf dem Nie- sengebirge, Brocken, Schwarz- walde und andern Deutschen Gebirgen. Contrain- dicantia: wirklich vor- handene Entzün- dung oder Anlage da- zu, vorhan- dene Tuber- keln in den Lungen und Husten mit unterdrück- tem Aus- wurf. XXIV. Cl. XI. Ord.


minosa.

der Kälte lösbar, gerinnt bei erhöhter Temperatur und
auflösbliche Masse. Kohlenstoff scheint in demselben vor-
zuhüllen, erschlassend. Anwendung: als Nahrungs-
Mittel, da sie die erhöhte Reizbarkeit herabstimmen.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Limaces.	Schnecken.	Limax rufus et ater.	Rx. Limacum No. vj ∇ lotos tere cum ∇ q.s. colat. adde Tincturae Cinnam. q. v. D.	1) Gallerte. 2) Eiweiß. 3) Schleim.
Ova Gallinaea.	Hühner- eter.	<i>Phasianus gallus.</i>	1) Oleum ovorum.	1) Albumen. 2) Vitellus. 3) Testae ovorum. Diese Theile besitzen Del, Eiweißstoff, Wasser.
Testae Concharum.	Muschel- schalen.	Ostrea edulis.	1) Concha praeparata s. pulverata.	Keine kohlensaure Kalterde mit etwas animalischen Stoffen.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Succus gastricus. Es ist eine helle wässrige Flüssigkeit, die sich in Wasser auflöst, durch einen Zusatz von Säuren nicht gerinnt und einen salzigen Geschmack hat.	Magensaft.			1) Eiweiß. 2) Salzige Theile.






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Auflö- send, die Ge- und Ex- cretion verbes- sernd.	Innerlich: 1) Gegen Wechselfie- ber. 2) Gegen faulige Krankheiten. 3) Gegen Magenbe- schwerden. Neuerdings gegen Ma- genkrebs. Außerlich bei böß- artigen Geschwüren, beim Biß vom tollen Hunde, beim Krebs, bei Flechten, bei Au- genkrankheiten.			Nach Spal- lanzani läßt man einen Schwamm an einem Faden, Ras- sen oder Kräben ver- schlucken und benutzt dann den eingesoge- nen Magen- saft. Nach Car- minati läßt man Kalb- fleisch Zij mit ∇Zi und Roc- salz gr. v in einem Glase bei Tempera- tur 100°F 16 Stunden lang digerir- ren.

C l a s - O l e -

Diese Mittel sind Produkte der organischen Natur; malischen durch Auskochen, Ausschmelzen gewonnen. Sie thet bildet mit ihnen eine milchtrübe Auflösung, an der Laugensalzen bilden sie Seifen; mit ätherischen Oelen falke auf. Sie sind die besten Linderungs- und Milde- Reizen ein, sondern sie stumpfen auch die im Körper vor- mehrte Spannung der Faser und halten äussere Schäd- laxirend. Nachtheile derselben sind: sie stören sehr leicht sehr den Magen und den ganzen Körper. Anwendung: man sie bei Ruhr und Durchfällen empfohlen; äußerlich dernde Mittel.

1. Pingue-

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Cacao.	Kakao.	Theobroma Cacao.	1) Butyrum Cacao.	1) Fett.
Fructus s. Nuces Ca- cao.	Kakao- bohnen, Kakao- nüsse.		2) Sapo Ca- cao. 3) Cacao ta- bulata, praeparata.	2) Bitterst.





i s II.

s a.


Die vegetabilischen werden durch Auspressen und die an-
 und in Weingelst und Wasser unaufslösllich; Schwefel-
 auf ziehen sie den Sauerstoff an und werden ranzig; mit
 verbunden, lösen sie Schwefel, Harze, Campher und Blei-
 ungsmittel, denn sie hüllen nicht nur den Körper vor
 andene erhöhte Reizbarkeit ab, sie vermindern die ver-
 ickheiten vom Körper ab. Mehr oder weniger wirken sie
 die Verdauung, denn ein langer Gebrauch erschläfft zu
 als einhüllende Mittel gegen Bleivergiftungen, auch hat
 n Salben als geschmeidige, erweichende und schmerzlin-

lines.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Näh- rend, aber schwer verdau- lich, be- ruhi- gend, schmerz- stillend.	Die Butter wendet man in Suppen bei Krankheiten der Brust, Ureinwerkzeuge an. Die Bohnen selbst als Nahrungsmittel. Aeußerlich bei Krän- pfen, Polypen, schmerz- haften Haemorrhoiden, aufgesprungenen Brustwarzen, Lippen.	But- ter. Cho- cola- de. But- ter.	3j—jj	In Amerika, Mexiko, Ca- rolina und auf den An- tillen wach- send. XVIII. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Cera flava et alba.	Wachs.	Apis melli- fica.	1) Oleum cerae. 2) Unguen- tum cerae s. Ceratum album. 3) Empla- strum ci- trini. 4) Spara- drap. 5) Cereoli simpl. s. explora- torii.	Ein verdick- tes oxydir- tes Del.
Butyrum insulsum s. non sali- tum.	Ungesal- zene Butter.			
Adeps suilla s. Axungia porcis.	Schwe- ne- schmalz, Schmeer.	Sus Scrofa.	1) Unguen- tum rosa- tum. 2) Unguen- tum com- mun.	
Sperma Ceti, Cetaceum.	Wall- rath.	Physeter macroce- phalus.		





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
nhül- end, merz= illend, lin= ernd.	Innerlich bei Ruhr und profusen Diar- rhöen. Außerlich in Dampf- gestalt bei Krankhei- ten der Lunge; als Bougies bei Krank- heiten der Harnröhre, als Salbe bei Exco- riationen und Ver- brennungen.	Emul- sio. Dampf. Bou- gie. Salbe. Pflast.	3ß—j Ei j ▽3vj.	Das Wachs ist ursprüng- lich der Pol- len von Blü- men, den aber die Vie- sen auf ei- nem noch unbekann- ten Wege umändern und anima- lisiren.
Näh- end, doch schwer erdau- h, be- rüh- gend, nhül- end.	Außerlich bei Ent- zündungen sehr ge- reizter Stellen, auf- gesprungenen Lippen, entzündeten Brustwar- zen.	Sal- be.		Nimm: Butter, } gleiche Weln, } Theil. Wachsl. } le.
erwei- hend, nhül- end.	Außerlich bei auf- gesprungenen Lippen, Händen u. s. w.	Sal- be.		
	Gegen Harnbeschwer- den, Lungengeschwüre, Geschwüre der Nieren und Gedärme, Ra- tarrh, Nachwehen.	Pflast. Sal- ben.		Der Wall- rath ist das gereinigte Fett aus dem Kopfe des Pottfi- sches.

Officineller N a m e.	Trivial.	Systemati- scher N a m e.	Präparate.	Bestand- theile.
Adeps piscaria.	Fisch- thran.	Balaena. (Walfisch.)		

2.

Sie wirken einhüllend, erschlaffend und eröffnend.
tel zu Emulsionen und giebt sie auch eßlöffelweise.

Officineller N a m e.	Trivial.	Systemati- scher N a m e.	Präparate.	Bestand- theile.
Oleum lini.	Leinöl.	Linum usi- tatissimum.	Das Leinöl wird aus den Saa- men des Flachses (Leinsaa- men) ge- schlagen, be- reitet.	
Oleum amygdala- rum dulci- um.	Süßes Man- delöl.	Amygdalus communis.	Das Man- delöl wird bei einer ge- linden Er- wärmung aus den sü- ßen Man- deln ge- preßt.	



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	Beim Grinde auf den Kopf gestrichen, um die Krusten zu lösen. In Klystieren bei Verstopfungen, Colik—. Auch wird er bei Verdunkelungen und Verhärtungen der Hornhaut empfohlen.	Sal- be. Klyst.	 g℥j—j	Im Ocean lebend.

Olea.


Man benutzt sie in Verbindung anderer schleimiger Mit-

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Einhül- lend, schmerz- stillend, erschlaf- send, und schwer verdau- lich.	Innerlich bei einge- klemmten Brüchen, Fleus, Bleicolik, ent- zündlichen Beschwer- den der Urinwerkzeuge, Blutharnen —. Aeußerlich zu Ein- reibungen und Kly- stieren.	Emul- sio. Del. Kly- stier.	℥j—jj ℥β—j ℥β.	Im südli- chen Euro- pa wild wachsend, bei uns ge- baut. V. Cl. V. Ord.
Dem Vo- rigen ana- log, nur wohl- schme- kender, leichter verbau- lich und beruh- gender.	Innerlich bei schmerz- haften Nachwehen, bei Entzündungen oder krampfhaften Be- schwerden der Urin- werkzeuge, bei Ruhr und Gallenfieber. Aeußerlich bei Ge- hörkrankheiten, Flech- ten —.	Emul- sio.	℥j.	Im südli- chen Euro- pa wild wachsend. XII. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Oleum olivarum.	Oliven- öl, Baum- öl, Proven- ceröl.	Olea euro- paea.	Das Oli- venöl wird bei einer ge- linden Er- wärmung aus den völ- lig reifen Früchten des Del- baums ge- preßt.	


Oleum papaveris.	Mohn- öl.	Papaver somnife- rum.	Das Mohn- öl wird durch Aus- pressen aus dem Mohn- saamen ge- wonnen.	
---------------------	--------------	-----------------------------	---	--





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Einhüllend, schmerzstillend, erschlafend.	Innerlich: 1) Bei Vergiftungen. 2) Bei hartnäckigen habituellen Verstopfungen. 3) Bei Entzündungen aller Art, z. B. des Darmkanals, der Brust, der Nieren, der Urinwerkzeuge. 4) Specifisch bei der Bleicolik. 5) Gegen Würmer. 6) Gegen Gicht. 7) Gegen die Pest. Außerlich bei der Wassersucht (Dioscorides), bei animalischen Vergiftungen u. s. w.	Emulsion.	3j	Dies Del ist durchsichtig, weißgelblich und gerinnt schon bei 38° F. zu einer weißen körnigen Masse, hat zwar keinen Geruch, aber einen süßlichen Geschmack. Im nördlichen Afrika wild wachsend. II. Cl. I. Ord.
	Gleich dem Mandel- und Baumöl; doch noch wohlschmeckender und leichter zu verdauen.	Emulsion.	3j	In Asien einheimisch, bei uns gebauet. XIII. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Oleum nucum ju- glandis.	Nußöl.	Juglans re- gia.	Das Nußöl wird aus den Wall- nußkernen gepreßt.	
Oleum Ricini. Oleum palmae Christi.	Rici- nußöl.	Ricinus communis.	Das Rici- nußöl wird aus den Saamen dieser Pflan- ze (R. c.) entweder durch Aus- pressen oder Rechen ge- wonnen.	



Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Sehr unverbäulich.	Äußerlich gegen Flechten, bei Hornhautflecken, selbst beim Leucom.	Del.	gthj.	Im südlichen Europa wild, bei uns angebaut. XXI. Cl. VII. Ord.
Es führt stark ab, und ist zugleich narcotisch.	Innerlich: 1) Gegen Fluß. 2) Gegen Bleicolik und krampfhaftes Verschließungen des Darmkanals. 3) Bei verschluckten fremden Körpern. 4) Bei eingeklemmten Brüchen. 5) Bei Hämorrhoidalzufällen. 6) Gegen Würmer.	Emul- sio.	3j.	In Westindien, Mexiko einheimisch, bei uns gebaut. XXI. Cl. VIII. Ord.
Del.		3ß—j.		

Diese Mittel sind Produkte der Vegetabilien, kommen ruhr (Diabetes mellitus). Die näheren Bestandtheile der und vegetabilische Säure. Sie befördern die Sec- und Lungen und specifisch auf die Säfte, reinigend und ver- zur Erzeugung von Säure haben, so erregen sie leicht

1. Mittel worin der

Im Allgemeinen kommt der Zuckerstoff dem vegeta- stoff. Er macht ätherische Oele in Wasser auflöslich, cry- Geruch; ist in Wasser leichter wie in Weingeist aufzulö-

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Saccharum album. (Saccharum Canariense.)	Zucker.	Saccharum officinarum.	1) Syrupus communis. 2) Saccharum tabulatum s. hordei.	





s i s III.

g i n e a.

jedoch auch in unserm Körper vor, z. B. bei der Harn-
selben sind: Zuckerstoff, Schleim, Extractivstoff, ein Aroma
Excretionen, wirken auf die Haut, den Darmkanal, die
dünnend, nährend und kühlend. Da sie eine Reizung
Durchfall.

Zuckerstoff vorherrscht.

bilischen Schleim sehr nahe, nur enthält er mehr Sauer-
stoffisirt sich und verbrennt mit einem stechend säuerlichen
sen.


Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Die Ge- und Ex- cretion beför- dernd, gelinde abfüh- rend, kühlend, Schleim auflö- send, die Dige- stion be- för- dernd, säuerlich- widrig.	Innerlich: 1) Bei acuten Krank- heiten, der Brust, der Leber —. Als kühl- lendes, abführendes Salz. 2) In der Wassersucht. 3) Bei Heiserkeit. 4) Beim Scorbut. 5) Als Zusatz zur Ver- besserung des Ge- schmacks. Außerlich bei fau- ligen, schwammigen Geschwüren, bei Flek- ten der Hornhaut, als Niesemittel und bei Kindern in Klystieren als Wurmmittel.	Pty- san. Sy- rup. Ger- sten- zuck- er. Pul- ver.		Das ächte Zuckerrohr wächst ur- sprünglich in Ostindien wild. Die Kunst Zucker aus diesem Roh- re zuzube- reiten soll erst in der Mitte des 15ten Jahr- hunderts entdeckt seyn. III. Cl. II. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Mel. (Mel com- mune et virgine- um.)	Honig.	Apis melli- fica.	1) Mel de- spumatum. 2) Mel ro- satum. 3) Oxymel simplex. (4) Oxy- mel ae- ruginis. 5) Oxy- mel scil- liticum.)	1) Zuckerar- tiges Salz. 2) Schleim. 3) Säure. 4) Aroma.
Radix Dauci.	Möhre, Mohr- rübe, gelbe Rübe.	Daucus Ca- rota.	1) Roob Dauci.	1) Zucker. 2) Schleim.

2. Gartengewächse,

Diese Mittel enthalten Zuckersäure mit andern vege-
stoff, ein aetherisches und aromatisches Princip. Sie sind





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Ist auf- lösender und ab- führen- der als Zucker, eben- falls rei- zender und er- hitzen- der und erzeugt leicht Blähun- gen; die Se- und Excre- tion ver- meh- rend, näh- rend, antisep- tisch.	Innerlich: 1) Bei Brustkrankhei- ten, Lungenentzün- dungen, Halsent- zündungen. 2) Bei hartnäckigen Verstopfungen des Unterleibs und Krankheiten der Urin- werkzeuge. Außerlich zur Rei- nigung der Geschwüre und Maturation der- selben.		ʒi—ʒij	
Auflö- send, einhül- lend, näh- rend.	Innerlich bei Rha- chitis, Scropheln der Kinder, gegen Wür- mer. Außerlich bei Krebs- haften Geschwüren.	Rü- ben- Saft. Ge- schabt.		Häufig in Wäldern wild, in Gärten cul- tivirt. VI. Cl. II. Ord.

Obst und Früchte.

stabilischen Säuren gemischt, Schleim, Wasser, Extractiv-
führend, antiphlogistisch, das erhöhte Gefäßsystem min-

dernd, eröffnend, laxirend, dabei nährend, die Galle ver-
 cher Magen, indem hierdurch Säure, Durchfall und Fla-

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Baccae fragariae.	Erdbee- ren.	Fragaria vesca.	1) Aqua fragariae. 2) Syrupus fragariae.	1) Schleim. 2) Wasser. 3) Aroma. 4) Säure.
Baccae Rubi Idaei.	Himbee- ren.	Rubus Idaeus.	1) Aqua ru- bi idaei. 2) Acetum rubi idaei. 3) Syrupus rubi idaei.	
Baccae Mori.	Maul- beeren.	Morus ni- gra et alba.	1) Roob mororum.	
Baccae Myrtillo- rum.	Heidel- beeren.	Vaccinium Myrtillus.	1) Syrupus Myrtillo- rum.	
Baccae Berberis.	Berber- isbeeren.	Berberis vulgaris.	1) Syrupus Berberis. 2) Roob Berberis.	





sternend, antiseptisch. Contraindicantia sind: ein schwaches
 lenz erzeugt wird.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Rüh- end, wohl- smek- kend.	1) Gegen Schwind- sucht, vorzüglich bei der floriden. 2) Beim Podagra. 3) Bei Steinbeschwer- den.	▽ Sy- rup. Früch- te. Blät- ter.	q. s.	Wild in Wäldern, in Gärten ge- zogen. XII. Cl. V. Ord.
	In hitzigen und fau- ligen Krankheiten.	▽ Sy- rup. Essig. Früch- te.	q. s.	XII. Cl. V. Ord.
	Ebensalls zu kühlen- den Getränken.	Sy- rup. Früch- te.	q. s.	Ursprüng- lich in Per- sien und Sy- rien, bei uns angebaut. XXI. Cl. IV. Ord.
zusam- menzie- hend.	Die frischen Beeren bei habituellen Diar- rhöen.	De- coct.	q. s.	Ueberall in Wäldern. VIII. Cl. I. Ord.
	In hitzigen Krank- heiten sehr erquickend.	Sy- rup.	q. s.	Wild in ganz Euro- pa, im nörd- lichen Asien und Ame- rika. VI. Cl. I. Ord.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Baccae Ribium rubrum.	Johannis- beeren.	Ribes ru- brum.	1) Syrupus Ribium. 2) Roob Ri- bium.	
Baccae Grossula- riae.	Stachel- beeren.	Ribes Gros- sularia.		
Vinum. Uvae vitis.	Wein. Wein- trauben.	Vitis vini- fera.	1) Rosinen. 2) Korin- then. 3) Most. 4) Wein. 5) Wein- essig.	
Citrus. Malum ci- tri. Poma citri.	Zitro- nen.	Citrus me- dica.	1) Syrupus citri. 2) Syrupus succi citri s. Syrup. Acetosita- tis citri. 3) Syrupus corticum citri. 4) Elaeo- saccharum citri.	1) Aepfel. 2) Zitronen- säure. 3) Schleim. 4) Extrac- tivistoff. 5) Kali.






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	Sehr zu empfehlen bei entzündlichen Zu- ständen, als bei Ent- zündungen des Hal- ses, Aphthen, Exulcera- tionen des Mundes.	Sy- rup.	q. s.	Es giebt ro- the, weiße u. schwarze. Im nördl. Europa wild. V. Cl. I. Ord.
			q. s.	Wild, und in Gärten ge- zogen. V. Cl. I. Ord.
Rüh- lend, ge- linde ab- führend, antisepti- sch.	Die frischen Trau- ben und Rosinen bei der Schwindsucht, bei der Ruhr, beim chro- nischen Husten und Hei- serkeit.	Trau- ben. Pflst. Thee.	q. s.	In Spa- nien, im Orient wild, bei uns ge- baut. V. Cl. I. Ord.
	1) Bei hitzigen Fie- bern. 2) Bei Faulfiebern und Scorbut. 3) Beim Wechselfieber. 4) Bei Krankheiten der Leber, Gelbsucht. 5) Bei Vergiftungen durch Narcotika. 6) Beim Erbrechen. Außerlich bei scor- butischen Geschwüren.	Limo- nade. Sy- rup. Saft mit Rasse oder Kali.	q. s.	In Persien und Ostin- dien wild, in Spanien, Portugal und Sici- lien ange- pflanzt. Limonas den pul- ver: 1 lb Zucker mit dem Gelben von 4 Zitronen abgerieben, den Saft derselben zu- getröpfelt,

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			5) Sal citri. 6) Oleum citri s. de Cedro. 7) Limona- denpulver.	
Poma Aurantio- rum imma- tura.	Unreife Pome- ranzen.	Citrus Au- rantium.	1) Aqua flo- rum Au- rantii, s. Naphae. 2) Extrac- tum corti- cum Au- rant. 3) Tinctura cort. Au- rant. 4) Syrupus cort. Au- rant. 5) Condi- tum cort. Aurant. 6) Oleum Berga- motte.	
Malum Sinicum.	Apfel- sine.	Citrus Au- rantium Si- nensis.		





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
				getrocknet, pulverisirt und dann $\frac{1}{2}$ H Weinsteinsäure zugefetzt. XVIII. Cl. III. Ord.
Reizend, stärkend besonders auf den Magen, etwas erhitzend, Blähung treibend.	1) Bei geschwächter Verdauung, Magendrücken und Blähungen. 2) Beim Wechselfieber. 3) Bei Krämpfen. 4) Bei Cachexien und Blutflüssen.	Pulver. Decoct.	ʒi—ʒj	In Ostindien wild und im südlichen Europa angepflanzt. XVIII. Cl. III. Ord.
Kühlend, erfrischend.	Bei hitzigen Fiebern, Schwindsuchten.			Es ist eine Spielart der Pomeranzen. XVIII. Cl. III. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Poma acidula.	Apfel.	Pyrus Malus.	1) Tinctura martis pomata. 2) Unguentum ad labia Rosenstein. 3) Vinum pomatum. (Cyder.)	
Cerasa acida.	Saure Kirschen.	Prunus Cerasus.	1) Aqua cerasorum. 2) Syrupus cerasorum. 3) Roob cerasorum.	1) Zitronensäure. 2) Apfelsäure.
Fructus cydoniae.	Quitte.	Cydonia vulgaris s. Pyrus cydonia.	1) Syrupus cydon. 2) Pulpa cydoniarum. 3) Mucilago cydon. 4) Tinctura martis cydon.	1) Schleim. 2) Adstringens.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Kühlend, nährend, beruhigend.	1) Bei Krankheiten der Brust, Heiserkeit. 2) Als Hausmittel bei der Hypochondrie.	Pths. Gebrautene Apfel.	q. s.	In Europa angepflanzt. XII. Cl. IV. Ord.
Kühlend, eröffnend, Blähung und auch wohl Durchfall verursachend.	1) Bei hitzigen Krankheiten. 2) Als Hausmittel bei Verstopfungen des Unterleibs, Hypochondrie, Ruhr.	Pths.		Ursprünglich im Orient, bei uns angebaut. Die süßen Kirschen (Cerasa nigra) kommen von Prunus avium und werden gleich wie Jene benutzt. XII. Cl. I. Ord.
				Auf Creta, im südlichen Europa wild. XII. Cl. IV. Ord.

Officieller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Prunus.	Pflaume.	Prunus domestica.	1) Pulpa prunorum. 2) Roob prunorum.	
Cucumis.	Gurke.	Cucumis sativus.		
Melo.	Melone.	Cucumis Melo.		





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Gelinde abführend, aber sehr nahrhaft.	Bei hitzigen Krankheiten um den Stuhlgang zu befördern.	Muß.	q. s.	Ursprünglich in Deutschland wild. XII. Cl. I. Ord.
Der Saft sehr kühlend, heftige Schweisse unterdrückend, die erhöhte Gefäßthätigkeit mindernd.	Bei Abzehrungen und Bluthusten, des Morgens nüchtern. Contraindicationen sind: Schwäche der Verdauungswerkzeuge und Neigung zum Durchfall.	Saft.	$\frac{1}{2}$ — 1 Tasse.	Unbekannt ihr Vaterland; bei uns gepflanzt. XXI. Cl. VIII. Ord.
Der Gurke analog, doch mehr kühlend, und Durchfall verursachend.	Früher in Schwinden suchen bei hitzigen Krankheiten.			Ursprünglich im Orient, bei uns gepflanzt. XXI. Cl. VIII. Ord.

Officinneller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Pulpa Tamarin- dorum.	Tama- rinden.	Tamarin- dus indica.	1) Pulpa Tamarin- dorum. 2) Serum lactis Ta- marindo- rum. 3) Infusum Tam. c. fol. Sennae. 4) Electua- rium leni- tium.	1) Säure. 2) Schleim. 3) Zuckerst. 4) Wein- steinarti- ges Salz.
Ficus, s. Caricae.	Feigen.	Ficus Ca- rica.		1) Zuckerst. 2) Schleim.
Cubebae.	Cube- ben, Schwin- delkör- ner.	Piper Cu- beba.		<i>fr. von Salz. opprisse unverändert</i>
Manna 1) M. in la- crymis. 2) M. can- nulata. 3) M. ca- labrina. 4) M. elec-	Manna.	Fraxinus rotundifo- lia. Hedysa- rum Alhagi.	1) Syrupus Mannae. 2) Electua- rium de Manna. 3) Infusum	1) Zuckerst. 2) Schleim. 3) Kleber. 4) Gelbfär- bender Stoff.

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Rührend, abführend.	1) Als gelindes Abführungsmittel bei hitzigen Fiebern. 2) Bei gastrischen Affectionen. 3) Bei Anhäufung verdorbener Galle. 4) Bei Blutbrechen.		Zi — ∇ 3vj.	In Ost- und Westindien wachsend. XVI. Cl. I. Ord.
Stark nährend, erschlafend, einhüllend.	Innerlich bei Brustbeschwerden, catarrhalischem Husten, Strangurie. Aeußerlich um Abscesse zur Eiterung zu bringen.	Decoct.		In Asien und im südlichen Europa wachsend. XXIII. Cl. II. Ord.
	Sonst in Brustkrankheiten, Asthma, Reizhusten und im letzten Stadium der Lungenentzündung.		3.ß.	Zu Java, Malabar. Indien. II. Cl. III. Ord.
Der frische Saft nährend, der getrocknete kühlend, abführend.	1) Bei Krankheiten der Brust. 2) Bei entzündlichen acuten Krankheiten. 3) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge.	Eleetuarkum. Subst.		Frax. rot. wächst im südlichen Europa wild. Der Manna fließt als Saft aus dem Stamm.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
5) M. crassa s. in sortis.			laxativum Vienn.	

3. Kühlende

Diese Mittel erhalten wir aus den Stengeln, Wurzel, Zuckerstoff und auch ein zusammenziehendes Princip. Ihre Wirkung auf das Gefäßsystem depressirend, Husten und erhöhte Reizung vermindern, Eiterungen verbessern. Anwendung: überhaupt bei allen Dyscrasien; 2) bei Abzehrungen, und brandigen, Krebsartigen Geschwüren. Man gebraucht gepreßte und ihn alle Morgen nüchtern frisch genießen läßt,

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Beta rubra.	Roth- rübe, Mang- gold.	Beta vulga- ris.		

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosß.	Anmerkungen.
				XXIII. Cl. II. Ord. Hed. A. in Palästina. XVII. Cl. IV. Ord.

Pflanzensäfte.

zeln, und Blättern einiger Pflanzen. Sie besitzen Schleim, Wirkung ist Säfte verdünnend, kühlend, die Bewegung der Lungen beruhigend, schmerzstillend, Entzündung 1) bei verdorbenen Säften, Scorbut, Arthritis, Scropheln, hektischen Fiebern, Schwindsucht; 2) bei Entzündungen diese Mittel im Frühling, wo man den Saft aus ihnen zu 1 — 2 Tassen voll.

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosß.	Anmerkungen.
	Innerlich gegen Lungeneiterungen, Schwindsuchten. Aeußerlich bei Aphthen, Excoriationen des Mundes.	Saft. Sal. lat.	q. s.	An den Meerufern des südlichen Europa wild, bei uns gepflanzt. V. Cl. II. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Folia Brassicae virid. et alb.	Grün- und Weiß- kohl.	Brassica oleracea vi- ridis. Brassica oleracea capitata.	1) Sauer- kohl.	
Pastinaca. (Radix.)	Pasti- nac.	Pastinaca sativa.		
Turiones Asparagi.	Spar- gel.	Asparagus officinalis.		
Herba Chaerifo- lii. Cerefoli- um.	Kerbel.	Scandix Cerefoli- um.	1) Aqua Ce- refolii. 2) Extrac- tum Ce- refolii. 3) Succus Cerefolii rec. ex- press. 4) Serum lactis ce- ref.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	Der Saft aus den Stengeln bei Krebsartigen Geschwüren des Gesichts. Das Sauerkraut empfiehlt Coact gegen Scorbut.	Saft.	q. s.	Ursprünglich in England am Meerstrand wild, bei uns gepflanzt. XV. Cl. II. Ord.
Näh- rend, schmerz- lin- dernd, steinauf- lösend.	Bei Stein- und Urinbeschwerden.	Saft.	—	Auf Wiesen und Tristen wild, in Garten gepflanzt. V. Cl. II. Ord.
Vorzüg- lich harn- treibend.	Bei Wassersuchten und Urinbeschwerden.			Im südlichen Europa wild, bei uns gepflanzt. VI. Cl. I. Ord.
	1) Bei der Schwind- sucht. 2) Bei der Gelsucht. 3) Bei der Wasser- sucht. 4) Bei Hämorrhoidal- beschwerden.	▽. Ex- tract. Saft. De- coct.	—	— — V. Cl. II. Ord.

Officinneller Name.	Trivial	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Nasturti- um aqua- ticum.	Brun- nentres- se.	Sisymbri- um Nastur- tium.		
Herba Petrose- lini.	Petersi- lie.	Apium Pe- troselinum.	1) Aqua Pe- troselini.	
Folia ru- micis ace- tosa.	Sauer- ampfer.	Rumex ace- tosa.		
Beccabun- ga.	Bach- bunge, Quellen- Chren- preis.	Veronica Beccabun- ga.		
Tussilago. (Herba, Flores.)	Huflat- tig.	Tussilago Farfara.	1) Syrupus Tussilagi- nis. 2) Extrac- tum Tussi- laginis.	

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Harn- trei- bend, auflö- send, fäulniß- widrig.	1) Gegen den Scorbut. 2) Bei Verstopfungen des Unterleibs, Was- fersucht.	Saft. Sal- lat.	— —	An Bächen und Quells- ten in Eu- ropa. XV. Cl. II. Ord.
Harn- trei- bend, zerthei- lend.	1) Bei der Wasser- sucht. 2) Gegen Urinbeschwer- den. Aeußerlich als Schönheitsmittel —.	▽. Sup- pe.	— —	In Sardi- nien wild, bei uns ge- pflanzt. V. Cl. II. Ord.
	Vorzüglich beim Scorbut.	Saft. Sup- pe.	— —	Ueberall in Europa auf Wiesen. VI. Cl. III. Ord.
				In kleinen Bächen durch ganz Europa wachsend. II. Cl. I. Ord.
	1) Bei hartnäckigem chronischen Husten. 2) Bei den Scropheln. 3) Beim Scorbut.	Saft. Thee.	— —	An feuchten thonigten Orten durch ganz Eu- ropa. XIX. Cl. I. Ord.

4. Mella-

Diese Mittel besitzen Zuckerstoff, viel Schleim und fördern die Transpiration der Haut und wirken nähren-


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix Graminis.	Quecken, Pflöde, Kleine Graswurzel.	Triticum repens.	1) Extractum Graminis.	1) Schleim. 2) Zucker.
Radix Sarsaparillae Sassa-parillae.	Cassa-parille.	Smilax Sarsaparilla? Smilax syphilitica.		1) Schleim. 2) Acre. 3) Amarum.
Radix Saponariae. (rubrae.)	Seifenkrautwurzel.	Saponaria officinalis.		1) Schleim. 2) Zucker. 3) Acre.

ginea.

ein scharfes Princip (Acre). Sie reinigen die Säfte, be-
der als die Vorigen.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Auflö- send, näh- rend, einhül- lend, ge- linde reizend.	1) Bei allen Versop- fungen und Drüsen- verhärtungen, als bei der Wassersucht, Gelbsucht, Wechsel- fieber —. 2) Bei chronischen Brustkrankheiten. 3) Bei Hautkrankhei- ten, Rheumatismus, Gicht.	De- coct. Ex- tract.	3ß—j. 3ij—3ß ▽3vj.	Ist ein wu- cherndes Un- kraut in ganz Eu- ropa. III. Cl. II. Ord.
Reini- gend, die Haut- ausdün- stung be- för- dernd, näh- rend, harn- trei- bend.	1) In der Syphilis vortrefflich als Nach- cur. 2) Bei verdorbenen Säften, eingewur- zelter Gicht und Rheumatismus.	De- coct.	3j auf ▽16vj.	Der Luftsens- chen- Smis- lay wächst in Amerika. XXII. Cl. VI. Ord.
Einhül- lend, rei- zend.	Gleich dem Vorigen, doch schwächer in sei- nem Wirken.	De- coct. Klyst.	3ß—j ▽3vj.	Im sandi- gen Boden in Europa. X. Cl. II. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestands- theile.
Radix Bardanae.	Reiten- wurzel.	Arctium Lappa et Bardana.		
Radix Liquiritiae s. Glycir- rhiza.	Süß- holz.	Glycirrhiza glabra.	1) Succus Liquiritiae. 2) Syrupus Liq. 3) Pasta Liq. 4) Trochisci Liq. 5) Trochisci Liq. cum opio. 6) Extrac- tum Liq. 7) Pulvis Liq.	1) Schleim. 2) Zucker. 3) Aleber.
Radix Chinae.	China- wurzel.	Smilax Chi- na. Smilax Pseudochi- na.		1) Schleim. 2) Zucker. 3) Acré.



Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Blutreinigend, Hautausdünstung befördernd, urinstreibend.	1) Bei Verstopfungen des Unterleibs. 2) Bei Brustkrankheiten von unterdrückter Hautausdünstung entstanden. 3) Bei der Syphilis. 4) Gegen Steinbeschwerden. 5) Gegen Rheumatismus.	Decoct. Saft.	ʒj $\nabla \text{ʒvj.}$	Ueberall in Europa wild. XIX. Cl. I. Ord.
Einhüllend, nährend, erweichend.	1) Als Expectorans bei Krankheiten der Brust. 2) Als einhüllendes Mittel bei entzündlichen Krankheiten, Strangurie, Tripper u. s. w. 3) Bei Durchfällen und Ruhren. 4) Zur Verbesserung des Geschmacks.	Syrup. Decoct. Pulver. Extract.	ʒʒ—j. ʒʒ—j.	Im südlichen Europa wild wachsend. Sie ist auch ein vortreffliches durststillendes Mittel, daher den Wassersüchtigen sehr erquickend.
	Im Jahre 1585 wurde sie in Europa durch Kaiser Carl V. bekannt, der sie gegen Sicht gebrauchte. Neuerdings gegen Syphilis empfohlen.	Decoct. Pillen.		In China und Japan wachsend. XXII. Cl. VI. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix Lapathi acuti.	Grind- wurzel.	Rumex acutus.		
Astragalus.	Schaf- loser Tra- ganth.	Astragalus exscapus.		

C l a s-

A m a-

Wir erhalten dieselben sowohl aus dem Pflanzen- als Extractivstoff, den Bitterstoff. Sie lösen sich in Wasser und sind in Schwefeläther unauflösbar. Ihre Wirkung ist nicht erhitend, aber äußerst durchdringend, vermehrt Kraft. Sie sind die besten Wurmmittel, denn sie sind denzeitig die Verdauungswerkzeuge.

1) Amara

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Taraxacum. (Herba et Radix.)	Löwen- zahn.	Leontodon Taraxacum.	1) Extrac- tum Ta- raxaci.	1) Bitterst. 2) Schleim. 3) Seifen- artiges Princip.
Radix Cichorii.	Cicho- rien- wurzel.	Cichorium Intybus.	1) Syrupus Cichorii.	



2248 2117m

s i s IV.

r a.

Thierreich und bemerken in ihnen eine Modification des und Weingeist zugleich auf, haben einen bitteren Geschmack erstreckt sich vorzüglich auf das irritable System, ist stärken Tonus der Muskelfaser und hebt intensiv die Lebenswärmen der Bittere wegen zuwider und stärken gleich-

simplicia.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Auflö- send, stär- kend, die Secre- tionen beför- dernd.	1) Bei Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibs, Hypochondrie, Melancholie.	Saft.	3j.	Auf Wiesen und an Bergen in Europa wachsend.
	2) Im zweiten Stadium der hitzigen Krankheiten; vorzüglich der Urinwerkzeuge.	Ex- tract in Pil- len,	3j—jj	
	3) Beim Wechselfieber.	Aufs.		
	4) Bei Wassersuchten.			
	5) Bei hartnäckiger Gicht und Rheumatismus.			XIX. Cl. I. Ord.
	Als Surrogat des Rassees.			Wild und auch gepflanzt.
	Bei der Gelbsucht von van Swieten empfohlen.	Deco- coct.		XIX. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Triolal.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Herba Trifolii fibrini.	Fieber- flee, Biber- flee, Wasser- flee.	Menyan- thes trifo- liata.	1) Extrac- tum trifo- lii. 2) Tinctura trifolii.	
Herba Centaurei minoris.	Taus- sendgül- den- kraut.	Gentiana Centauri- um. Erythraea Centauri- um.	1) Extrac- tum cen- taurei.	1) Bitterst. 2) Kalk.
Herba fumariae.	Erd- rauch, Tauben- tropf.	Fumaria officinalis.	1) Extrac- tum fuma- riae.	1) Bitterst. 2) Eiweißst. 3) Salzsau- res Kalk.





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosß.	Anmer- kungen.
Stär- kend, zusam- menzie- hend, auflö- send.	1) Bei Schwäche des Magens, Flatulenz, Durchfall. 2) Bei acuten Krank- heiten. 3) Bei langwierigen Verschleimungen, Würmern —. 4) Bei Wechselfiebern, Sicht, Scorbut —. Außerlich bei Schwä- che des Unterleibs und Würmern.	Saft. Ex- tract. De- coct. Pul- ver. Um- schl. Klyst.	3ß—j 3j—jj 3j 3j —	In tiefen Morästen, an Teichen und Seen im nördli- chen Euro- pa. V. Cl. I. Ord.
Stär- kend, auflö- send.	1) Bei der Sicht. 2) Bei Wechselfiebern. 3) In der Wasser- sucht.	Infus. Ex- tract.	3jj — 3j—jj	Auf Wiesen im nördli- chen Euro- pa. V. Cl. I. Ord.
Sehr küh- lend, die Se- und Excre- tion der Haut beför- dernd.	1) Als Roborans. 2) Gegen Wechselfieber. 3) Gegen Hypochon- drie und Hysterie. 4) Beim gastrischen Fieber. 5) Bei Fehlern der Menstruation. 6) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten.	Saft. Ex- tract. De- coct.	3ß—j 3j—jjj 3ß —	Auf Feldern durch ganz Europa. XVII. Cl. II. Ord.

Officineller N a m e.	Trivial.	Systemati- scher N a m e.	Präparate.	Bestand- theile.
Herba Cardui be- nedicti.	Cardus bene- dicten- kraut.	Centaurea benedicta.	1) Extrac- tum cardui benedicti.	
Radix Gentianae rubrae.	Enzian.	Gentiana lutea.	1) Extrac- tum gen- tianae. 2) Tinctu- ra gentia- nae. 3) Essentia gentianae.	1) Bitterst.
Lignum Quassiae.	Quas- saholz.	Quassia excelsa.	1) Extrac- tum quas- siae. 2) Tinctura quassiae.	1) Bitterst. 2) Adstring. 3) Aethere- um. 4) Kali.
Radix Columbo.	Colum- bowurz zel.	Sie kommt von einer im Lande der Cassern wachsenden	1) Extrac- tum Co- lumbo. 2) Tinctura Columbo.	1) Bitterst. 2) Schleim.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosß.	Anmer- kungen.
Stär- kend, die Secre- tion be- för- dernd.	1) Bei Krankheiten der Brust, Pleuritis und Pneumonie.	Saft.		Auf den griechischen Inseln wild, bei uns ge- baut.
	2) In rheumatischen und arthritischen Krankheiten.			
	3) Bei fauligen, ga- strischen Fiebern.	Ex- tract.	Des- coct.	xix ℥. III Dr.
	4) In der Gelbsucht.			
	5) Bei bössartigen Ge- schwären.			
Ein lan- ger Ge- branch theilt dem Urin und dem Schweiß einen bittern Ge- schmack mit.	1) Ueberall wo bittre Mittel indicirt sind.	Pul- ver.	℞ — j	Auf den ho- hen Gebir- gen der Schweiz und des süd- lichen Eu- ropa. V. Cl. II. Ord.
	2) Als Roborans.	Des- coct.		
	3) Als Barmittel.	Ex- tract.	gr. x — xx —	
	4) Bei Wechselfiebern.	Tink- tur.	gtt Lx.	
Blos stärkend, nicht erhit- zend.	1) Als Roborans bei Hypochondrie, Trin- kern, Pollutionen —.	Pul- ver. Ex- tract.	℞ — —	Im südli- chen Ame- rika.
	2) Bei Durchfall, Ruhr.	Tink- tur.	gtt L	
	3) Bei Schleimflüssen der Brust.	Des- coct.	℞ —	X. Cl. I. Ord.
	4) Bei Sicht und Ca- chexien.	In- fus.	—	
Stär- kend.	1) Bei Magenschwä- che mit großer Reiz- barkeit.	Pul- ver	℞ —	In Afrika einheimisch. Aeußerlich hat Home diese Wur-
	2) Bei chronischen Di- arrhöen.			

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
		unbestimmten Pflanze (Bryonia)?		
Fel s. Bilis Tauri. XIX	Ochsen- galle.	Bos Taurus domesticus.	1) Fel tauri inspissatum.	1) Def. 2) Bitterst. 3) Seifens- artige 4) Resinöse Theile.

2. Amara

Diese Mittel wirken mehr auf die Nerven, entweder Sec- und Excretionen reizend, Letztere befördernd.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Millefolium. (Herba et Flores.)	Schaa- garbe.	Achillea Millefolium.	1) Extrac- tum Mille- folii. 2) Oleum millef. ae- thereum.	1) Bitterer Extractivst. 2) Aetheres um. 3) Cam- phorartiges Princip.





Wir- ung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	3) Bei habituellem Er- brechen. 4) Bei allen Krank- heiten mit Nerven- schwäche.	In- fus.	3j —	zel bei al- ten Ge- schwüren benutzt.
le Thä- tigkeit des Darm- anals ermeh- rend, s Ge- fäßsy- m ex- citirend, ampf- ellend.	Innerlich bei Krank- heiten der Leber, krampf- haften Krankheiten des Unterleibs, chronischem Erbrechen, Säure im Magen, Verschleimun- gen und Störungen des Unterleibs, Wurm- krankheiten —. Aeußerlich bei Wür- mern, Verhärtungen des Unterleibs, Fles- ken der Hornhaut.	Pul- ver.	3j — 3j —	

therea.

citirend oder betäubend; auf das Gefäßsystem und die

Wir- ung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Stär- kend, er- freuend, sam- enzie- hend, nhal- nd rei- end;	1) In allen Krankhei- ten von Schwäche. 2) Bei den Hämor- rhoiden. 3) Bei allen profusen Hämorrhagien. 4) Bei Verschleimung der Brust, Krank- heiten der Urinwerk-	In- fus. Ex- tract. Pul- ver.	3j — 3j — gr. v —	Auf Tristen und trock- nen Wiesen durch ganz Europa häufig wachsend. Die Achil- lea nobilis, die im süd-

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Tanace- tum. (Herba, Flores et Semina)	Rein- farn.	Tanacetum vulgare.	1) Oleum Tanaceti. 2) Extrac- tum Tana- ceti.	1) Bitterst. 2) Aetheri- sches Del.
Herba Absynthii.	Berz- muth.	Artemisia Absynthi- um.	1) Extrac- tum absyn- thii. 2) Essentia absynthii simpl. et comps. 3) Oleum absynthii destil. 4) Oleum absynthii coctum. 5) Sal ab- synthii. 6) Infusum absynthii aquoſum. 7) Infusum absynthii vinosum.	1) Aetheri- sches Del. 2) Bitterex- tractivst. 3) Ess. absynthii 10. 2. 3j - 3℥. 4) Ess. absynthii 2ij - 3℥. 5) Infusum absynthii 10. 2. 3℥ - 4℥. 6) Infusum absynthii 10. 2. 3℥ - 4℥. 7) Infusum absynthii 10. 2. 3℥ - 4℥.

Artes

*Das Grünsel ist
eigentlich, das Gr.
muss jedoch bittren.*

*aus gelblich. Kalk
beigefarbt.*


*essenz. absynthii 10. 2. 3j - 3℥.
ess. absynthii 2ij - 3℥.
infusum absynthii 10. 2. 3℥ - 4℥.
infusum absynthii 10. 2. 3℥ - 4℥.*

*8) Ess. absynthii 10. 2. 3j - 3℥.
9) Ess. absynthii 2ij - 3℥.
10) Infusum absynthii 10. 2. 3℥ - 4℥.
11) Infusum absynthii 10. 2. 3℥ - 4℥.*

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
specifisch auf's Ge- fäßsy- stem.	zeuge, Krämpfen, Co- liken, schmerzhaften Nachwehen und zur Beförderung der Men- ses. Außerlich beim wei- ßen Fluß und unrel- nen Geschwüren.			lichen Euro- pa wächst, ist kräftiger, und ver- dient, wo man sie ha- ben kann, den Vorzug. XIX. Cl. II. Ord.
Stär- kend, er- hitzend, wurm- trei- bend, antihy- sterisch.	1) Bei Würmern. 2) Als Roborans bei Krankheiten des Un- terleibs.	In- fus. Ex- tract. Del.	3j—3ij	Ueberall an Wegen wachsend. XIX. Cl. II. Ord.
Stär- kend, er- hitzend. Wegen seines ätheri- schen Dels macht es leicht Erhit- zung, Wallun- gen und Kopf- schmerz.	1) Ueberhaupt bei Ma- genschwäche, bei Wechselfiebern. 2) Gegen Sicht. 3) Gegen Würmer, vorzüglich gegen den Bandwurm. 4) Bei Stockungen der Leber. Außerlich bei De- dem der Füße, gegen Würmer.	De- coct. Ex- tract. In- fus. Del. Es- senz. Saft. Um- schl. <i>Linum</i>	3ij <i>1/2</i> 3ij <i>1/2</i> 3ij <i>1/2</i> gtt Lx. 3ß—j.	Ueberall in Europa. <i>und bey</i> <i>bestand nach</i> <i>vielen Pflanzen.</i> <i>und Kij. Rins, Wein, Y.</i> XIX. Cl. II. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Vestandstheile.
Turiones humuli. (Coni humuli.)	Hopfen.	Humulus Lupulus.	1) Extractum humuli. 2) Oleum dest. humuli. 3) Tinctura humuli.	1) Harz. 2) Narcotikum. 3) Extraktivstoff.
Herba Marrubii albi.	Weißer Andorn.	Marrubium vulgare.	1) Extractum marrubii.	
Herba Veronicae.	Ehrenpreis.	Veronica officinalis.		
Herba Scordii.	Lachenknolauch.	Teucrium Scordii.	1) Essentia Scordii.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form	Dosis.	Anmer- kungen.
Stär- kend, auflö- send, ex- citirend, specifisch erhit- zend aufs Gefäß- system, Säure tilgend, Urin trei- bend.	Innerlich als Robo- rans und in Wech- selfiebern. Aeußerlich bei Fuß- geschwülsten, bei Taub- heit und als stärken- des Mittel in Klystie- ren.	Ex- tract. Del.	3j — ▽3j	An Zäunen, Hecken durch ganz Europa wild, auch in Gärten gezogen. XXII. Cl. V. Ord.
Reizend, auflö- send, Aus- wurf besör- dernd.	1) Bei asthmatischen Krankheiten der Brust und des Un- terleibs. 2) Bei Verschleimun- gen, Verstopfungen der Leber.	De- coct. In- fus. Saft.	3ß — j — 3j — jii	Ueberall um Städte und Dörfer wild. XIV. Cl. I. Ord.
Urin trei- bend.	Ehemals häufig ge- gen chronische Brust- beschwerden, Husten, Asthma, Lungensucht.	Thee.		In trocknen Gegenden aller Welt- theile. II. Cl. I. Ord.
Specifisch auf die Haut und Nerven, reizend, antiseptisch.	1) Bei fauligen Ner- venfiebern. 2) Im Scorbut und Brande. 3) In chronischen Brustkrankheiten.	De- coct. In- fus.	3ß —	Auf Wiesen wild wach- send. XIV. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Caryo- phyllata.	Nelken- wurzel.	Geum ur- banum.	1) Tinctura caryophyl- latae. 2) Extrac- tum caryo- phylla- tae.	1) Aroma. 2) Adstrin- gens. 3) Amarum.
Cortex Cascaril- lae.	Casca- rillen- rinde.	Croton Cascarilla s. Croton Elu- theria. Clusia Elu- theria.	1) Extrac- tum Cas- carillae aquosum. 2) Tinctura Cascaril.	
Cortex Angustu- rae.	Angu- stura- rinde.	Bonplandia trifoliata.	1) Tinctura corticum Angustu- rae. 2) Extrac- tum corti- cum An- gusturae aquosum.	1) Schleim. 2) Harz. 3) Bitterst.



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Nicht nur stär- kend, sondern auch ge- linde zu- sammen- ziehend, reizend, daß Ge- fäßst- em ex- citi- rend.	1) In allen Krankhei- ten von Nerven- schwäche. 2) Im Wechselfieber. 3) In Nervenkrankhei- ten (per excess. in venere etc.) 4) Bei langwierigen Durchfällen und Ruhr. 5) In der Wassersucht.	Pul- ver. De- coct. Tink- tur.	3ß—j 3j — 3j—jj	In schattis- gen Wäl- dern durch ganz Eu- ropa. XII. Cl. V. Ord.
Zusam- menzie- hend, reizend, erhit- zend, profuse Darm- auslee- rungen min- dernd, stopfend.	1) Bei Durchfällen. 2) Bei der Atrophie. 3) Bei Wechselfiebern. 4) Bei Verschleimun- gen der Brust und an- fangender Schwind- sucht.	Pul- ver. De- coct. In- fus. Ex- tract. Tink- tur.	3ß—j 3ß — — 3ß — 3ij —	Im südli- chen Ameri- ka, Peru. Contrain- dicantia: Entzündung und Unrei- nigkeit der ersten Wege. XXI. Cl. VIII. Ord.
Stär- kend, reizend.	1) Bei chronischen Durchfällen. 2) Bei Wechselfie- bern. 3) Bei periodischen Krankheiten, die sich auf Schwäche grün- den. 4) Bei Nervenfiebern und fauligen Krank- heiten.	Pul- ver. De- coct. Ex- tract.	3ß—j 3jj—jv	Südameri- ka, Afrika. V. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Calami aromatici.	Cal- mus- wurzel.	Acorus Ca- lamus.	1) Tinctura rad. Ca- lami. 2) Extrac- tum rad. Calami.	1) Aroma. 2) Acre. 3) Amarum. 4) Abstrin- gens.
Cortex Aurantio- rum, s. Flavedo cort. au- rant.	Pome- ranzen- schaa- len.	Citrus Au- rantium.	1) Extrac- tum cort. Aurant. 2) Tinctura cort. Au- rant. 3) Syrupus cort. Au- rant. 4) Aqua cort. Au- rant. 5) Oleum cort. Au- rant. 6) Spiritus cort. Au- rant. 7) Condi- tum cort. Aurant. 8) Bischoff.	

3. Amara

Diese Mittel zeichnen sich durch einen zusammenzie-
beständiger werden, und permanenter als die Vorigen






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Kräftig reizend, Blä- hung trei- bend, erhit- zend, stärkend.	1) In typhösen Fie- bern.	Pul- ver.	ʒß —	Ueberall in Europa in Teichen und Gräben.
	2) In Wechselfiebern.	Zink- tur.	3ß —	
	3) In chronischen Gichtbeschwerden und Rheumatismus.	Des- coct.	3jj —	
	Außerlich bei Flech- ten, hartnäckigen Fuß- geschwüren und Rha- chitis.	In- fus. Bad.	— ℥ß —	
Sehr er- hitzend, reizend, stärkend, beson- ders auf den Ma- gen und Blä- hung trei- bend.	1) Bei Magenschwä- che, Magendrücken und Windcolik.	Pul- ver.	ʒi —	Im Oriente wachsend.
	2) Bei Cachexien und Hämorrhagien.	In- fus.	3jj —	
	3) Beim Wechselfieber.	Des- coct.	—	
	4) Bei Krämpfen.	Zink- tur.	3ß —	
	Nachtheilig ist sie bei Wallungen und Congestionen.			XVIII. Cl. III. Ord.

adstringentia.

henden Stoff (Gerbestoff) aus, weshalb sie auch fixer und wirken. Sie sind weniger flüchtig und erhitzend, wirken

mehr auß irritabile, als sensible System und vermehren sind und nicht von jedem Subjekte in gleicher Form ver-
tel zu und reicht sie dann in der passendsten Form.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Cortex Salicis.	Weiden- rinde.	Salix alba. Salix pent- andra. Salix vitel- lina. Salix fragi- lis etc.	1) Extrac- tum cort. Salicis.	1) Amarum. 2) Aroma. 3) Adstrin- gens.
Cortex Hippoca- stani.	Kasta- nienrin- de.	Aesculus Hippoca- stanum.	1) Extrac- tum cort. Hippoca- stani.	
Cortex Simaru- bae.	Ruhr- rinde, Sima- ruben- Quassia.	Quassia Si- maruba.		
Cortex Fraxini.	Eschen- rinde.	Fraxinus excelsior.		



den Tonus der Muskelfaser. Da sie schwer zu verdauen tragen werden, so setzt man gewöhnlich aromatische Mit-

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Sehr zusam- menzie- hend, weniger durch- drin- gend als die Chi- na.	Sie wird oft statt der China benutzt, vor- züglich bei unreinen, brandigen Geschwü- ren, profusen Saliva- tionen, Knochenfraß.	De- coct. Ex- tract. Pul- ver.	3ß—j 3j—jij 3j —	Ueberall in Europa. XXII. Cl. II. Ord.
Anhal- tend rei- zend, stär- kend, zu- sam- menzie- hend.	1) Bei asthenischen Blutflüssen und Pro- fluvien aller Art, die von Exaltat und Schwäche der Or- gane herrühren. 2) Bei Wechselfieber. Außerlich bei un- reinen Geschwären.	Pul- ver. De- coct. Ex- tract.	3j — 3ß — 3j	Im nördli- chen Persien wild und 1550 zuerst nach Euro- pa gebracht. VII. Cl. I. Ord.
	1) Bei allen schleimi- gen Profluvien, Diarrhöe, Dissente- rie, Tripper, wei- ßem Fluß, Leberfluß, Schwindsucht —.	De- coct.	3ß —	Im südli- chen Ame- rika wild. X. Cl. I. Ord.
		De- coct.	3ß—j	In ganz Europa wild. XXIII. Cl. II. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Cortex Chinae.	Chinarinde. Fiebersrinde.	Cinchona officinalis.	1) Pulvis corticis Chinae.	1) Bitterst. 2) Gerbest. Dieser bildet beim Zusatz von Eisen einen schwarzen Niederschlag.
Die verschiedenen Arten der China sind:			2) Infusum Chinae frigidum.	3) Essentia Chinae simplex.
1) Cortex Chinae flavas, s. regius.	Königsrinde. Gelbe Chinarinde.	Cinchona cordifolia Mutis? Cinchona pallescens Ruiz.	4) Extractum Chinae frigidum parat.	3) Erdige, schleimige Theile.
Sie ist erst seit dem Jahre 1790 officinell; ist orangengelb, von rostiger Farbe, wird dunkler je länger sie dem Lichte ausgesetzt ist, ist äußerlich mit einer aschgrauen Haut überzogen, im Bruche faserig, leicht zu pulverisiren und von zusammenziehendem Geschmack.			5) Extractum Chinae vinosum.	4) Ein flüchtig, harziges Princip, das durch Kochen verängert wird.
			6) Tinctura Chinae ammoniata.	Neuere Chemiker nehmen in ihr ein eigenes Chinasalz an.
			7) Elixir roborans, s. Tinctura Chinae composita.	
			8) Infusum Chinae calidum.	

ad. 1. Febr. intermittens malignus.

ad. 2. Kindische Kräftigung, Augen auszu-
süßend und schlafend.
Tafel und Besondere.

ad. 3. Nasenpfeifen.

ad. 4. Eitrige fließende Blasen (Blutblasen)
Sphacelus.

ad. 6. Nase, Nasenrinne und nasale Nase

ad. 7. Heftig. Phthysis.

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Zusammenziehend, lindern, die Cohärenz sowohl der festen als flüssigen Theile vermehrend. Sie ist das größte Stärkungsmittel in allen Krankheiten von Schwäche, die Lebenskraft erhöhend. Specifisch	Innerlich: 1) Bei allen periodischen Krankheiten, z. B. beim Wechselfieber, Malaria. Die Dosis muß hier vor dem Anfalle verdoppelt werden und während dem Anfalle ausgesetzt bleiben. Eben so auch bei Magenkrämpfen, Kopfschmerz, Colik, Melancholie. 2) In allen Nervenkrankheiten, Ausschweifungen, heftigen Gemüthsbewegungen, im Nervenfieber, bei der Catalepsie, dem Starrkrampf und vorzüglich im zweiten Stadium des Reuchhustens. 3) Wo Genesung zu Zerfetzungen der	Pulver. Electuarium. Decoct. Infus.	℥i in der Apyrexie. ℥i — ∇ ℥vj ℥ii —	Im südlichen Amerika, Peru, Westindien. Die Chinarinde wurde zuerst im J. 1636 bekannt. 1640 kam sie durch die Gräfin del Cinchon nach Spanien, dann nach Italien und 1649 ließ sie der Papst Innocenz X. chemisch untersuchen. 1679 verkaufte sie Robert Labort als geheimes Mittel an den König von Frankreich, Ludwig XIV. Seit


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
2) Cortex Chinae ruber. Sie ist dun- kelroth, äu- ßerlich mit weiß, gelb und asch- farbenen Flecken be- sprengt, in kleinen Stücken zu- sammenge- rollt, im Bruche we- niger faser- ig, aber mehr resi- nös. 1779.	Rothe China- rinde. Spani- sche Chi- narinde.	Cinchona oblongifo- lia Mutis?	9) Decoc- tum Chi- nae. 10) Extractum <i>chinae</i> <i>aqueum</i>.	
3) Cortex Chinae fuscus, a. officinalis, Peruvia- nus, Kina Kinae. Sie ist dü- ßerlich glatt, asch- farben, in- nen glän- zend zimmt- roth, braunroth, im Bruche kurzspalt- rig. Die	Ge- wöhnli- che Chi- narinde.	Cinchona Condami- nea Hum- boldt.		






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
scheint sie aufß Nerven-System zu wirken, eben so gegen alle periodische Krankheiten.	Säfte statt findet, als beim Scorbut, fauligen Fiebern. 4) Bei Vereiterungen, hartnäckigen Geschwüren, Knochenfraß. 5) Bei allen Cachexien, als in den Scropheln, der Rhachitis, Wassersucht. 6) Bei allen passiven Profluvien, Diarrhöen —. 7) Bei allen abgehenden Brustkrankheiten. Äußerlich: 1) Gleichzeitig mit dem innern Gebrauche verbunden oder da wo die Magenschwäche den innern Gebrauch verbietet. 2) Bei äussern Krankheiten, als Geschwüren fauliger, brandiger Art, Knochen-	Ex-tract. Tink- tur. Syr- rup. Klyst. Pul- ver. Des- coct. Tink- tur.	3j—jjj ▽3vj 3j — als Zu- satz.	dieser Zeit ist sie allge- mein ge- worden und zu ihrer Verbrei- tung hat Syden- ham vor- züglich bei- getragen. Contrain- dicantia. 1) Ein ent- zündlicher Zustand. 2) Unreinig- keiten der ersten Wege. 3) Das cri- stische Sta- dium. 4) Verhär- tungen, z. B. Tuber- keln in den Lungen. 5) Unter- drückte Ex- pectora- tion, trock- ner Husten.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Abkochung derselben sieht warm rothbraun, kalt gelb lehmartig aus.				






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	fraß, Brand, wei- ßem Fluß, Krank- heiten der Zähne.	Bad.		V. Cl. I. Ord.

C l a s - A d s t r i n -

Außer dem Alaun, kommen sämtliche Mittel aus er ist geruchlos und verliert durchaus nichts beim Kochen. Sie theilen auch andern Mitteln ihre zusammenziehende, vermehren die Cohäsion der Faser und vermindern das Saßsystem, vermindern die Reizbarkeit der Gefäße, ohne den Tonus und stimmen die Reizbarkeit derselben herab. An Blutflüssen, wenn sie auf Schwäche beruhen, bei Krankheiten aller Nervenkrankheiten die von Schwäche, erhöhter Reiz-

Officinneller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix Consolidae majoris.	Schwarz- wurzel, Weinweil.	Symphy- tum offici- nale.		1) Schleim. 2) Adstringens.
Radix Pyrethri.	Bert- ram- wurzel, Spel- schelwur- zel.	Anthemis Pyrethrum.	1) Extrac- tum pyre- thri.	






s i s V.

gentia.

dem Pflanzenreich. Der Gerbestoff herrscht in ihnen vor, then, daher auch diese Mittel sehr kräftig als Decocte ziehende Kraft mit, widerstehen sehr kräftig der Säul- die Auflösung der Säfte. Specifit wirken sie außs Ge- zu erhitzen, eben so vermehren sie die Cohäsion der Ner- wendung: in allen profusen Ge- und Excretionen, bei ten der Muskeln, die sich auf Laxität gründen und bei barkelt herrühren.

Wir- fung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Einwik- kelnd, einhül- lend, stär- kend, zu- sammen- ziehend.	Da wo Stärkung in- dicirt ist, und große Reizbarkeit vor- herrscht, als: in Dis- senterien und sonsti- gen Profluvien des Darmkanals, Hämor- hagien, Krankheiten der Urinblase und Nie- ren.	De- coct.	3j —	In Morä- sten durch ganz Eu- ropa. V. Cl. I. Ord.
Die er- höhte Reizbar- keit der Nerven herab- stim- mend, zusam- menzie- hend.	1) In Nervenkrank- heiten: bei Epilep- sie, Cataleptie, Hy- stérie. 2) Als Krampfstillen- des Mittel. 3) Beim Reizhusten. 4) Bei Urinbeschwer- den. 5) Bei Diarrhöen.	—	—	Im südli- chen Euro- pa wild. XIX. Cl. II. Ord.


Officiner Name.	Trivial	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Herba Salviae.	Salbei.	Salvia officinalis.		1) Amarum. 2) Aroma. 3) Adstringens.
Radix Lapathi acuti, s. Oxylapathi.	Grindwurzel.	Rumex acutus.		
Cortex Ulmi.	Rüster. Ulmensrinde.	Ulmus campestris.		





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Zusam- menzie- hend, die pro- fusen Excre- tionen unter- drück- end; specifit auf pro- fufe Schwet- ze.	Innerlich bei profu- sen Schweißen und im lezten Stadium der Schwindsucht. 2) Bei Hämorrhagien, vorzüglich des Ute- rus. 3) Beim weißen Fluß. 4) Bei Milchproflu- vien. Aeußerlich bei Aph- ten, der Bräune, dem Scorbut, Knochenfraß, Salivationen.	De- coct. In- fus.	3ij - 3ß —	Im südli- chen Europa einheimisch, bei uns an- gepflanzt. II. Cl. I. Ord.
Specifit auf die Haut.	1) Bei Krankheiten der Haut: Kopf- grind, Krätze, Flech- ten. 2) Bei hartnäckigen chronischen Ge- schwüren. 3) Bei Krankheiten der Nerven und an- fangender Wasser- sucht durch unter- drückte Hautthätig- keit entstanden.	De- coct. Saft. Sal- be.	3ß — j —	Eine an- feuchten Dr- ten häufig wachsende Pflanze. vi. li. III. Ord.
Anhal- tend rei- zend, ge- linde Schwell- und Urin-	1) Bei allen Haut- krankheiten chroni- scher Art. 2) Bei chronischen Schleimflüssen —. 3) Bei anfangender Wassersucht. 4) Beim Scorbut. Aeußerlich bei der Bräune, bei chroni-	De- coct. Gur- gel-	3ij —	In Europa wild.

Officinneller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix <i>Rubiae.</i>	Röthe. Krapp.	Rubia tinc- torum.		
Folia <i>Uvae ursi.</i>	Bären- traube. Sanda- beere.	Arbutus Uva ursi.		
Flores <i>Rosarum.</i>	Rosen- blätter.	Rosa cen- tifolia. { Rosamo- schata. Rosa ru- biginosa. Rosa gal- lica. }	1) Aqua Ro- sarum. 2) Mel Ro- sarum. 3) Oleum Rosarum. 4) Acetum Rosarum. 5) Conser- va Rosa- rum. <i>6) Tinctura Rosarum aucta.</i>	1) Schleim. 2) Aroma. 3) Adstring- gens.






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
treibend.	schen Hautausschlägen, Entzündungen, Schleimflüssen —.	wasser. Bad.		V. Cl. II. Ord.
Stärkend; specifisch auf die Knochen, Urin und Speichel befördernd.	1) Bei Krankheiten der Knochen, Rheumatis, Knochenfraß.	Decoct.	3j	Die Färberröthe wächst im südlichen Europa wild und wird in Deutschland angebaut.
	2) Bei Drüsenkrankheiten, Scropheln.	Pulver.	3ß — j	
	3) Bei profusen Schleimflüssen der Brust —.			
	4) Bei unterdrückter Menstruation, und 5) In der Ruhr.			
Zusammenziehend; specifisch auf die Nieren und Blase, schmerzstillend, diuretisch.	1) Bei Krankheiten der Urinwege, Steinen, im zweiten Stadium des Trippers.	Pulver.	gr. x. — 3ß.	In schattigen Wäldern des nördlichen Europa.
	2) Bei Krankheiten des Uterinsystems, die sich auf Schwäche gründen.	Decoct.	3ß —	
	3) Bei Brustkrankheiten, Schleimschwindsucht.			
Gelinde zusammenziehend, kühlend, analeptisch.	Innerlich bei Brustkrankheiten, langwierigem Schleimhusten, Halsentzündungen. Aeußerlich bei Augenentzündungen, Kopfschmerz, beim weißen Fluß —.	Decoct. ▽ Blätter. Einspr.		In der Gegend des caspischen Meeres wild, bei uns gepflanzt. XII. Cl. V. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			1) Unguentum Rosatum.	

2. Adstrin-

Herba Potentillae.	Fingeraut, Gänse- rich.	Potentilla anserina. Potent. reptans.		
Radix Bistortae.	Schlange- wurz- el, Wiesen- Knöte- rig.	Polygonum Bistorta.		
Radix Tormen- tillae.	Tor- mentill, Ruh- wurz- el.	Tormentil- la erecta.	1) Extrac- tum tor- mentillae.	
Cortex et Glandes Quercus.	Eicheln, Eichen- rinde.	Quercus Robur.		





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
				XII. Cl. V. Ord.
gentia pura.				
Stär- kend, zu- sammen- ziehend.	Innerlich bei Schleim- flüssen, Krankheiten der Nieren, der Brust. Aeußerlich beim wei- ßen Fluß, bei fauli- gen Geschwüren.	De- coct. Ein- spr. Um- schl.	3j	Ueberall in Europa. XII. Cl. V. Ord.
	— — Aeußerlich beim Scorbut, beim Mut- tervorfalle.	De- coct. — —	—	Auf Bergen und Wiesen. VIII. Cl. III. Ord.
	1) In der Ruhr. 2) Bei passiven Blu- tungen. 3) Beim Wechselfie- ber. 4) In der Bräune. 5) In der Lungen- sucht.	—	3j — jj	Ueberall auf trocknem Boden wachsende Pflanze. XII. Cl. V. Ord.
	Die Rinde giebt man innerlich bei Wechsel- fiebern, Profluvien und überhaupt als Surro- gat der China. Aeu- ßerlich bei schlaffen Geschwüren, großer Schwäche, beim Vor- falle der Gebärmutter und des Mastdarms, bei Brüchen.	De- coct. Pul- ver. Bä- der. Um- schl. Ein- spr.	3ß — j. 3j —	In ganz Eu- ropa wach- send.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Gallae.	Galläpfel.	Quercus infectoria. Querc. Cerris et Aegylops.	1) Tinctura Gallae.	1) Phosphor. 2) Zucker. 3) Adstringens.
Lignum Campechiense.	Blutholz, Campechenholz.	Haematoxylon campechianum.	1) Extractum campech.	
Cortex Granatorum s. Malicorium.	Granatrinde.	Punica Granatum.		
Cortex nucum juglandis virid.	Walnußschalen.	Juglans regia.	1) Extractum nuc. juglandis. 2) Oleum nuc. juglandis.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	Die Früchte (Glandes) bei Atrophie, Scropheln, Rhachitis, chronischen Diarrhöen, langwierigen Lungenkrankheiten, Blutungen und serösen Profluvien.	Eis- chel- kast- see.	3jj—3j	XXI. Cl. VII. Ord.
Hef- tig zusam- menzie- hend.	Innerlich bei Wech- selfiebern, Magen- schwäche, Flatulenz. Aeußerlich beim kal- ten Brande, bei fau- ligen Geschwüren, ge- gen Brüche.	De- coct.		Erstere Ei- che wächst im Oriente wild, letz- tere in der Schweiz, Frankreich, Spanien. XXI. Cl. VII. Ord.
	Borzüglich bei Pro- fluvien, chronischen Diarrhöen, Eienterie.	De- coct. Ex- tract.	3ß—j 3j—jj	In Amerika wild wach- send. X. Cl. I. Ord.
	Beim Wechselfieber, bei der Bräune, bei Scorbut und Vorfäl- len.	De- coct. Pul- ver.	3ß—j	Im südli- chen Euro- pa, nördli- chen Afrika und Asien. XII. Cl. I. Ord.
Zusam- menzie- hend, stär- kend, wurm- treib- end.	Innerlich als Wurm- mittel, bei chronischen Durchfällen, Magen- schwäche, venerischen Krankheiten. Aeußerlich bei fau- ligen Geschwüren.	De- coct. Ex- tract.	3j —	Ursprüng- lich in Per- sien, bei uns gepflanzt. XXI. Cl. VII. Ord.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Catechu. Terra ja- ponica.	Catechu. Japoni- sche Er- de.	Acacia Catechu. Mimosa Catechu.	1) Tinctura terrae Ca- techu. 2) Extrac- tum terrae Catechu.	1) Gerbest. 2) Galluss. 3) Gummi. 4) Harz. 5) Extrac- tiosf.
Kino, Gummi Gambi- ense.	Kino.		1) Tinctura gummi Kino.	1) Schleim 2) Harz. 3) Gummi. 4) Adstrin- gens.
Sanguis Draconis e. Succus Draconis.	Dra- chen- blut.	Dracaena Draco. (Calamus Draco.)		1) Harz. 2) Adstrin- gens.
Gummi s. Resina Laccae.	Lack- harz.	Ficus in- dica. Ficus reli- giosa. Rhamnus Jujuba.	1) Gummi Laccae in tabulis. 2) Gummi L. in ba- culis. 3) Gummi L. in gra- nis. 4) Tinctura Laccaespi- rituosa.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Zusammenziehend.	Innerlich bei allen Profluvien, bei Wechselfiebern, Harnfluß— Aeußerlich bei Zahnkrankheiten, beim weissen Fluß.	Pulver. Elect. Decoct.	gr. v — xx.	Ostindien. Die Catechu ist der eingedickte Saft des genannten Baums. XXIII. Cl. II. Ord.
Anhaltend reizend, zusammenziehend.	Innerlich bei Durchfällen von Schwäche, bei Mutterblutflüssen und Schleimflüssen. Aeußerlich bei Blutungen aus kleinen Gefäßen.	Pulver. Tinkt.	gr. jj — xx. gtt xxx — 3j.	Kömmt in Stücken von verschiedener Größe aus Afrika, von einem noch nicht bestimmten Baume.
Zusammenziehend.	Es wird jetzt nur noch als Zahnpulver benutzt.			Ursprünglich in Ostindien wild. VI. Cl. I. Ord.
Gelinde zusammenziehend.	Bei schwammigen Geschwüren, als Vorans beim laxen Zahnfleisch.			Dieses Gummi wird durch den Stich der Lackschildlaus (Coccus Ficus) an den Zweigen jener Pflanze gebildet. xxiii Cl. II Ord.


Officineller Name.	Eritolal.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			b) Tinctura Laccae aquosa.	
Alumen. (crudum.)	Alaun.		1) Alumen cristallisa- tum. 2) Alumen ustum. 3) Serum lactis alu- minosum.	1) Thonerde. 2) Schwe- felsäure. 3) Schwe- felsaures Kali.
Grana	Kermes- beeren.			





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerk- ungen.
Mäßig reizend und stark zu- sammen- ziehend.	Innerlich in allen putriden Fiebern mit Colliquation. 2) Bei hartnäckigen passiven Hämorrhagien. 3) In der Bleicolik. 4) Beim weißen Fluß. 5) In der Harnruhr. 6) Beim Wechselfieber. 7) Bei Durchfällen. 8) Bei Pollutionen. Äußerlich bei scorbutischem Zahnfleisch, als Einspritzung bei Blutungen, bei laxen Geschwüren, Schleimflüssen, hartnäckigen Hautausschlägen, Augenentzündungen —.	Pul- ver. Auß. Mol- ten. Auß.	gr. v — ℥β — j 3℥ — j 3j — Milch ℥ij Auß.	Der Alaun wird in den dazu bestimmten Fabriken (Alaunwerken) zubereitet. Sein Geschmack ist anfangs sauer (süßlich), nachher aber herbe und zusammenziehend. Er ist in 18 — 20 Theilen kaltem Wasser lösbar, im Weingeist löst er sich nicht auf, und wird aus dem Alaunschiefer in England, Italien, Schweden, Deutschland gewonnen.
Zusam-	Als Roborans bei schweren Geburten.	Saft.		Die Kermesbeeren

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestands- theile.
Chermes s. Kermes.	Schar- lachfar- ren.	Quercus coccifera.	1) Suecus Cherm.	
Bovista s: Fungus chirurgo- rum.	Bovist.	Lycoper- don Bo- vista.		
Agaricus. (Boletus laricis.)	Lerchen- schwamm.	Boletus purgans.		
Lignum Santali.	Santel- holz.	Santalum album.		Wenig Ad- stringens, mehr balsa- mische Thei- le und ein fettes Del.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
menzieshend.				werden von einer Insektenlarve (Coccus Quercus) auf der im südlichen Europa wachsenden Kermes-Eiche gebildet. XXI. Cl. VII. Ord.
Zusammenziehend, Blutstillend.	Äußerlich bei starken Blutungen, vorzüglich bei Nasenbluten, Hämorrhoiden.			Auf Wiesen und Tristen in Europa. XXIV. Cl. XIV. Ord.
	In neuern Zeiten bei colliquativen Schweißten empfohlen.	Pulver.	gr. j — ij.	Dieser purgirende Lerchenpflanz, welcher an den Stämmen der Lerchenbäume sitzt, wird gesammelt und getrocknet. XXIV. Cl. XIII. Ord.
Gelinde zusammenziehend.	Es wird vorzüglich nur zu Zahnpulvern benutzt.			Ostindien. IV. Cl. I. Ord.

C l a s s — A c r i —

In allen den hierher gehörigen Mitteln herrscht ein als animalischen Körpern zukommt und unter den 'ver- und wird durch Kochen nicht zerstört, läßt sich durch besondern Stoff darstellen. Es ist mit den Harzen, Mar- dieser Mittel wirken auf die Haut reizend, Entzündung sensystem und Lymphsystem excitirend, die Secretionen ändernd, verbessernd, verdünnend. Anwendung: be- um fremde im Organismus vorhandene Körper zu ent- ßem Turgor des Bluts und der Muskeln und endlich auch

1. Diejenigen Mittel welche eine allgemeine

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Senegae.	Senega- wurzel. Klap- per- schlan- genwur- zel.	Polygala Senega.	1) Syrupus Senegae. 2) Tinctura Senegae. 5) Extrac- tum Sene- gae.	1) Harz. 2) Schleim. 3) Eiweißst. 4) Extrac- tloft.





S. 1 S. VI.

a.

scharfes Princip vor, welches sowohl den vegetabilischen, verschiedensten Modifikationen erscheint. An sich ist es für Wasser und Weingeist ausziehbar, aber doch nicht als einen coticis und ätherischen Oelen sehr nahe verwandt. Einige erregend, Blasen ziehend, exulcerirend; andere auf's Drüs befördernd; noch andere wieder Blutreinigend, die Säfte Krankheiten der Reproduction um Stockungen zu heben, fernen, bei Krankheiten des irritablen Systems, bei gro- bei Krankheiten des Nervensystems.

Wirkung auf den Organismus hervorbringen.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerk- ungen.
Die Se- cretion der Drü- sane der Brust besör- dernd, die Ex- cretion des Darm- kanals vermehr- end, das Ge- fäßsy- stem rei- zend, Stoß- kungen	1) Bei der Lungenent- zündung im 2ten Stadium.			In Nord- amerika, Virginien, Pensylva- nien einhet- misch.
	2) Bei der Sicht.	Pul- ver.	℥β—j	
	3) Bei chronischen Hustenkrankheiten, vorzüglich bei denen, die durch eine Me- tastase oder Rheu- matismus entstan- den.	De- coct. In- fus. Ex- tract.	℥β—j — gr. v.	
	4) Bei Wassersuchten.	Sy- rup.	℥j	
	5) Bei örtlichen Ent-			


Officineller Name.	Tribial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix et Folia Polygalae.	Bittere Polygala. Kreuzblume.	Polygala amara.		
Flores Arnicae. (Radix et Folia.)	Falls frucht. Arnika. Wolverlei.	Arnica montana.	1) Extrac- tum Ar- nicae. 2) Tinctura Arnicae.	1) Acre. 2) Ein flüch- tiges Prin- cip.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
der Säfte zertheilend, die Haut- und Urinabsorption befördernd, Ekel und Erbrechen erregend.	Zündungen, um die Crisis durch den Urin und die Haut zu bewirken.	Zinktur.	gtt. xx — 3j.	XVII. Cl. III. Ord.
Zusammenziehend, reizend, stärkend.	Bei der Schleim-schwindsucht.	Pulver. Decoct. Elect.	3j.	In bergigten Gegenden Deutschlands, Frankreichs. XVII. Cl. III. Ord.
Die Secretionen befördernd, roborirend, das Nervensystem excitirend, Störungen zertheilend,	1) Specifisch bei allen Contusionen. 2) Bei Paralyfen aller Art. 3) Bei der Peripneumonie. 4) Bei fauligen Krankheiten, Brand. 5) Bei Menstrualfehlern. 6) Bei hartnäckigen	Infus. Pulver. Decoct.	3j — iii gr. v — x 3ß —	Auf Gebirgen und Wiesen im nördlichen Europa. Kein Thier außer den Ziegen

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Semen Phellandrii: Foeniculi aquatici.	Wasser-Fenchel	Phellandrium aquaticum.		1) Narcoticum. 2) Ucre. 3) Aethereum.
Herba Chelidonii. (Radix.)	Schöllkraut. Schwabenwurz. Goldwurz.	Chelidonium majus.	1) Extractum Chelidonii majoris. 2) Aquachelidonii. 3) Succus chelid. recent. expr.	1) Gummöse und 2) Resinöse Theile.





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
specifisch auf die Men- strua- tion, die Darm- excre- tion an- haltend, stop- fend.	chronischen Durch- fällen. 7) Beim schwarzen Staar. 8) Beim Wechselfie- ber.	Ein- spr. Um- schl.		rührt diese Pflanze an. XIX. Cl. II. Ord.
Reizend, specifisch gegen Eite- rung der Lungen und an- derer Organe, der Kno- chen.	1) Bei Krankheiten der Brust, Lungensucht. 2) Bei Eiterungen. 3) Bei Knochenkrank- heiten, als Caries, Rachitis. 4) Beim Wechselfieber.	Pul- ver. De- coct.	℞—j ℞	In Süm- pfen und Teichen Eu- ropa. V. Cl. II. Ord.
Reizend, die Ab- sorption und Se- cretion besör- dernd; specifisch auf die Leber und alle Stof- fungen des Drü- sensys- tems.	1) Bei allen chroni- schen Leberkrankhei- ten und Verstopfun- gen der Eingeweide. 2) Bei Wechselfiebern. 3) Bei Wassersuchten. 4) Bei Menstrualfeh- lern. 5) Bei Brustkrankhei- ten. 6) Bei Scropheln. 7) Bei Augenkrankhei- ten. Aeußerlich bei War- zen, Augenkrankheiten, Verdunkelung der Hornhaut.	Saft. Ex- tract.	gtt xx —℞. 3j—ij	Als Unkraut in ganz Eu- ropa be- kannt. XIII. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix Pimpinellae albae, s. nostratis.	Bibernell. Pimpinelle.	Pimpinella Saxifraga.	1) Tinctura Pimpinellae. 2) Species ad Gargarium. 3) Extractum Pimpinellae.	
Radix Ligustici s. Levistici.	Steckstockel.	Ligusticum Levisticum.	1) Extractum Levistici.	1) Del. 2) Aroma.
Radix Ari.	Aronwurzel.	Arum maculatum.	1) Conserva Ari. 2) Pulvis Ari compos.	1) Mehl. 2) Schleim. 3) Kali.



Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Angelicae.	Angeli- kewur- zel. Brust- wurzel.	Angelica Archange- lica.	1) Tinctura Angelic. 2) Extrac- tum Ange- lic. 3) Spiritus Angelic. composi- tus.	
Radix Inulae, Enulae, Helenii.	Alant- wurzel.	Inula Hele- num.	1) Extrac- tum Enu- lae. 2) Vinum Enulae. 3) Unguen- tum Enu- lae. 4) Syrupus Enulae. 5) Conserva Enulae. 6) Tinctura Enulae.	1) Schleim. 2) Aetheri- sches Del.
Amomum. Radix Zingiberis.	Jngwer.	Amomum Zingiber.	1) Tinctura Amomi zingiberis. 2) Syrupus Amomi zingiberis. 3) Morselli Amomi zingiberis.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Schleim auflö- send.	tes benutzte dies Mit- tel.			XXI. Cl. VII. Ord.
Exciti- rend, stär- kend, diure- tisch.	Bei Krankheiten der Nerven, Nervenschwä- che und als Hausmit- tel gegen ansteckende Krankheiten.	In- fus. Zink- tur.	3j gtt x l	An Rändern der Bäche in Lapp- land, Nor- wegen, Dess- reich. V. Cl. II. Ord.
Gelinde reizend, etwas erhit- zend, Aus- wurf be- för- dernd, Schweiß und Urin trei- bend.	1) Bei schleimigen Brustkrankheiten. 2) Bei Nervenschwä- che, Lähmung und Zittern der Glieder. Aeußerlich bei Krätze und chronischen Aus- schlägen.	In- fus. Sal- be.	3ß —	In Deutsch- land, Eng- land, Frank- reich, Hol- land wild. XIX. Cl. II. Ord.
Magen- stär- kend, Harn- absonde- rung und Aus- dün- stung beför- dernd.	1) Bei atonischer Sicht. 2) Bei hartnäckigen Verdaunungsbe- schwerden.	Thee. Pul- ver. Elect.	gr. x	Ursprüng- lich in Ost- indien, in Westindien wild. I. Cl. I. Ord.

Officineller N a m e.	Trivial.	Systemati- scher N a m e.	Präparate.	Bestand- theile.
Piper.	Pfeffer.	Piper ni- grum et al- bum.		
—	—	Piper lon- gum.		
Piper hispani- cum s. turcicum.	Spani- scher Pfeffer. Beiß- beere.	Capsicum annuum.	1) Tinctura capsic. an- nui.	
Herba Cochlea- riae.	Löffel- fraut.	Cochlearia officinalis.	1) Spiritus Cochlea- rii. 2) Conser- va Coch- learii. 3) Aqua Cochlea- rii. 4) Extrac- tum Coch- learii.	1) Säure. 2) Ammo- nium.



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Reizend, stärkend. Ganz wie der schwarze Pfeffer, nur noch erhitzender.	1) In allen Krankhei- ten wo man eines starken, durchdrin- genden Reizes be- darf. 2) Bei hartnäckigen Wechselfiebern. 3) Bei Lähmungen. 4) Bei langwieriger Magenschwäche.	Kör- ner. Pul- ver.	No. x — xx. gr. v — x —	In Ostin- dien und un- ter dem Ae- quator wachsend. Der schwar- ze Pfeffer ist die unreife getrocknete Frucht, der weiße hinge- gen die reife Frucht. II. Cl. III. Ord.
Stär- kend, reizend.	Vergl. s. gebrach- te den Saamen gegen Wechselfieber. Udatr in der böß- artigen Bräune. Gegen Amaurosis und Sicht.	Pul- ver. In- fus. c. Ω vini	gr. ij	In Amerika wild. Große Ga- ben erregen heftige Ko- lischmer- zen, Ent- zündung. V. Cl. I. Ord.
Die Se- cretio- nen be- för- dernd, diure- tisch.	1) Specifisch beim Scor- but. 2) Bei Wassersuchten. 3) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten. 4) Beim Schleim- asthma.	Saft. Del. Ω		Am Meer- strande des nördlichen Europas wild. XV. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Armoraciae s. Raphani rusticani.	Meer- rettig.	Cochlearia Armoracia.	1) Aqua Ar- moraciae.	1) Ammos- tum.
Radix Raphani.	Reittig. Rübe- rettig.	Raphanus sativus.		
Herba Sedimino- ris.	Sedum. Mauer- pfeffer. Kleines Haus- lauch.	Sedum acre.		
Radix Iridis flo- rentini.	Beils- chen- wurzel.	Iris floren- tina.		





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Flüchtig reizend, diure- tisch, rothma- chend, Blasen- ziehend.	1) Bei Verschleimun- gen. 2) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge und in der Wasser- sucht. 3) Beim Krampfasch- ma. Aeußerlich specifisch bei Zahnschmerz.	Saft.		Auf Wiesen und an Bäu- chen Euro- pas wild. XV. Cl. I. Ord.
	Beim Scorbut und bei Beschwerden von Harnsteinen.	Saft.		Ursprüng- lich in China wild. XV. Cl. II. Ord.
Sehr reizend, diure- tisch, in starken Gaben Erbre- chen und Co- lik erre- gend.	1) Beim Scorbut. 2) Bei bösen Krebsar- tigen Geschwüren. 3) Bei Nervenkrank- heiten. Aeußerlich bei Ge- schwüren des Mundes	Saft. Pul- ver.	gtt vj. ʒi —	Im sandi- gen Boden durch ganz Europa. X. Cl. IV. Ord.
Die Se- cretion der Lun- gen be- för- dernd, diure- tisch, Säure tilgend, Schleim auflö- send.	1) Bei Verschleimun- gen der Brust, des Magens. 2) Bei Wassersuchten. Aeußerlich in Zahn- pulvern.	Pul- ver.	ʒß —	Im südli- chen Europa wild. III. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Herba Clematidis erectae s. Flammulae Jovis.	Waldb= rebe. Brenn= fraut.	Clematis Vitalba. Clematis erecta.		
Formicae.	Amei= sen.	Formica rufa.	1) Spiritus formica- rum.	1) Säure. 2) Ucre.
Semen Sabadilli.	Saba= dissaa= men.	Veratrum Sabadilla.		
Cortex et	Seidela bast.	Daphne		






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Reizend, Blasen ziehend.	Aeußerlich als Ru- befaciens oder in Ab- kochung bei Hautaus- schlägen, z. B. der Krät- ze, venerischen Exosto- sen, krebsartigen und schwammigen Ge- schwüren.	In- fus. Ex- tract.	3j—jij gr. ij	Erstere wächst an Bäumen durch ganz Europa wild; letz- tere im süd- lichen Eu- ropa und bei uns in Gärten als Verzierung. XIII. Cl. VI. Ord.
Reizend, vorzüg- lich die Nerven exciti- rend.	Innerlich den Ω bei Wassersuchten. Aeußerlich in der Sicht, bei Lähmun- gen, Contusionen, u. s. w.	Bad. Einr.		Ueberall in Europa, in Gärten und Waldun- gen.
Hestig reizend, dra- stisch, leicht Entzün- dung des Ma- gens, Erbre- chen, Purgi- ren ver- ursa- chend.	Innerlich gegen chro- nische Nervenkrankhei- ten und gegen den Bandwurm. Aeußerlich gegen Ungeziefer.	Pul- ver. In- fus. Sal- be.	gr. v— xv. 3ß—	In Mexico. Schmu- cker, The- den, Herz gaben ihn bei Manie, Epilepsie— XIII. Cl. I. Ord.
Höchst reizend, specifisch	Innerlich specifisch in der Syphilis, vor-			In Wäl- dern des

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Mezerei.	Keller- hals. Pfeffer- strauch.	Mezereum.		
Flores Anagalli- dis. (Herba.)	Gauch- heil. Hühner- darm. Roth- viere.	Anagallis arvensis.	1) Aqua destillata Anagal. 2) Oleum coctum Anagal. 3) Essentia Anagal.	






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
auf Haut und Nie- ren, da- her Schweiß und Harn trei- bend, in starken Gaben Erbre- chen und Entzün- dung er- regend; äußer- lich Bla- sen zie- hend.	zuglich bei nächtlichen Knochenschmerzen. 2) Bei chronischen Be- schwerden. Aeußerlich als Rubef- faciens und Derivans bei heftigem Rheu- matismus und Blut- congestionen, als Ex- citans bei Lähmun- gen.	De- coct.	3ß—j	nördlichen Europa wird. Cullen und Rose empfehlen denselben bei syphili- tischen Hautaus- schlägen. VIII. Cl. II. Ord.
Diure- tisch und reizend zugleich.	1) Bei Stockungen des Unterleibs, Wasser- sucht. 2) Bei chronischen Nervenkrankheiten, als Hydrophobie, Manie.	Pul- ver. In- fus.	i	Auf Aeckern durch ganz Europa. V. Cl. I. Ord.

2. Diejenigen Mittel welche eine speci:
(a. Diuretica, b. Dra-
a. Diu-

Officinneller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Baccae Juniperi.	Wach- holder- beeren.	Juniperus communis.	1) Oleum Juniperi. 2) Aqua Juniperi dest. 3) Spiritus Juniperi. 4) Extrac- tum s. Roob Ju- niperi.	1) Schletm. 2) Ucre. 3) Zuckerst. 4) Aethere- um.
Radix Squillae.	Meer- zwiebel.	Scilla ma- ritima.	1) Acetum squilliti- cum. 2) Oxymel squilliti- cum. 3) Tinctura squillae. 4) Extrac- tum squil- lae. 5) Pilulae squilliti- cae. 6) Pulvis squillae composit.	1) Ucre. 2) Amarum. 3) Schleim. 4) Cass- mehl. 5) Eiweißst.





se Wirkung auf einzelne Organe haben:


stica, c. Emetica.

retica.

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Stark reizend, vorzüglich auf die Urinwerkzeuge, erhitzend, Harn und Schweiß treibend.	Innerlich bei Wassersuchten. 2) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge. 3) Bei Rheumatismus, Gicht. 4) Gegen Würmer. 5) Als Magenrobora. Aeußerlich bei der Gicht, bei Wurmern in der Wassersucht.	Decoct. Pulver. Del. Einr. von Del.	3j ʒj—ʒj gtt j—vj.	Ueberall an sandigen Stellen im nördlichen Europa. Man benutzt auch das Holz und die jungen Sprossen dieses Baums. XXII. Cl. XIV. Ord.
Anhaltend reizend, vorzüglich auf die Respiration und Harnorgane, daher Schleim auflösend, Harn treibend, Ekel, Erbrechen und	1) Innerlich bei Wassersuchten. 2) Bei schleimigen Brustkrankheiten, Verschleimungen des Magens —. 3) Bei der Epilepsie. 4) Gegen Würmer. 5) Als Emeticum. Aeußerlich bei der schleimigten Bräune.	Pulver. Drymel. Tinctur. Gurgelwasser.	gr. $\frac{1}{2}$ — ʒj. ʒj—ʒj gtt x — xv.	An sandigen Stellen in Portugal, Spanien, und Syrien.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Semen Sinapios.	Senf- saamen.	Sinapis ni- gra et alba.	1) Serum lactis si- nap. 2) Cataplas- ma sinap. R. Pulv. s. sinap. ℥j ferm. pa- nis ℥ij Rad. ar- morac. ℥ ^β Aceti vini q. s. ad consist. Catapl.	1) Ucre. 2) Fettes Del. 3) Aetheri- sches Del.
Radix Alii.	Knob- lauch. Stark riechen- der Lauch.	Allium sativum.		1) Aetheri- sches Del. 2) Ucre. 3) Flüchtiges Prin- cip.






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Purgi- en erre- gend.				VI. Cl. I. Ord.
Stark reizend, als Ner- ven- und Gefäß- system exciti- rend, die Haut rö- thend, Blasen reizend.	Innerlich als Diu- reticum. 2) Als flüchtig reizen- des Mittel. Außerlich bei Pa- ralysen, bei Rheuma- tismus und Gicht, bei local entzündlich spa- stischen Zufällen, Ty- phus.	Pul- ver. In- fus. Mol- ken. Bad. Um- schl.	Im nördl- chen Europa wild. XV. Cl. II. Ord.	
Exciti- rend, auflö- send, diure- tisch, diapho- retisch, krampf- stillend, wurm- reibend. Außer- lich wirkt es auf Bla- sen zie- hend.	1) Bei Wechselfieber. 2) Bei Schwäche und Verschleimung der Verdauungswerk- zeuge. 3) Gegen Rheumatis- mus und Gicht. 4) Gegen Würmer. 5) In der Wasser- sucht. 6) Bei hysterischen Krämpfen.	Saft. In- fus. De- coct.	3j — Milch Hj. VI. Cl. I. Ord.	In Sicilien wild, bei uns gebaut.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Herba Sabinae.	Ede- baum. Stin- fender Wach- holder.	Juniperus Sabina.	1) Oleum Sabinae dest. 2) Extrac- tum Sabi- nae dest. 3) Conserva Sabinae dest. 4) Spiritus Sabinae dest.	1) Aetheri- sches Oel.
Canthari- des.	Cantha- riden. Spani- sche Flie- gen.	Meloevesi- catorius. (Lytta ve- sicatoria Fabric.)	1) Tinctura Cantharid. 2) Empla- strum Can- tharid. s. vesicat. 3) Empla- strum Can- tharid. s. vesicat. perpet. 4) Unguen- tum Can- tharidum.	1) Essig. 2) Harn- säure. 3) Gebun- denes Am- monium. 4) Fetter, harziger Stoff. 5) Phos- phors. Kalk. 6) Phos- phors. Bit- tererde.





Officinneller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Meloe Ma- jalis Scara- baeus.	Mais- wurm.	Meloe Ma- jalis. Meloe Proscar- baeus.		1) Säure. 2) Acre. 3) Ammo- nium.
Millepe- des. (ae.) Aselli.	Keller- esel.	Oniscus Asellus.		
Radix Hirundi- nariae.	Schwal- benwur- zel.	Asclepias Vincetoxi- cum.		





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
lich wir- ken sie rothma- chend, Blasen ziehend.	Entzündungen. Auch bei der Amaurosis und Schwerhörigkeit.			Grad von Cachexie. 3) Gastrische Unreinig- keiten. 4) Neigung zu fauligen Krankhei- ten.
Reizend, diure- tisch. In starken Gaben verursa- chen sie Angst, Ohn- macht, Zuf- kung —.	In der Wasserschen. 1777. Bei Schwäche der Zeugungstheile.	Pul- ver. Elect.	gr. j — iii.	Auf Brach- feldern und Hügeln in Europa im Mai und Juni.
Urin treibend, das Ner- vensys- tem ex- citirend, vorzüg- lich die Sinnes- organe.	1) In der Wasser- sucht. 2) Gegen Steinbe- schwerden und Krank- heiten der Nieren. 3) In der Gelbsucht. 4) Bei der Amauro- sis. 5) Im 2ten Stadium des Sticthustens.	Saft. Pul- ver. Infus. Leben- dig.	℥ß	In alten Gewölben und Mau- ern vorkom- mend.
Erbre- chen er- regend, die Haut- ausdün- stung	Innerlich bei der Wassersucht und bei unterdrückter Menstru- ation.	Infus.		In waldis- gen Sand- gegenden Europas wild.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Cepae.	Zwiebel, Bolle.	Allium Cepa.		
Asparagus. (Turio- nes.)	Spar- gel.	Asparagus officinalis.		
Herba Verbenae.	Eisen- hart.	Verbena officinalis.		
Herba Iaceae.	Stief- mütter- chen. Frei- sam- frant.	Viola tri- color.		

b. Dra-

Diese Mittel wirken stark ausleerend und enthal-
bhaftig ausleerende Mittel bei Anhäufungen fester Unrei-






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
und Harnabsonderung verstärkend.	Aeußerlich gegen Geschwüre.			V. Cl. II. Ord.
Stark Urin treibend.	Gegen Würmer und beim Husten auf die Fußsohlen gebunden.	Gebrauten.		In Asien wild, bei uns gekantzt. VI. Cl. I. Ord.
Urin treibend, etwas erhitzen.	1) Bei der Gicht. 2) Bei Neigung zum Bluthusten. 3) Bei Harnsteinen.			Wird überall in Europa gezogen. VI. Cl. I. Ord.
	1) In der Wassersucht. 2) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge. 3) Beim Stichehusten. 4) Bei Verschleimungen des Darmkanals.	Saft.		An Dörfern und auf Schutthaufen durch ganz Europa. XIV. Cl. I. Ord.
Purgierend, Brechen erregend, etwas Harn treibend.	Stark empfiehlt es gegen den Milchschorf und sonstige chronische Hautausschläge.	Pulver. Infus.	gr. vj 3j—jj	Ueberall in Gärten und Aekern wild. V. Cl. I. Ord.


stica.

ten fast sämmtlich harzige Theile. Anwendung: als Nigeltten in den ersten Wegen. In kleinen Gaben wir-

fen sie nicht purgirend, sondern auflösend, Magen stärkeplethorischen und entzündlichen Krankheiten anwenden.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Folia Sennae.	Senecblättr.	Cassia Senna.	1) Electuarium a Sen-na s. Electuarium lenitivum. 2) Infusum Sennae compositum s. Aqua laxativa Viennensis.	
Colocynthides.	Koloquinten.	Cucumis Colocynthis.	1) Tinctura Colocynth. 2) Extractum Colocynth. aquosum. 3) Oleum Colocynth. 4) Trochisci Alhandal.	
Radix Rhei s. Rhabarbari.	Rhabarber.	Rheum palmatum.	1) Tinctura Rhei aquosa. 2) Tinctura Rhei vinosa Darelii. 3) Tinctura Rhei spiritosa. 4) Tinctura Rhei composita. 5) Tinctura	1) Acris. 2) Amara. 3) Adstringentia. 4) Mucilaginosas.







tend. Man darf sie nur in chronischen Fällen, nicht in

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Auf den Magen und Darm- kanal reizend, abfüh- rend, oft Ekel und Co- lik erze- gend.	1) Als Purgans mit Tamarinden und Salzen.	Pul- ver.	℥℔ —	In Arabien, Aegypten, Italien einheimisch.
	2) Bei habituellen Verstopfungen des Unterleibs.	In- fus.	3℔ - j -	
	3) Als Corrigenß bei solchen Mitteln, die leicht Verstopfung erregen.	Elect.	3vj — 3vjij.	
Specifisch aufß Nerven- system und die absorbi- renden Gefäße, heftig purgi- rend.	1) Bei Wassersuchten.	Pul- ver.	gr. j - ijij	Auf den Inseln des Archipela- gus, in Sy- rien einhei- misch. XXI. Cl. VIII. Ord.
	2) Bei Würmern.			
	3) Bei hartnäckigem Kopfschmerz, Schwin- del.	De- coct.	3℔ — j	
	4) Bei Obstructionen.	Ex- tract.	gr. ij	
	5) Bei hartnäckiger Sicht.	Zink- tur.	gtt xx	
	6) Bei Lähmungen der Extremitäten.			
Unhal- tend rei- zend, stärkend, in größ- tern Ga- ben laxi-	1) Bei gallichten Krank- heiten, Erbrechen, Krankheiten der Le- ber.			Ihr Vater- land ist Asien, Chi- na. Eine ächte Rhabarber muß trock- nen, zerreib- lich, äußer- lich dunkel- gelb, inner- lich gelb mit gelbrothen
	2) Da wo Purgantia indicirt sind.	Pul- ver. In- fus.	℥℔ — j 3j	
	3) Bei Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibs, Melan- cholie.	Ex- tract. Zink- tur.	gr. x 3j	

Officinneller Name.	Trivial	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestands- theile.
			Rhei ama- ra et dul- cis. 6) Extrac- tum Rhei. 7) Syrupus Rhei cum Cichorio. 8) Syrupus Rhei.	
Radix Ialappae.	Jalap- penwur- zel.	Convolv- lus et Mirabilis Ialappa.	1) Resina Ialappae. 2) Tinctura Ialappae. 3) Extrac- tum Ialap- pae. 4) Sapo Ia- lappinus.	1) Harz.
Herba et Radix Gratiolae.	Gottes- gnaden- kraut. Wilder Aurin.	Gratiola officinalis.	1) Extrac- tum Gra- tiolae aquosum.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerk- ungen.
end, er- hitzend.	4) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge. 5) Bei Hämorrhoiden. 6) Beim Durchfall. 7) Als Roborans bei Magenschwäche. 8) Bei Verschleimun- gen aller Art. Aeußerlich bei böß- artigen Geschwüren.	Sy- rup.	3ß—j	Abern durchfärbt seyn. Mit den Fingern gerieben, nicht färben, doch be- feuchtet giebt sie eine dunkle Farbe. IX. Cl. II. Ord.
Stark reizend, purgi- rend, dra- stisch.	1) Bei sehr verschleim- tem Darmkanal. 2) Bei Wassersuchten. 3) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten. 4) Bei Würmern. 5) Als Purgans.	Pul- ver.	gr. x — 3ß	In Amerika wachsend. Contrain- dicantia: 1) Plethora. 2) Fieber- hafter Zu- stand. V. Cl. I. Ord.
Hestig reizend, beson- ders auf den Darm- kanal, dra- stisch, purgi- rend, Erbre- chen	1) Bei der Manie und Melancholie. 2) Bei Wassersuchten. 3) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten. 4) Bei der Gicht. 5) Bei Wechselfiebern. Aeußerlich bei offe- nen stark eiternden Geschwüren.	Pul- ver. In- fus. Ex- tract.	gr. j—jv 3ß—j 3j—jj gr. v—	Frankreich, Italien, Deutsch- land.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Gummi Guttae.	Gummi- Gutt. Gutti.	Stalagmi- tes cambo- gioides.		
Aloë.	Aloe.	Aloë spica- ta. Aloë succo- trina. Aloë vul- garis. Aloë arbo- rescens.	1) Extrac- tum Aloes aquosum. 2) Tinctura Aloes spi- rituos. 3. Tinctura of Bierre Piera.	
Aloë he- patica. Aloë ca- ballina. Aloë suc- cotrina. Aloë lu- cida.				


R. Tinct. of Hiera. Pura.

Tare of succotrine aloes powder 3j
Virginian snake root
Ginger aa 3ii
Wine P.ij.
brandy P.℥.

frequently shaking the bottle for
then strain off the tincture
for persons of languid and phlegmatic habit
The dose of a purge is from 3j - 3ii.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
erregend und auß Lymph- system außlö- send, zerthei- lend.				II. Cl. I. Ord.
Stark reizend auf den Darm- kanal, Erbre- chen, Purgi- ren und Leib- schmer- zen erre- gend.	1) Als Warmmittel. 2) Bei der Wasser- sucht. 3) Bei hartnäckigen Hautausschlägen. 4) Bei chronischen Nervenkrankheiten, Epilepsie.	Pil- len. Pul- ver. Emul- sio.	gr. jii— ℥β gr. j— ℥j.	Ostindien. Es ist ein Schleim- harz, das ausgenann- tem Baume triest und sich an der Luft verhärt- et. XXIII. Cl. I. Ord.
Stark reizend und er- hitzend. In klei- nen Gaben auf- lösend, roböri- rend; in großen Gaben purgi- rend, wurm- treibend. Specifisch	1) Bei allen chroni- schen Krankheiten des Unterleibs, die sich auf Schwäche, Schleimanhäufung und Verstopfung gründen. 2) Bei Wärmern. 3) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten. 4) Bei schleimigen und serösen Profluvien.	Pul- ver. Ex- tract in Pil- len.	gr. β— jv. gr. jii— —xv.	Asien, Afri- ka, am Vor- gebirge der guten Hof- nung. Die Aloë spicata und Aloë succo- torina sind die besten. Dies Mit- tel ist schon von Galen und Cel- sus ge- rühmt.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix Hellebori s. Melampodii.	Christ- wurzel. Nieß- wurzel.	Helleborus niger.	1) Extrac- tum helle- bori aquo- sum. 2) Tinctura hellebori simplex et composi- ta.	
Radix Hellebori albi.	Weiße Nieß- wurzel. Weißer Germer.	Veratrum album.		





Wir- fung.	Anwendung.	Form.	Dosiß.	Anmer- kungen.
auf den Uterus und die Hämor- hoidal- gefäße.	5) Bei unterdrückter Menstruation.			VI. Cl. I. Ord.
Hestig reizend, Erbre- chen er- regend und pur- girend; specifisch auf die Men- strua- tion und in klei- nen Ga- ben diu- retisch.	1) Bei unterdrückter Menstruation und Hämorrhoiden. 2) Gegen Würmer. 3) Bei hartnäckigem Wechselfieber. 4) In der Manie und Melancholie. 5) In der Wasser- sucht.	Pul- ver. In- fus. Ex- tract.	gr. v — ʒi. ʒi — ʒj — ʒi.	Auf den Oestreichs- chen und Apenninis- chen Gebir- gen wach- send. Die wahre Christwur- zel (Helleb. orientalis) empfiehlt schon Hip- pocrates. XIII. Cl. VI. Ord.
Ist stär- ker und causti- scher als Borice, erzeugt Cholera, heftige Schmer- zen und Entzün- dung des Darm- kanals.	Innerlich bei hart- näckigen Nervenkrank- heiten. Aeußerlich bei hart- näckiger Krätze. Sie wird jetzt nur noch vom Landmann gegen Ungeziefer des Viehes gebraucht.	Pul- ver. De- coct.	gr. ʒij — 3ʒj	In gebir- gigen Ge- genden Eu- ropas. XXIII. Cl. I. Ord.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix Bryoniae.	Zaun- rübe. Eicht- rübe.	Bryonia älba.		
Scammo- nium. Scam. Ha- lepense.	Scam- moni- umharz	Convolvulus Scam- monia.	1) Resina Scammo- nii.	
Cortex Geoffroea- ae, Geoff- roya ja- maicensis.	Geoff- roge. Burm- rinde.	Geoffrea inermis.	1) Extrac- tum cort. Geoff. aquosum.	





Officinneller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Radix et Herba Spigeliae.	Spiegel- lie.	Spigelia Anthelmia.		

c. Eme-

Radix Ipecacu- anhae. (Ipecac. grysea. Ipecac. fusca. Ipecac. alba.)	Brech- wurzel. Ipeca- cuanha.	Psychotria emetica? Cephaëlis Ipecacuan- hae? Viola Ipe- cac.? Euphorbia Ipecac.?	1) Syrupus Ipecac. 2) Pulvis Ipec. opi- atus s. Do- weri. ℞ Kali sul- phurici gr. viii Opii pulv. Rad. Ipe- cac. pulv. aa gr. j. m.	1) Acre. 2) Aethere- um.
--	--	---	--	--------------------------------

Radix Violae odoratae.	Beil- chen- wurzel.	Viola odo- rata.	1) Syrupus Violae	
------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------------	--

Radix Asari. (Folia.)	Hasel- wurzel.	Asarum eu- ropaeum.		
-----------------------------	-------------------	------------------------	--	--





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerk- ungen.
Wurm- trei- bend.	Besonders beim Bandwurm.	Pul- ver. In- fus.	gr. x 3ß—j	Südame- rika. V. Cl. I. Ord.

tica.

Brechen erregend, stopfend, beruhi- gend, krampf- stillend, auflö- send, Harn- treibend und mit Opium ver- mischt Schweiß- treibend.	1) Als Brechmittel, da wo Durchfall verhü- tet werden soll; bei Verschleimungen der Brust, convul- sivischem Asthma, Verhärtungen, vor- züglich der Drüsen, beim acuten Rheu- matismus. 2) Als Krampfmittel im Durchfall, bei der Ruhr, bei Fleus —.	Pul- ver. In- fus.	gr. v — x — — 3ß. 3j —	In südli- chen Ameri- ka wach- send. V. Cl. I. Ord. XI. Cl. III. Ord.
Brechen und Stuhl- gang er- regend.	— — —	Pul- ver. In- fus.	3ß — 3ij —	In schatti- gen Wäl- dern. V. Cl. I. Ord.
Specifisch auf die Haut, Nieren u. auf den Darmka- nal, krampf- stillend, Brechen, Niesen er- regend.	Als Brechmittel. Neuerdings gegen die Wassersucht em- pfohlen.	In- fus.	3j — 3j. 3ij —	In bergig- ten Gegen- den und an schattigen Orten. XI. Cl. I. Ord.

C l a s - A e t h e r e a

Die hierher gehörenden Mittel zeichnen sich alle durch
duft der organischen Natur ist und nie rein, sondern im-
Wasserstoff scheint Grundstoff dieses Principis zu seyn, er
mit dem Sauer- und Kohlenstoff. Alle diese Mittel durch-
sämmtlich reizend, aufs Nervensystem excitirend, aufs
vorzüglich die Ausdünstung. Anwendung: überhaupt
Krankheiten der Hautorgane u. s. w.

1. Aetherea


Officineller Name.	Trivial.	Systematis- cher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Alcali vo- latile. Ammoni- um.	Flüchti- ges Lau- gensalz. Ammo- nium.		1) Ammo- nium car- bonicum s. Alcali volatile siccum. 2) Spiritus salis am- moniaci aquosus, s. Liquor ammonii carbonici aquosus. 3) Spiritus salis am- moniaci vinosus, s. Liquor ammonii vinosus. 4) Spiritus salis am-	



Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			moniaci causticus s. Liquor ammonii causticus. 5) Sal vo- latile cor- nu cervi, s. Ammoni- um carbo- nicum py- ro - oleo- sum. 6) Spiritus salis am- moniaci anisatus, s. Liquor ammonii anisatus. 7) Spiritus cornu cer- vi rectifi- catus, s. Liquor ammonii pyro - ole- osi. 8) Liquor cornu cer- visuccina- tus s. Li- quor am- monii suc- cini.	
Acidum succini-	Bern- stein- säure.			

9. *Ammon. carbon.*

10. *Spir. ammon. arom.*



Officineller Name.	Erstmal.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
cum s. Sal Succini.	Bern- steinsalz.			
Acidum benzoi- cum, s. Flores Benzöes.	Benzoe- säure. Benzoe- blumen.			
Oleum ani- male ae- thereum s. Ol. animale Dippelii.	Aetheri- sche Ehleröl. Dip- pelsöl.			
Aether aceticus, s. Naphtha Aceti.	Essig- äther. Essig- naph- tha.		1) Spiritus acético- aethereus.	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
befördernd.	3) Beim Starrkrampf und hysterischen Krämpfen.			stillation abgeschieden.
Flüchtig reizend, die Expectoration befördernd.	1) In chronischen Brustkrankheiten, typhösen Pneumonien. 2) Bei unterdrückter Menstruation.	Pulver. Emul- sio.	℥ß.	Es wird aus dem Gummi Benzöe durch Sublimation geschieden.
Flüchtig reizend, Schweiß treibend.	1) Bei Krämpfen chronischer Art, Epilepsie — 2) Beim Wechselfieber. 3) Beim Bandwurm. 4) Bei Gicht und Rheumatismus.	—	gr. v-x.	Es wird bei der trocknen Destillation animalischer Substanzen, als von Knochen, Horn u. s. f. gewonnen oder aus dem Oleum animale foetidum destillirt.
Durchdringend, flüchtig reizend, das Nervensystem excitirend, die Excretion	1) Bei Ohnmachten. 2) Bei apoplektischen Anfällen, Paraly- sen. 3) Im höchsten Grade des Typhus. Aeußerlich bei eingeklemmten Brüchen, Gehirnentzündung.		gtt x —	Der Essig- äther wird bei der De- stillation mit Natrum aceticum, Acidum sulphuricum concentratum und Spiritus vini rectificatissimus erhalten.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Aether sulphuri- cus, s. Naphtha Vitrioli.	Schwe- feläther. Schwe- felnaph- tha.		1) Spiritus sulphuri- co-aethe- reus s. Li- quor mi- neralis anodynus Hoffman- ni.	
Spiritus sulphuri- co-aethe- reus s. Li- quor mine- ralis ano- dynus Hoffm.	Aetheri- scher Schwe- felspiri- tus. Hoff- manns- tropfen.			
Spiritus nitrico-ae- thereus, s. Spiritus	Aetheri- scher Salpe- tergeist.			





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
besfördernd, vorzüglich auf die Hautausdünstung.				Dieser Aether in 3 Theilen Weingeist aufgelöst giebt den Spiritus acet. aeth.
Noch erheitzender.	1) Bei chronischen Krämpfen aller Art. 2) Gegen Gallensteine. 3) Im höchsten Grade des Typhus. 4) Bei Ohnmächten, apoplektischen Anfällen, Paralyse. Aeußerlich bei eingeklemmten Brüsten.		—	Der Schwefeläther wird aus Spiritus vini rectificatiss. und Acidum sulphuricum concentratum, bei der Destillation gewonnen.
	1) Bei Krämpfen und Schmerzen aller Art. 2) Bei Magenbeschwerden. 3) Bei Paralyse. 4) Bei Sicht und Rheumatismus. 5) Als Excitans und Antisepticum.		gtt x — 3ß.	Er besteht aus 1 Thl. Aether sulphuricus und 3 Thl. Spiritus vini rectificatiss.
Beinahe gleich der, der Hoffmannstropfen, nur mehr bis	1) Bei Krämpfen aller Art, krampfhaftem und feuchten Asthma. 2) Bei Nervenfiebern, Typhus.		Täglich 3j — j	Er wird durch die Destillation aus dem höchst rectificirten

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Nitri dul- cis.				
Aether muriaticus s. Naphtha Salis.	Salz- äther. Salz- naph- tha.			
Vinum.	Wein.	Vitis vini- fera.	1) Die säuerlichen Weine, als Rhein- wein, Moselwein. 2) Die rein geistigen Weine, als weißer Franzwein. 3) Die zusammenziehenden Weine, als rother	1) Wasser. 2) Säure. 3) Alcohol. 4) Aroma. 5) Schleimige, erdige Theile.



Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
uretisch und diaphoretisch, expectorirender und weniger excitirend auf die Nerven.	3) Bei Ohnmachten Schwindel, Zittern der Glieder. 4) In der Hautwassersucht. 5) Bei flatulenter Colik.			Weingeist und der Salpetersäure gewonnen.
	1) Bei der Sicht. 2) Bei Krämpfen. 3) Bei fauliger Ruhr, Cholera.		gtt x— xx.	Er wird bei der Destillation aus Salz, Alcohol und concentrirter Schwefelsäure gewonnen.
Etwas reizend, antiseptisch und restaurirend.	Als das beste Nervenstärkende Mittel giebt man den Wein: a) Im Typhus bei Neigung zur Fäulniß. b) Bei wirklich putriden Fiebern. c) Bei allen chronischen Krankheiten, Wassersucht, Abzehrungen —.		q. s.	Die Weintrauben wachsen im südlichen Europa, Orient und im nördlichen Afrika wild; aus ihrem Saft wird durch die Gährung der

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			Franzwein. 4) Die gewürzhaften Weine, als Bur- gunder, die Spanis- schen Wei- ne. 5) Die sü- ßen fetten Weine, als Mallaga, Madera, Unger- wein. 6) Die koh- lensäuren Weine, als Champag- ner, weißer Burgun- der.	
Spiritus vini Gal- licus.	Franz- brandt- wein.			
Spiritus vini.	Wein- geist.		1) Spiritus vini recti- ficatus. 2) Spiritus vini rectifi- catissimus.	





Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			3) Urraf. 4) Rum. 5) Brandt- wein.	
Campho- ra.	Cam- pher.	Laurus Camphora.	1) Oleum campho- rat. 2) Linimen- tum sapo- nato-cam- phoratum. 3) Linimen- tum am- moniatum cum Cam- phora. 4) Acetum camph. 5) Spiritus vini cam- phoratus.	Der Cam- pher scheint ein konfes- tes ätheris- ches Del auszumachen, das bloß aus Kohlen- und Wasserstoff gebildet ist.





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
überrei- zend, er- schlaf- send, schwä- chend.	Äußerlich bei Ver- renkungen, Quetschun- gen —.			
Höchst flüchtig, reizend aufs sen- sible und irritable System; die Haut- thätig- keit ver- meh- rend, Krampf stillend; specif gegen Wür- mer, eis- gen- thümli- che Con- tagien zerstöh- rend, die Funk- tionen der Ge- schlechts- theile de- primi- rend, die Stuhl-	Innerlich: 1) Beim nervösen und putriden Typhus. 2) Im zweiten Sta- dium localer Ent- zündungen und Fie- ber. 3) In den Blattern und Masern. 4) Im acuten Rheu- matismus. 5) In Krankheiten der Geschlechtstheile, als Pollutionen. 6) Bei Lähmungen. 7) In krampfhaften Krankheiten. 8) Beim Wahnsinn. 9) Gegen den Band- wurm. 10) Bei unterdrückter Hautthätigkeit und Erfrierung. 11) Im Brande. Äußerlich bei Ver- härtungen, Extrava- saten, Geschwülsten,	Pul- ver. Emul- sio. Ein- reib. Pfla- ster.	gr. j — iii — ʒi — ii	Der Cam- pher = For- beer wächst ursprüng- lich in Ja- pan wild. Aus dem Baume, wenn er ges- hackt, mit Wasser übergossen und destil- lirt wird, er- hält man den Cam- pher, der ungereinigt nach Europa kommt und in Holland raffinirt wird. Contrain- dicantia: 1) Plethora. 2) Idiosyn- crasie. 3) Gastri- sche Unrei- nigkeiten. 4) Krampf- haft zusam-

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			<i>Mixtura Lupulonis subjuncti. phona.</i>	
Moschus.	Mos- schus. Bisam.	Moschus moschife- rus.	1) Iulapium e Moscho. 2) Tinctura Mosch. simplex.	Es ist ein thierischer Stoff, ein eigenes flüchtiges Princip harziger Natur.
Castore- um.	Biber- geß.	Castor Fi- ber.	1) Essentia s. Tinctura Castorei.	Flüchtiges Aethereum.



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
auslee- rung vermin- dernd.	Krämpfen, Pollutio- nen, Wärmern —.	Sal- be.		mengezo- ne Haut. IX. Cl. I. Ord.
Neuerst beruhi- gend, Krampf stillend, stärkend, specifisch auf die Haut und Brust, reizt das Blut- system und beschleu- nigt die Circula- tion.	1) Als Excitans bei Schwäche des Ner- vensystems, beim nervösen Typhus. 2) Bei allen krampf- haften Krankheiten, vorzüglich der Brust, bei der häutigen Bräune, beim Mil- larischen Asthma —. 3) Bei Gemüthskrank- heiten. 4) Bei fieberhaften Eranthemem. 5) Bei Metastasen. 6) In der Wasser- scheu.	Pul- ver. Emul- sio.	gr. j — vjij.	Das Bi- samthier, welches den Moschus in einem Beu- tel in der Nabelge- gend trägt, lebt in Asien, Si- birien.
Auß Nerven- und Blut- system sehr erhit- zend, ex- citirend; specifisch bei der Hyste- rie, da- her Krampf stillend.	1) In krampfhaften Beschwerden Hyste- rie. 2) Bei Colik und Ma- genkrampf. 3) Bei der Schlaffucht. 4) Beim Gliederzit- tern. 5) Beim convulsio- nen Husten.	Pul- ver. Zink- tur.	gr. j-vj. gtt.-xv	Der Biber, ein in nördlichen Gegenden an großen Flüssen le- bendes Thier, trägt das Castoreum in zwei zw- ischen dem Nabel und After han- genden Beuteln.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Ambra. (Ambra grysea s. ambrosia- ca.)	Amber.	Physeter macroce- phalus. (Cachelot.)	1) Essentia ambrae li- quid.	
Phospho- rus.	Phos- phor.		1) Acidum Phosphori.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Reizend, flüchtig bele- bend.	Man hat ihn frü- her als Krampfstillen- des Mittel benutzt.	Pul- ver. Pul- ver.	gtt xx —xl gr.vj— xviii	Man findet den Amber im Meere, an den Kü- sten von Sumatra, Madagas- car, Japan und in den Gedärmen des Cacha- lotfisches.
Stark reizend, flüchtig, erhit- zend auf Nerven- und Blutsy- stem, verur- sacht Schweiß und ver- mehrt die Urin- abson- derung; specifisch auf die Knochen und auf die Ge- schlechts- theile.	1) Bei Paralyphen. 2) Bei der Gicht. 3) Beim Wechselfieber. 4) Bei hohen Graden asthenischer Krank- heiten, bössartigen Fiebern. 5) Bei chronischen Ner- venkrankheiten. 6) Als Gegengift bei den metallischen Gif- ten, z. B. beim Blei, Quecksilber —. 7) Als Excitans bei der Unmannbarkeit. Aeußerlich bei Gicht, Paralyphen.	Aust. 1) in Ae- ther. 2) in Del 3) in Del mit Schleim	gr. jv — 3ß davon gtt xx. — —	Der Phos- phor ist ei- ne eigen- thümliche Substanz, die einen elementari- schen Be- standtheil in allen ani- malischen, und auch in sehr vielen vegetabili- schen Kör- pern auß- macht, und durch den Weg der Kunst, da- raus bereit- et werden kann.

2. Aetherea

a. Aro-

Die eigentlichen Gewürze wirken reizend flüchtig und macht durch ihren Zusatz andere schwer verdauliche Mit-

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Cortex Cinnamo- mi.	Zimmt.	Laurus Cinnamo- mi.	1) Aqua Cinnamo- mi sim- plex. 2) Aqua Cinnamo- mi vinosa. 3) Tinctura Cinnamo- mi. 4) Oleum Cinnamo- mi aethe- reum.	1) Aetheri- sches Oel. 2) Adstrin- gens.
Cortex Cassiae cinnamo- miae.	Canehl. Cassien- rinde.	Laurus Cassia.		
Lignum Sassafras.	Sassa- fras oder Fenchel- holz.	Laurus Sassafras.	1) Oleum Sassafras destilla- tum.	



aromatica.


mata.

auf die Organe der Verdauung permanent stärkend. Mantel leichter erträglich und fixe Mittel mehr flüchtig.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Exciti- rend auf Nerven- und Ge- fäßsy- stem, er- hitzend, Magen stärkend, Blä- hung trei- bend.	1) Als reizendes und stärkendes Mittel, überall wo große Schwäche vorhan- den ist.	Pul- ver.	gr. v-x.	Der Zimmt- Lorbeer wächst ur- sprünglich auf der In- sel Ceylon und findet sich auch in Westindien. IX. Cl. I. Ord.
	2) Bei Hämorrhagien passiver Art, Mut- terblutfluß.	Tink- tur.	gtt xx- 3ß.	
	3) Bei Lähmungen.	Del.	gtt j.	
	4) Bei großer Schwä- che des Magens und der Verdauungs- werkzeuge über- haupt.			
	Wird wie der wahre Zimmt benutzt.	—	—	Der Cassien- Lorbeer wächst auf den Mollu- skischen In- seln. IX. Cl. I. Ord.
Gelinde reizend, erhit- zend, stärkend, zusam- menzie- hend, Schweiß treibend.	1) Bei chronischer Gicht und Rheumatismus.	Del.	gtt j	Der Sassa- fras-Lor- beer wächst in Nord- amerika. IX. Cl. I. Ord.
	2) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten.	In- fus.	3j.	
	3) Bei rhachitischen Krankheiten.			

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Cortex Wintera- DUN.	Win- terß- rinde.	Wintera aromatica.		
Cortex Canellae.	Weißer Zimmt.	Canella alba.		
Caryophil- li.	Ges- würz- nelken.	Eugenia caryophyl- lata.	1) Oleum caryoph. dest.	
Nux moschata. Macis.	Muska- tennuß. Muska- tenblü- the.	Myristica moschata.	1) Oleum nucis ex- pressum. 2) Oleum macis de- stillatums. aethere- um. 3) Essentia Macis.	
Vanilla.	Banille.	Vanilla aro- matica, s. Epiden- dron Va- nilla.		





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Reizend, erhit- zend, Magen- stärkend, Blä- hung trei- bend.	1) Bei Schwäche des Magens und der Unterleibs Eingeweide.	Pul- ver.	gr. x — xx.	In Patogonien, Feuer- land wach- send.
	2) Beim Magenkrampf.	Infus.	3ß —	Im Jahre 1578 durch Winter bekannt.
	3) Bei Flatulenz.			XIII. Cl. IV. Ord.
	1) Bei acuten und chronischen Affekten.	Pul- ver.	gr. x — xxx.	Jamaica, Carolina.
	2) Vorzüglich bei Schwäche des Magens, Darmkanals.			XI. Cl. I. Ord.
	1) Als Magenstärken- des Mittel.	Pul- ver.	gr. ij-vj	Auf den Mollus- schen In- seln.
	2) Bei der Zungen- lähmung.			XII. Cl. I. Ord.
	3) Beim Weinsraß.	Del.	gtt v-x.	
	4) Bei Zahnschmerz.			
Stark und durch- drin- gend reizend, erhit- zend, Magen stärkend.	1) Bei Schwäche des Darmkanals, Diar- rhöen.	Pul- ver.	gr. iii- 3ß.	
	2) Beim Wechselfieber.			
	3) Bei Atrophie der Kinder.	Del.	gtt i-ij	XXII. Cl. XIV. Ord.
	Blos im Nervenfie- ber.	Pul- ver.	gr. ij — iv.	Im südli- chen Ameri- ka, als Schmar- zerpflanze um die höch- sten Bäu-
	Außerdem zum Wohl- geruche und Wohlge- schmacke der Chocolate.			

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestands- theile.
Cardamo- mum mi- nus.	Carda- momen.	Amomum Cardamo- mum.		Aetherisches Del.
Radix Zedoariae.	Bittwer- wurzel.	Amomum Zedoariae.		
Semen Coriandri.	Corian- der.	Corian- drum sati- vum.		
Faba Pichurim.	Pichu- rboh- ne.	Laurus Pichurim.		





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosß.	Anmer- kungen.
				me rans- kend. XX. Cl. I. Ord.
Stark reizend, erhit- zend, Bläs- hung trei- bend, Magen stärkend.	Man benutzt dies Mittel vorzüglich nur als Zusatz zu andern Mitteln und als Ma- gen stärkendes Mittel.	Pul- ver.	gr. jj— vj.	Ceylon, Ma- labar. Man hat 3 Arten dieses Saamens: Cardamo- mum majus, medium, minus. I. Cl. I. Ord.
Schweiß treibend, reizend, erhit- zend, Bläs- hung treibend.	1) Bei Schwäche des Darmkanals und davon herrührenden Durchfällen, Coli- ken. 2) Gegen Würmer.	—	gr. x— xx.	Ceylon, Malabar. I. Cl. I. Ord.
	In den ältern Zei- ten bediente man sich derselben im Biere und in Speisen als Ge- würz.			Italien. V. Cl. II. Ord.
Gelinde reizend, Magen stärkend.				Amerika.


b. Ner-

Diese Mittel wirken vorzugsweise beru-

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Radix Serpenta- riae.	Virgini- sche Schlan- genwur- zel.	Aristolo- chia Ser- pentaria.		
Radix Valeria- nae.	Bal- drian.	Valeriana officinalis.	1) Tinctura Valerianae simplex. 2) Tinctura Valerianae aetherea. 3) Tinctura Valerianae ammoniata. 4) Extrac- tum Vale- rianae aquosum. 5) Oleum Valerianae destilla- tum. A	1) Aetheri- sches Del. 2) Amarum.
Radix Contrajer- vae.	Gift- wurzel.	Dorstenia Contrajer- vae.		

P.
F 6. Tinct. Valerianae c. ammoniacum
Rp. Tinct. val. simpl. 3j
Ammon. carbon. 7 gr.

Wirkung.
Secretion lefro
vond.



ina.

igend, Krampf stillend, Nerven reizend.

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Flüchtig und anhaltend reizend, erhitzend, Schweißtreibend.	1) In Krankheiten von großer Nervenschwäche, im höchsten Grade des Typhus, des Faulfiebers. 2) Beim heißen und kalten Brande. 3) Bei hartnäckigen Wechseln.	Infus. Pulver.	3j — jj 3j.	Nordamerika. XX. Cl. IV. Ord.
Flüchtig reizend, Krampf stillend, Schweißtreibend, die erhöhte Reizbarkeit der Nerven herabstimmend.	1) In chronischen Nervenkrankheiten, Lähmungen. 2) Als Roborans bei Nervenschwäche. 3) In Nervenfiebern. 4) Gegen Würmer. 5) Bei Krämpfen und Convulsionen. 6) Zur Beförderung der Secretionen, bei Gicht, Rheumatismus. 7) <i>3. Dosis. 1. Dosis bei 1. Dosis.</i>	Pulver. Infus. Tinctur. Extract. Del.	3j — 3jj — 3ß — j gr. x — xx gtt. j — vj. gr. vi	Auf trocknen und bergigten Anhöhen und feuchten Wiesen durch ganz Europa. III. Cl. I. Ord.
	Man hat sie bei asthenischen Fiebern, Würmern gebraucht.			In Amerika wachsend. Sie hat in Allem viel Aehnlichkeit mit der Serpentina. IV. Cl. I. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Oleum Cajaput.	Caja- putöl.	Melaleuca Leucaden- dron.		
Herba Menthae piperitae.	Pfeffer- münze.	Mentha piperita.	1) Aqua Menthae piperitae. 2) Oleum Menth.pip. 3) Rotulae Menth.pip. 4) Spiritus Menth.pip.	
Herba Menthae crispae.	Krause- münze.	Mentha crispa.	1) Aqua Menthae crispae. 2) Oleum Menth. crisp.	
Herba Thymi.	Thymi- an.	Thymus vulgaris.		
Herba Melissae.	Melisse.	Melissa officinalis.	1) Aqua Me- lissae. 2) Oleum Melissae.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Flüchtig reizend, erhitzen, Blähung treibend und Krampf stillend.	1) Bei krampfhaften Affectionen des Magens, auch der übrigen Theile des Organismus, bei der Epilepsie, Hysterie. 2) Bei Wechselfiebern. 3) Bei Lähmungen vorzüglich der Zunge.		gtt j — vj.	Ostindien. Aus den Blättern des Cajaputbaums wird das Del durch Destillation erhalten. XVIII. Cl. III. Ord.
	1) Bei allen krampfhaften Affectionen des Magens und Darmkanals, bei Schwäche desselben, Blähungen Durchfällen und Erbrechen. 2) Bei hysterischen und hypochondrischen Beschwerden. Außerlich bedient man sich derselben zu Umschlägen bei Verhärtungen, Milchknoten.	Pulver. Infus. Del.	℞ — j ℞ — gtt — j	In England wild, bei uns gepflanzt. Deutschland, Schweiz, Sibirien. XIV. Cl. I. Ord.
Krampf stillend, Schmerzlindernd.				Im südlichen Europa wild, bei uns gepflanzt. XIV. Cl. I. Ord.
Mäßig reizend, Schweiß treibend,	1) Bei Rheumatismus. 2) Bei hysterischen Krämpfen.	Infus.	℞.	Schweiz, Italien.

Officinetter Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Herba Rorismari- ni s. An- thos.	Rosma- rin.	Rosmarinus officinalis.	1) Oleum Roris ma- rini. 2) Spiritus Roris ma- rini. 3) Unguen- tum Roris marini.	1) Aether sches De 2) Resinos
Semen Carvi.	Küm- mel.	Carum Carvi.	1) Oleum Carvi.	
Herba Chenopo- dii ambro- siaci s. Bo- tryos Mexica- nae.	Mexika- nisches Tran- sben- traut.	Chenopo- dium am- brosioides.		
Herba Mari veri.	Amber- traut. Rosen- traut.	Teucrium Marum.		Campher- artiges ätherisches Del.
Flores Lavendu- lae.	Spieße. Laven- del.	Lavendula Spica.	1) Spiritus Lavendu- lae. 2) Oleum Lavendu- lae.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Krampf stillend.	3) Bei Catarrhen.			XIV. Cl. I. Ord.
	1) Bei Paralyfen. 2) Bei chronischem Rheumatismus. 3) Bei krampfhaften Beschwerden.	Del. N. Sal- be.		Im südli- chen Europa wild. II. Cl. I. Ord.
Reizend, erhit- zend, Blä- hung treibend.	Als Magenmittel und gegen Blähun- gen.	Pul- ver.	ʒi —	Auf Wiesen und in Gär- ten. V. Cl. II. Ord.
Flüchtig reizend, expecto- rierend, Schweiß und Harn treibend.	1) Bei der Brustwaf- fersucht. 2) Beim krampfhaften Asthma.	Thee.	ʒi —	Der wohl- riechende Gänsefuß wächst im südlichen Europa wild. V. Cl. II. Ord.
Flüchtig reizend, Niesen erzeu- gend.	Wie ähnlich flüch- tige, reizende Mittel; vorzüglich im Nerven- und Faulfieber.	In- fus. Pul- ver.	ʒß. 3ß.	Spanien. XIV. Cl. I. Ord.
Reizend.	Im Nervenfieber. Aeußerlich bei Läh- mungen und Schwäche der Glieder.	Del. Spi- rit.		Südliches Europa. XIV. Cl. I. Ord.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Flores Chamo- millae Ro- manae.	Römische Kamillen.	Anthemis nobilis.	1) Oleum Chamo- millae ae- thereum. 2) Oleum Cham. coctum. 3) Aqua Chamo- millae.	
Flores Chamo- millae vul- garis.	Gemeine Kamillen.	Matricaria Chamo- milla.	1) Aqua Chamo- millae. 2) Oleum Cham. ae- thereum. 3) Oleum Cham. coctum. 4) Extrac- tum Cham. aquosum.	
Coffea. (Semina s. Faba.)	Kaffee.	Coffea ara- bica.	Extractum Coffeae.	1) Gummi 2) Schleim 3) Harz. 4) Extrac- tstoff. 5) Kalkar- tiges Del 6) Reine Substanz.





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Unhaltend und durchdringend reizend, Krampf stillend, Blähung treibend, Schweiß befördernd.	1) Bei Krämpfen aller Art.	Pulver.	3j — ij	Südliches Europa.
	2) Beim Wechselfieber.	In-		
	3) Bei Coliken, Blähungen.	fus. Del.	3jij - vj gtt jv - vj.	
	4) Bei Fehlern der Menstruation.			
	Der innere Gebrauch ist dem der Römischen Kamille gleich. Aeußerlich bei alten Geschwüren, kaltem Brande, Coliken, Krämpfen, Verstopfungen.	— Um- schl. Klyst.	—	XIX. Cl. II. Ord.
Reizend, stärkend, aufheiternd, Blähung treibend, Stuhl ausleerend, Gedächtnis-	1) In Nervenfiebern. 2) In Wechselfiebern. 3) Als Gegengift, bei Opium, Belladonna. 4) Beim convulsivischen Asthma. 5) Bei Krankheiten der Nieren.	Decoct. Pulver.	3jij — 3j 3i — 3j —	Persien, Aethiopien.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
				7) Rück- stand —.
Semen Foeniculi.	Fenchel.	Anethum Foeniculi.	1) Aqua Foeniculi. 2) Oleum Foeniculi.	
Flores Sambuci.	Rinder- blumen. Hollun- der.	Sambucus nigra.	1) Aqua flo- rum Sam- buci. 2) Roob Sambuci.	







Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
niß stär- kend, die Phanta- sie bele- bend.	6) Bei Schwäche und Verschleimung des Darmkanals.			V. Cl. I. Ord.
Gelinde reizend, beson- ders auf die Re- spira- tionsor- gane und den Darm- kanal; expecto- rierend, Blä- hung treibend.	1) Bei Krankheiten des Magens, Wind- colik, Blähungen, Verschleimungen. 2) Bei Verschleimung der Brust. 3) Um die Milchab- sonderung zu ver- mehren.	Pul. ver. De- coct. Del.	gr. x — xxx. 3ij — gtj-vj	Im südli- chen Europa wild, bei uns gebaut. V. Cl. II. Ord.
Gelinde reizend, beruhig- end, Schweiß beför- dernd.	1) In allen Krank- heiten wo auf die Hautausdünstung gewirkt werden soll, als: Rheumatis- mus, Catarrh, bei allen hitzigen Krank- heiten, Rose. 2) Bei hysterischen Krämpfen. 3) Als zerkleinerndes, Schmerz linderndes, erweichendes Mit- tel zu Umschlägen.	In- fus. Roob.	3ij-3ß 3ß—j	Asien, Eu- ropa. V. Cl. III. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Semen Anisi stellati.	Sternanies.	Illicium anisatum.		
Semen Anisi vulgaris.	Anies.	Pimpinella Anisum.	1) Oleum anisi aethereum. 2) Oleum anisi sulphuratum. 3) Aqua anisi destillat. 4) Liquor ammonii anisati.	

c. Anthel-

Semen Cinae s. Santonici.	Zittwer- saamen. Wurm- saamen.	Artemisia judaica.	1) Confec- tio sem. Cinae.	
Radix Filicis maris.	Farn- frant- wurzel. Wurm- farn.	Aspidium Filix mas.		





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	Ist in der Wirkung und Anwendung ganz dem Anies gleich.	Pulver.	gr. v — xxx.	Japan, China. XIII. Cl. VI. Ord.
Mäßig reizend, Blähung treibend, die Expectoration befördernd.	1) Bei Rauhgkeit und stockendem Schleimauswurf. 2) Bei Magenschwäche und Anhäufung von Blähungen.	Pulver.	gr. x — 3ß —	Ursprünglich Egypten und in Deutschland gebaut. V. Cl. II. Ord.

mintica.


Anhaltend reizend, stärkend, Wurmtreibend.	Wir wenden ihn vorzugsweise bei den Ascariden und Spulwürmern an.	Pulver. Elect.	3ß — j 3ß — j	Der jüdische Beifuß wächst in Palästina, Syrien wild. XIX. Cl. II. Ord.
Anhaltend reizend, Wurmtödtend.	Hauptsächlich gegen den Bandwurm. Schon Dioscorides hat dieses Mittel gegen Würmer empfohlen.	Elect.	3j — jj	In schattigen Wäldern durch ganz Europa wachsend. XXIV. Cl. V. Ord.

3. Aetherea

Da diese Mittel ausser dem ätherischen Princip noch manenter und erhaltender auf das Gefäßsystem, reizen Gefäße und erregen leicht Hämorrhoiden.

a. Bal-

Officiner Name.	Trivial	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Pinus.	Fichte.	Pinus syl-	1) Terebin-	1) Aetheris-
	Kiehn-	vestris.	thina ve-	ches Del.
	baum.	Pinus La-	neta et	2) Harz.
		rix.	communis.	
			(Terpen-	
			tin.)	
			2) Oleum	
			terebinthi-	
			nae.	
			3) Pix alba	
			s. Resina	
			alba, Bur-	
			gundica.	
			4) Pix nigra	
			s. Resina,	
			commu-	
			nis.	



resinosa.

harzige Bestandtheile enthalten, so wirken sie auch per-
den Darmkanal, purgiren leicht, erhitzen die Abdominal-

samica.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Sehr er- hitzend, reizend, zerthei- lend, die Sec- und Excre- tionen vermeh- rend, Urin be- förz- dernd.	1) In Krankheiten der Nieren und Urin- werkzeuge. 2) Gegen übermäßige Schleimabsonde- rung anderer Or- gane, als beim wei- ßen Fluß, bei der Schleimschwind- sucht — 3) Bei arthritischen Geschwüren und in- nern Exulcerationen. 4) Gegen Würmer.	Pil- len. Emul- sio.		Die gemeine Fichte (Pi- nus sylve- stris) wächst im nördli- chen Europa wild. Die Lerchen- Fichte (Pi- nus Larix) wächst auf
Stark reizend, vorzüg- lich auf die Urin- wege; erhit- zend, zerthei- lend.	1) Bei Krankheiten der Urinwege, Ver- eiterungen und Steinschmerzen. 2) Gegen Würmer. 3) In der Wassersucht. 4) Bei der Gicht und chronischem Rheu- matismus.	Sal- be. Pfla- ster.	gtt j-jj — x.	Gebirgen des südöst- lichen Euro- ropa und in Sibirien wild.
	Als Pflaster auf Le- der gestrichen gegen Rheumatismus.			XXI. Cl. VIII. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			5) Pix li- quida. (Theer.)	
			6) Aqua pi- cea.	
			7) Colo- phonium s. Resina nigra.	
Petroleum s. Oleum Petrae.	Steinöl. Bergöl. Erdöl.			
Succinum.	Bern- stein. Agstein.		1) Acidum Succini. 2) Oleum Succini. 3) Tinctura Succini. 4) Tinctura	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Das Theer- wasser wird als diureti- sches, antisep- tisches Mittel benutzt.	Ist beim Scorbut, bei chronischen Haut- ausschlägen und Ge- schwüren empfohlen.	Tägl.	℥j.	
	Außerlich bei Ge- lenk- und Kniegeschwül- sten.	Pul- ver.	mit ℞.	
Sehr reizend auf Nerven- und Ge- fäßsy- stem, Urintrei- bend.	1) Bei der Gicht. 2) In der Wassersucht. 3) Bei Paralyse. 4) Gegen Würmer. Außerlich bei kal- ten Geschwülsten und Frostbeulen.		gtt j — jv —	Es ist ein natürlich flüssiges Steinharz, das hin und wieder, vor- züglich in Italien und Persien her- vorquillt und auf dem Wasser ge- funden wird.
Reizend, Schweiß- und Urin- treibend.	Als Räucherung bei Gicht, Rheumatismus, Schwindsucht. Von den Präpara- ten giebt man, auch	Säu- re. Del.	gr. jj — xx. gtt jv — viii.	Der meiste Bernstein wird in Preußen an der Küste der Ostsee, von Pillau

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			Succini balsamica. 5) Liquor eornu cer- vi succina- tus.	
Asphal- tum, s. Bitumen Judaicum.	Berg- pech. Asphalt.			
Balsamum de Mecca.	Mecca- balsam. Gilead.	Amyris gileadensis et Opobal- samum.		
Balsamum Copaivae.	Copai- va- Balsam.	Copaifera -officinalis.		
Balsamum Peruvia- num ni- grum s. Indicum.	Peruvi- anischer Balsam.	Myroxylon peruife- rum.	1) Tinctura bals. peruv. 2) Syrupus bals. peruv.	



Bei Lygationen des Fußes Gend. gelöst
Balf. copaiout 3j.
Salve in
Spir. vini rect. 3j.
add.
Aq. destill. 3v.
A. D. L. zum Aufsteigen

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	innerlich bei Gicht, Rheumatismus, Krämpfen, Lähmun- gen, chronischen Aus- schlägen.	Tink- tur.	gtt x—	bis längs der Kuri- schen Näh- rung gefun- den.
Äußerst reizend, durch- drin- gend, er- hitzend, specifisch auf Schleim, abson- derung.	In der Schleim- und Eiterschwindsucht.	Del. Harz.	gtt j-v gr. v-x.	Man findet das Asphalt vorzüglich in China, Palästina, auf dem ro- then Meere — schwim- mend.
	Berühmt in der Schwindsucht.			Arabien. VIII. Cl. I. Ord.
Reiz- zend, vorzüg- lich auf die Harn- wege, erhit- zend.	1) Bei innern Ge- schwüren, um die Ei- terung zu mindern. 2) Bei schleimigen Pro- fluvien, Nachtripper, weißem Fluß.	Emul- sio.	gtt xxx — 3j.	Südame- rika. X. Cl. I. Ord.
Sehr reizend, erhit- zend.	1) In der Schleim- schwindsucht. 2) Bei wirklich vor- handenen Lungen- geschwüren. Äußerlich als Ro- borans bei Lähmung und Schwäche, und um Eiterung zu verbessern.		gtt xx—	Südame- rika. X. Cl. I. Ord.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Balsamum canadense.	Canadischer Balsam.	Pinus canadensis.		
Olibanum, s. Thus. (Gummi.)	Weihrauch.	Juniperus lycia. (Jun. thurifera.)		
Benzoe, s. Asa dulcis. (Gummi.)	Benzoe.	Styrax Benzoe.	1) Tinctura Benzoës. 2) Tinctura Benzoës composita. 3) Tinctura opii benzoïca. 4) Acidum benzoicum s. Flores Benzoës.	1) Harz. 2) Benzoes. 3) Balsamischer und 4) Aromatischer Stoff.
Gummi Masticis.	Massix.	Pistacia Lentiscus.	1) Tinctura masticis. 2) Spiritus masticis compositus.	
Gummi Storacis. (Styrax.)	Storax.	Styrax officinalis.		





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	Bei Erschlaffung und Schwäche der Urinwege, Nachtripper, weißem Fluß.		gtt x— xx.	Nordamerika. XXI. Cl. VIII. Ord.
	Eigentlich nur als Räucherungsmittel, bei heftigen Schmerzen, Rheumatismus, Lähmungen, profusen Schleimabsonderungen.			Südliches Europa, nördliches Afrika. XXII. Cl. XIV. Ord.
Sehr reizend, specifisch auf die Brust.	Innerlich selten gegen chronische Brustbeschwerden, Husten, Krämpfe. Außerlich aber häufig als Schönheitsmittel, bei Sommersprossen, Leberflecken.	Säure.	gr. jv— vjij. mit ▽.	Asien, vorzüglich auf Sumatra. X. Cl. I. Ord.
	Bei profusen Schleimflüssen des Darmkanals, der Brust, bei Engbrüstigkeit, Lungen sucht.			Südliches Europa. XXII. Cl. V. Ord.
	Außerlich bei unreinen Geschwüren.			Italien, Syrien, Judäa. X. Cl. I. Ord.

b. Gummi

Diese Mittel wirken abführend, eröffnend auf den Blutsystem als die Balsamica.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Gummi Asae foetidae.	Stinkender Asant. Teufels- dreck.	Ferula Asa foetida.	1) Tinctura Asae foet. 2) Empla- strum foe- tidum.	1) Harz. 2) Gummi. 3) Aetheres- um.
Gummi Ammoniacum.	Ammoniack.	Heracleum gummiferum.	1) Tinctura gummi am- moniaci. 2) Pilulae de gummi ammon. 3) Lulapium gum.amm. 4) Syrupus gum.amm. 5) Empla-	1) Harz. 2) Gummi. 3) Wasser.





resinosa.

Darmkanal, expectorirend und weniger erhitzend auf

Wir- fung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Ziemlich stark reizend, vorzüg- lich auf die Or- gane der Brust und des Unter- leibs; auflö- send, Krampf stillend, Blä- hung und Wurm treibend, specifisch auf die Kno- chen.	1) Bei allen Nerven- krankheiten, spasti- scher und convulsi- vischer Art.	Pul- ver.	gr. v — x.	Perfien. Die Perser gewinnen dieses Gum- mi, indem sie in die Wurzel dies- er Pflanze Einschnitte machen.
	2) Bei chronischen Brustkrankheiten, die sich auf Krampf und Verschleimung gründen.	Pil- len. Emul- sio.	— 3j —	
	3) Gegen Verstopfun- gen der Unterleibs- eingeweide, als: Gelbsucht, Wasser- sucht.			
	4) Gegen Würmer, Krankheiten der Kno- chen, bössartige Ge- schwüre, Verschlei- mung des Magens. Aeußerlich bei Krampf, bössartigen Geschwüren —.	Klyst. Pfla- ster.		V. Cl. II. Ord.
Mehr auflö- send, we- niger er- hitzend und reizend, sämmt- liche Se- cretio- nen be-	1) Bei Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibs.			Afrika. Wir erhal- ten das Am- moniak in ziemlich an- sehnli- chen Stücken aus dem öst- lichen Afrika über Alexan-
	2) Bei Drüsenkrank- heiten.	Pul- ver.	gr. v — xx.	
	3) Bei Nervenkrank- heiten.	Pil- len.	—	
	4) Bei der Amaurosis.	Zinf- tur.	gtt xx.	

Officineller Name.	Tribtal.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			strum am- moniacum. 6) Empla- strum Li- thargyri composi- tum. 7) Lac am- moniaci.	
Gummi Galbanum.	Mutter- harz.	Bubon Gal- banum.	1) Tinctura Galbani. 2) Empla- strum ru- brum s. oxycroce- um. 3) Empla- strum ad clavos pe- dum. 4) Oleum Galbani aethereum.	
Gummi Myrrhae.	Myrrhe.	Amyris Kataf.	1) Tinctura Myrrhae. 2) Extrac- tum Myr- rhæ aquo- sum.	1) Harz. 2) Del. 3) Gummi.





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
för- dernd. In gro- ßen Ga- ben pur- girend und beim längern Ge- brauch die Ver- dauung stö- rend.	5) Bei chronischen Brustkrankheiten. 6) Als Pellenz. Aeußerlich als auf- lösendes zertheilendes Mittel.	Pflas- ter.		drien. Diese Stücke sind wie aus in einander geschmolze- ne Körner zusammen- gefest. V. Cl. II Ord.
Krampf stillend, Nerven stärkend, auflö- send, Blä- hung treibend und die Secre- tionen besör- dernd.	1) Bei allen Nerven- krankheiten. 2) Bei Menstrualver- stopfung. 3) Bei der Bicht und Wassersucht. Aeußerlich zur Zer- theilung von Verhär- tungen, als Krampf stillendes Mittel und bei bösen Geschwüren.	Zink- tur.	gtt xx — 3j	Am Vorge- birge der gu- ten Hoff- nung als ein krautarti- ger Strauch wachsend, in dessen Rinde man Einschnitte macht und dies Gum- mi erhält. V. Cl. II. Ord.
Sehr reizend, das Ge- fäßsy- stem er- hitzend, auflö- send, zer- thei-	1) Bei stockender Men- struation. 2) Bei allen innern Exulcerationen, als bei Schwindsucht der Lungen, der Nieren—	Pul- ver. Pil- len.	gr. v —	Arabien. Die Myrrhe fließt, als Saft, nach gemachten Einschnit- ten aus der Rinde dieser

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			3) Oleum Myrrhae.	
Gummi s. Resina Guajacum.	Guajac- harz.	Guajacum officinale.	1) Tinctura Guajaci volatilis, s. ammo- niata. 2) Sapo Gu- ajacinus.	






C l a s s - N a r c o -

Bis jetzt ist es der Chemie noch nicht gelungen, einzustellen, wir erkennen das Wesen derselben nur aus der Wirkung ist specifisch auf's Nervensystem und auf's Sensorium; auch deprimirend und bringen eine wesentliche Veränderung auf das arterielle System, die Sec- und Excretionen wirsgativ afficirend, die Verdauungsthätigkeit hemmend und Fäulnis im Halse, Verdunklung der Sehkraft des Auges, endlich Lähmung, Schlagfluß, Auflösung der Säfte, Blutheiten des Nervensystems, bei Krankheiten wo es auf ganz ankommt, bei örtlichen Entzündungen nachdem die herrscht, zur Beförderung der Crisen u. s. w.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Belladonna. (Herba et Radix.)	Tollkirsche.	Atropa Belladonna.	1) Extractum Belladonnae. 2) Oxy mel Belladonnae. 3) Emplastrum de Belladonna.	1) Narcoticum. 2) Mehrere Salze mit alkalischer Grundlage.





s i s VIII.

t i c a.

nen narcotischen Stoff aus ihnen auszuschelden und dar-
 Wirkung auf den thierischen Organismus. Ihre Wir-
 viele wirken nicht nur aufs Sensorium belebend, sondern
 rung, Umstimmung der Reizbarkeit im Nerven hervor.
 fen sie gelinde excitirend, auf das gastrische System ne-
 den Motus peristalticus vermindern. Sie bewirken Trost-
 Schwindel und Schlaffsucht, Uebelkeit und Erbrechen, und
 tungen, Fäulniß u. s. w. Anwendung: bei allen Krank-
 Vermehrung oder Verminderung der Excretion eines Dr.
 active Entzündung gebrochen ist und die Sensibilität vorz-

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Specifisch auf die Augen, die Pu- pille er- weit- ernd; Trocken- heit im Halse er- regend, den Puls- schlag, die Haut u. Harn- absonde- rung vermeh-	1) Am berühmtesten in der Wasserscheu. 2) Bei der Manie und Melancholie. 3) Beim Krebs. 4) Bei der Epilepsie und andern convul- sivischen Krankhei- ten. 5) Bei Lähmungen. 6) Bei Verhärtungen und Verstopfungen der Unterleibsinge- weide. 7) Bei hartnäckigen Wechselfiebern. 8) Bei hartnäckiger Sicht und Rheuma- tismus.	Pul- ver. Ex- tract.	gr. j + jv — gr. $\frac{1}{2}$ — j.	Südliches Europa. Die beste Weise, die Belladon- na zu ge- ben, ist im- mer die, daß man mit kleinen Gaben an- fängt, und, wofern sich nicht Schwindel und andre beunruhi- gende Symptome

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Opium. NB. Der Tod, welcher nach starken Gaben des Opiums entsteht, tritt unter folgenden Erscheinungen ein: Zuerst entsteht Verlust des Bewußtseyns, der Sinne, des Gefühls, Erbrechen, Convulsionen, Erismus und Tetanus mit Schaum vorm Munde. Der	Mohnsaft. Opium.	Papaver somniferum. NB. Gegen die Vergiftung durch Opium soll nach Hahnemanns Versicherung der Campher das beste Gegenmittel seyn. Auch ein recht kräftiger Kaffee mildert die betäubende Wirkung des Opiums.	1) Extractum opii aquosum. 2) Extractum opii vinosum. 3) Tinctura opii simplex s. thebaica. 4) Tinctura opii crocata s. Laudanum liquidum Sydenham. 5) Tinctura opii benzoica. 6) Syrupus opiat. 7) Pulvis opiat. 8) Emplastrum opiatum.	1) Opiumstoff. 2) Mohnsäure. 3) Extractivstoff. 4) Gummi. 5) Harz. 6) Kleber.

Tinct. opii ammoniac.

Pemorie acid.

Saffron aa 3℥i


Opium sliced 3℥

Oil of Anise 3i

Spir. of ammoniac. ℥ss

Diger. for 1st day and filter.

R. Ed. a. H. St.



Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
rend, betäubend.	Aeußerlich bei eingeklemmten Brüchen, Verhärtungen, Krebs, zur Erweiterung der Pupille.	Decoct.		einstellen, so lange steigt, bis man vortheilhafte Wirkungen auf die Krankheit sieht. V. Cl. I. Ord.
Die Gewohnheit, die Krankheit, das Klima und die Gabe verursachen einen großen Unterschied in der Wirkung. Flüchtig reizend, belebend, vorzüglich auf's Sensorium und arterielle System; die	Innerlich: 1) In allen chronischen Nervenkrankheiten. 2) In allen Krankheiten mit Krämpfen und starken Schmerzen. 3) In allen Krankheiten wo ein heftiger Reiz auf die Nerven wirkt. 4) Beim nervösen Typhus, wo Neigung zu Krämpfen, Delirien ist. 5) Beim Wechselfieber, wo die China nicht zureicht. 6) Bei Profluvien aller Art, wenn sie Folge erhöhter Reizbarkeit sind. 7) Bei Unterdrückung der Hautausdünstung und auch anderer Secretionen.	Pul. ver. Extract. in Pillen. Tinctur.	gr. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ — jv. — gttjj — x — 3ß.	Im Oriente, südlichen Europa wachsend. Das Optum ist eine gummig-harzige Substanz, die aus den noch nicht völlig reifen Saamencapseln des Papaver somniferum gewonnen wird, indem man die Saamencapseln einschneidet und das Optum als ein milchähnlicher Saft ausfließt, der

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Puls wird voll, langsamer, die Augen werden krampfhaft verschlossen, wild, blau-roth, der Athem kurz, der Puls klein, aussehend, es entstehen Blutungen und so erfolgt der Tod.			9) Pulvis Doweri.	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Respiration wird ängstlich, schwer, die Hitze der Haut und die Ausdünstung derselben vermehrt, der Appetit geschwächt, Uebelkeit und Erbrechen bewirkt und auf die Geschlechte schwächend. Ueber die eigentliche Wirkungsart des Opiums ist man noch immer nicht einig.	8) Bei chronischen Geschwüren. 9) Beim heißen Brande. 10) In der Lustseuche. Außerlich: 1) Zur Verstärkung des innern Gebrauchs, bei hartnäckigem Durchfall. 2) Als krampfstillendes, schmerz lindendes Mittel, bei Coliken, Zahnschmerz, Trismus. 3) Bei bösartigen Geschwüren. 4) Bei Augenkrankheiten. 5) Zur Auflösung verhärteter Drüsen. 6) Bei Steinbeschwerden, Leiden der Urinblase.	Pflast. Salben. Tinkt.		an der Luft austrocknet. Contraindicantia: 1) Plethora. 2) Unreinigkeiten der ersten Wege. 3) Wirkliche Entzündung. XIII. Cl. I. Ord.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Herba Hyoscyami (Semen)	Bilsen- kraut.	Hyoscyamus niger.	1) Extractum hyoscyami. 2) Oleum hyoscyami. 3) Emplastrum hyoscyami. NB. Die besten Gegenmittel sind Essig, Del, Milch und gleich nach dem Genuß des Giftes Brechmittel. Dies gilt auch beim Stechapfel. —	
Herba Stramonii.	Stech- apfel- kraut.	Datura Stramonii.	1) Extractum Stramonii. 2) Tinctura Stramonii.	






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Reizend, betäu- bend, be- ruhig- end, schmerz- stillend, krampfs- hebend. Wo Opium nicht paßt, ist dies Mittel zu em- pfehlen, denn es erhitzt und ver- stopft nicht, wird leichter vertra- gen und wirkt wohl- thätig auf die Nerven ohne zu schwä- chen.	1) Bei erhöhter Sen- sibilität, sowohl in acuten als chroni- schen Krankheiten. 2) Selbst zur Heilung chronischer Nerven- krankheiten, als Hy- sterie, Epilepsie, Starrkrampf, krampfhaftem Hu- sten. — Außerlich bei Drüsenverhärtungen, entzündeten Haemor- rhoidalknoten, schmerz- haften Geschwülsten. —	Ex- tract. Pul- ver. Emul- sio. Ulm- schl.	gr. j — xx. — gr. jv — vjij. —	Ueberall an Wegen und Dörfern in Europa. Rübe, Zies- gen, Schaaf- und Schwei- ne sollen dies Kraut ohne Nach- theil fress- en, und die Pferde da- von fett werden. Beim Menschen erregt es Trunken- heit, Kopf- weh, Schwindel, Doppel- sehn, gänzlichen Verlust der Sinne, Läh- mung, Con- vulsionen u. s. w. V. Cl. I. Ord.
Reizend, betäu- bend, krampfs- stillend.	1) Bei Gemüthskrank- heiten, als Manie, Melancholie. 2) Bei der Epilepsie und hartnäckigen	Pul- ver. Pillen.	gr. $\frac{1}{4}$ — j — —	An wüsten unbebauten Stellen in Europa.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Herba Nicotiana- nae.	Taback.	Nicotiana Tabacum.	Extractum Nicotianae.	Nach Vau- quelin ist der wirk- same Be- standtheil des Ta- bacs, ein schar- fes, flüchti- ges, Niesen erregendes, farbenloses, im Alkohol und Wasser lösbares Princip u. f. w.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Es ist eins der stärksten betäubenden Mittel, es erregt in starken Gaben Delirien, Verdunkelung der Augen, apoplectische, paralytische Zufälle.	örtlichen Nerven zu zufallen, beim Gesichtsschmerz. 3) Neuerdings gegen das krampfhaftes Asthma.	Tinkt.	gt. vj - i.	In großen Gaben wirkt es gleich dem Bilsenkraut vergiftend auf den Organismus. V. Cl. I. Ord.
Specifisch auf den Darmkanal und die Nieren, die Absonderungen vermehrend; reizend, betäubend. In großen Gaben Ekel, Er-	1) Als Diureticum in der Wassersucht. 2) Bei Ischurie und Strangurie. 3) Beim schleimigten und krampfhaften Asthma. 4) Bei Fluss und Trommelsucht. 5) Bei chronischen Hautausschlägen als Waschwasser. 6) Bei eingeklemmten Brüchen in Abkochung und Dampf als Klystier.	Ex tract. Decoct.	gr. j - iv. 3j - 3ß -	Ursprünglich in Amerika wild, bei uns angepflanzt. 1560 wurde der erste Saame von den Spaniern nach Europa gebracht und 1564 kam das Kraut durch Nicot auf. V. Cl. I. Ord.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Semina Cannabis.	Hanf- saamen.	Cannabis. sativa.		
Stipites Dulcamarae.	Bitter- süßsten- gel. Ulspran- ke. Syat- disch- kraut. Krause- holz.	Solanum Dulcamara.	1) Extrac- tum Dul- camarae.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
brechen, Durch- fall, Ro- lit, Schwin- del, Kopf- weh, Be- raus- chung u. s. w. erres- gend.				
Reizend, betäu- bend. Im Oriente ge- braucht man die- se Pflanz- ze, wie das Opium, zu be- raus- schenden Geträn- ken.	Als Emulsion in Krankheiten der Urin- wege, bei Steinbe- schwerden, Tripper. Außerlich als er- weichendes, krampfstil- lendes Mittel.			Ursprüng- lich in Per- sien, und jetzt auch in Europa wild wach- send. XXII. Cl. V. Ord.
Betäu- bend, auslö- send, Schweiß- treibend, und Urin beför- dernd,	1) Bei hartnäckigen chronischen Exanthem- en. 2) Bei chronischen Ca- tarrhen mit Heiser- keit, Schwindsucht. 3) Bei hartnäckiger Sicht, Rheumatis- mus.	De- coct. Ex- tract in Pill.	3ij — 3j. tägl. 3j.	An feuchten Orten durch ganz Europa. In Mens- ge genossen, erregt es Ekel, Er- brechen, Zit-

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestands- theile.
Nux- vomica.	Krähen- augen.	Strychnos nux vomica.	1) Extrac- tum nu- cis vomicae.	1) Extrac- tstoff. 2) Gummi. 3) Zucker. 4) Harz. 5) Apfelsau- rer Kalk. 6) Faserstoff. 7) Wachs.
Taxus. (Folia, Baccae et Lignum.)	Taxus. Eiben- baum.	Taxus baccata.	1) Extrac- tum taxi.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Ekel und Erbrechen erregend.	4) Bei der Selbstsucht. 5) Beim weißen Fluße. 6) Bei der Lussseuche.			tern, Convulsionen, Schwindel, Augenentzündung, Irreden —. V. Cl. I. Ord.
Stark reizend, in großen Gaben cautiously und tödtend.	1) Bei hartnäckigem Wechselfieber. 2) Bei chronischen Nervenkrankheiten. 3) In chronischen Durchfällen und Ruhren. 4) Gegen Würmer. 5) In der Wassersucht.	Extrakt.	gr. ii. — x.	In Ostindien wachsend. Sie sind besonders für blindgeborene Thiere, als Hunde, Füchse, Wölfe, Katzen, Ratten ein tödtliches Gift. V. Cl. I. Ord.
Reizend, erhitzend, betäubend; specifisch auf das Uterin-system. In großen Gaben Hitze, Durst, beschleunigen.	1) Bei Fehlern der Menstruation. 2) Bei Verstopfungen und Unterdrückungen der Hämorrhoiden. 3) Bei der Epilepsie und andern convulsivischen Krankheiten. 4) Bei Rheumatismus. 5) Beim Wechselfieber.	Pulver.	gr. v. —	Im südlichen Deutschland und in mehreren Ländern von Europa wild. Für Pferde, Kühe und Ziegen sind sie ein Gift. XXII. Cl. XII. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Ignatia.	Fieber- muß.	Ignatia amara.		Gleich den den der
Faba Sanc- ti Ignatii.	Ignaz- bohne.			Krähen- augen.
Crocus.	Safran.	Crocus sa- tivus.	1) Tinctura croci.	1) Gummi.
Gebrauch- lich ist die breittheilige Narbe (stigmata) der Blume.			2) Extrac- tum croci.	2) Eiweiß.
			3) Syrupus croci.	3) Wachs.
				4) Wasser.
				5) Faserst.
				6) Del.
				7) Polychrit.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
nigten Puls, Aengstlichkeit, Kopfweg, Brechen und Purgiren verursachend.				
	Man hat sie besonders gegen Wechselfieber, und auch bei Epilepsie, Asthma empfohlen.	Pulver.	gr. jj. — x.	Ein hoher schöner Baum auf den Philipinischen Inseln. V. Cl. I. Ord.
Reizend, insbesondere auf die Blutgefäße; erhöhend, Schweiß und Auswurf befördernd, zertheilend, in großen Gaben betäubend.	1) Als beruhigendes schmerzstillendes Mittel bei krampfhaftem schmerzhaftem Husten der Kinder. 2) Zur Beförderung der Haemorrhoiden und der Menstruation. 3) Bei gichtischen und rheumatischen Beschwerden.	Syrup. Pulver. Zinctur. Extract.	q. s. gr. j — v. gtt xx — xxx gr. j — jj.	Im südlichen Europa, in der Levante wachsend. In bedenkenden Gaben kann er den Tod verursachen und wirkt überhaupt dem Opium ähnlich. III. Cl. I. Ord.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Herba Rosmarini sylvestris.	Porst. Wilder Rosmarin.	Ledum palustre.		1) Extraktiv- und 2) Gerbestoff.
Rhododendron. (Folia, Stipites et Herba.)	Sibirische Schneerose.	Rhododendron Chrysanthum.		
Herba Lactucæ virosæ.	Giftlätzig. Wilder und giftiger Salat.	Lactuca virosa et scariola.	1) Extraktum lactucæ virosæ.	
Herba Cicutæ maculatæ s. Conii maculati.	Erdschierling. Wüchserich.	Conium maculatum.	1) Extraktum conii maculati s. cicutæ. 2) Emplastrum conii.	1) Harz. 2) Schleim. 3) Extraktivstoff. 4) Grünes Wachs. 5) Gummi. 6) Eiweiß.





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Reizend, betäu- bend; daher Tänmel, Kopf- schmerz, Schlaf.	1) Beim Reichenhusten der Kinder. 2) Bei Hautausschlä- gen. 3) In der Bräune.	Infus.	3℥ — j.	Im nördli- chen Euro- pa, Asien und Ameri- ka auf Torsmoos- en wild. X. Cl. I. Ord.
Anhal- tend rei- zend, be- täu- bend, Urin und Schweiß beför- dernd.	1) Gegen gichtliche und rheumatische Beschwerden. 2) Bei Lähmungen.	Infus. Pul- ver.	3ij — 3i.	Im östli- chen Sibi- rien. Das Kraut wirkt auf Menschen und Thiere narkotisch. X. Cl. I. Ord.
Narko- tisch, gistar- tig, vor- züglich Urin- treibend.	1) In Wassersuchten. 2) Bei krampfhaften Affectionen, vorzüg- lich der Brust.	Ex- trakt.	gr. ij. x — 5℥.	Südliches Europa. XIX. Cl. I. Ord.
Sehr reizend, betäu- bend, zerthei- lend; vorzüg- lich auf	1) Bei Krankheiten des Lymph- und Drüsen-systems, um Stocungen und Verhärtungen zu heben, bei Krebs und scrophulösen Verhärtungen. 2) Bei krampfhaften Krankheiten. 3) Bei hartnäckiger Gicht.	Ex- trakt. Pul- ver.	gr. j — ijj. gr. ij — iv.	Um die Dörfer, an den Rän- dern der Bäche, bei Schneide- mühlen in Europa wild. Unter den Thieren vertragen

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Herba Cicutae virosae s. aquaticae.	Wasser- schier- ling.	Cicuta vi- rosa.		
Herba Aconiti.	Eisen- hüttlein. Sturm- hut.	Aconitum neomonta- num. Aconitum Napellus. Aconitum Lycoccto- num.	1) Extrac- tum aco- niti. 2) Tinctura aconiti simplex. 3) Tinctura aconiti aetherea.	1) Wasser. 2) Faser- stoff. 3) Wach- harz. 4) Eiweiß- stoff. 5) Extrac- tivstoff. 6) Gummi. 7) Apfel- saurer und zi- tronenf. Kalk.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Lymphatische und Drüsen-system.	Aeußerlich um die innern Gaben zu verstärken, bei Krankheiten der Knochen, beim Mutterkrebs u. s. w.	Pflast. umschalg. Einspr.		Ihn Pferde noch am ersten. V. Cl. II. Ord.
Die ganze Pflanze ist giftig und mit dem Erdschierling in ihren Wirkungen übereinstimmend.	Man hat das Kraut eben so wirksam wie das des Erdschierlings gefunden, doch frisch benutzt, denn getrocknet verliehren sich die genannten Eigenschaften.	Pulv.	gr. j. — jj.	Der giftige Wasserschieferling wächst an Rändern der Flüsse, in Gräben, Seen und Teichen. V. Cl. II. Ord.
Stark und durchdringend reizend, auflösend, vorzüglich auf den Schweiß, Urin und Stuhlgang wirkend.	1) Bei hartnäckiger Sicht und Rheumatismus. 2) Beim schwarzen und grauen Staar. 3) Bei Verhärtungen des Magens. 4) Bei chronischen Kopfschmerzen. 5) Bei der Lustsenche. 6) Beim Gesichtsschmerz. 7) Bei asthenischen Brustkrankheiten.	Pulv. ver. Extrakt. Zinktur.	gr. $\frac{1}{2}$ - j — gtt. x — xv.	Die beiden ersten Arten des Eisenhuts wachsen auf den Gebirgen der Schweiz, Deutschland und die letzte Art im südlichen Europa. Dies Kraut ist für Menschen und Thiere giftig. XIII. Cl. III. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Herba Digitalis (purpureae).	Röther Finger- hut.	Digitalis purpurea.	1) Saccos. rec. ex- pres. 2) Extrac- tum Di- gitalis purp. 3) Tinctura Digitalis simplex. 4) Tinctura Digitalis aetherea.	1) Faser. 2) Gummi. 3) Schleim. 4) Kalt. 5) Eiweißst. 6) Wein- stein. 7) Wachs- harz. 8) Wasser. 9) Extrac- tstoff.
Herba Pulsatillae nigrican- tis.	Rüchens- schelle.	Pulsatilla nigricans. Anemone pratensis. Linné.	1) Extrac- tum pul- satillae nigric.	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Stark reizend, vorzüglich auf das Drüsen-system und die Urinwege, spezifisch auf irritabile System, auf die Thätigkeit des Herzens, den Puls langsam machend, Uebelkeit, Erbrechen, auch wohl Purgiren verursachend.	1) Bei allen Krankheiten des lymphatischen Systems, Scropheln, Geschwülsten. 2) Bei Wassersuchten. 3) Bei Krankheiten des Herzens und der großen Gefäße. 4) Bei Gemüthskrankheiten. 5) Gegen Bluthusten. 6) Gegen Sicht. 7) In der Schwindel sucht. 8) Bei acuten Exanthemen. 9) Beim schwarzen Staar. 10) Bei Drüsenverhärtungen.	Pulver. Extract. Infus. Tinctur. Umschlag.	gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ — jii gr. $\frac{1}{2}$ — jv. ʒj — 3ʒ gtt vj — x. XIV. Cl. II. Ord.	Auf Bergen in Europa wild, und in Gärten wegen Schönheit der Blume gezogen.
Stark reizend, caustisch, narcotisch und Urin treibend.	1) Bei Augenkrankheiten, schwarzem und grauem Staar. 2) Bei Drüsenverhärtungen. 3) In der Wassersucht. 4) Gegen Lähmungen.	Infus. Extract.	ʒj. gr. jj — x.	Auf trocknen Triften im nördlichen Europa. XIII. Cl. VI. Ord.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Rhus Toxicodendron et radicans. (Folia.)	Giftsumach. Wurzelsumach.	Rhus Toxicodendron et Rhus radicans.	1) Extractum rh. Toxic. et radic. 2) Tinctura rh. Toxic. et radic.	
Cortex Pruni Padi.	Eraubenskirschrinde, Faulbaum	Prunus Padus.	1) Aqua Pruni Padi. 2) Oleum Pruni Padi aethereum.	Blausäure.
Folia Laurocerasi.	Kirschlorbeerblätter.	Prunus Laurocerasus	1) Aqua Laurocerasi simplex. 2) Aq. Laurocerasi cohobata.	1) Flüchtiges Del. 2) Blausäure.

NB. Die Blausäure (Acidum zooticum, borussicum, caeruleum), welche wir nach Ittner's Methode (verbesserte Scheelsche) darstellen: man nimmt 8 Theile blausaures Eisenkali, schüttet es in eine Tubulatreorte, dazu 8 Thle. Wasser und 4 Theile concentrirte Schwefelsäure, legt eine Vorlage vor, in welcher sich 12 Theile Weinalkohol von 85° befinden, sodann destillirt man bei mäßiger Wärme 4 Theile über. Sollte das Destillat mit schwefliger Säure verunreinigt seyn, so rectificirt man es über gebrannte Magnesia.

In ℥j dieser Ittner'schen Blausäure sind grj concentrirte Blausäure enthalten, der ℥j giebt 60 Tropfen, mithin enthalten 30 Tropfen grj conc. Blausäure. Concentrirtes Kirschlorbeerwasser enthält in 3vj ℥ij, von der Ittner'schen Blausäure 30 Tropf. oder ℥ß, demnach enthalten ℥ij Kirschlorbeerwasser 3 Tropfen Ittner'sche Blausäure. Die Blausäure nach Bauquelin ist 5 Mal schwächer als die Ittner'sche Blausäure.





Wir- fung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Stark reizend, betäu- bend.	1) Bei Lähmungen, vorzüglich nach Rheumatismus, beim schwarzen Staar. 2) Bei der Sicht. 3) Gegen Lungenfucht.	Pul- ver. Ex- trakt. Tink- tur. Saft.	gr. j - jv — gtt x xxx.	Nordame- rika. V. Cl. III. Ord.
Beruhi- gend, schmerz- stillend, krampf- lin- dernd.	1) Bei Sicht und Rheumatismus. 2) Beim Wechselfie- ber. 3) Bei krampfhaften Beschwerden aller Art.	Inf- fus. Waf- fer. Dec. Pul- ver.	3j — gtt xv. gr. vjij.	Die Vogels- Pflaume wächst im nördlichen Europa und Asien wild. XII. Cl. I. Ord.
In mä- ßigen Gaben stark rei- zend, be- täubend, krampf- stillend, zerthei- lend; in großen Gaben Convul- sionen erzeu- gend, die Er- regbar- keit ver- nichtend und schnell tödtend,	1) Bei allen hart- näckigen Nerven- krankheiten, Con- vulsionen, selbst bei Gemüthskrankhei- ten. 2) Bei hartnäckigen Verstopfungen der Eingeweide des Un- terleibes. 3) Bei Krebsartigen Verhärtungen. 4) Bei Ripfchenschmer- zen, die nach der	Waf- fer.	gtt. x — xx — lx.	Die lorbeer- blättrige Pflaume wächst ur- sprünglich im Oriente wild, und wurde 1576 zuerst nach Europa ge- bracht. Die Blau- säure, wel- che als ae- therischer Stoff in der Vogels- Pflaume, im Kirsch- lorbeer und in den bit- tern Man-

Officinneller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
<i>[Faint, illegible text]</i>			<i>[Faint, illegible text]</i>	
<i>[Faint, illegible text]</i>			<i>[Faint, illegible text]</i>	
Amygda- lae amarae.	Bitter Mandel deln.	Amygdalus communis.	1) Oleum amygda- larum amar. aethere- um. 2) Aqua Amygdalorum amararum nuciscentra- e.	Blausäure.






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
mit den Erscheinungen eines stark aufgelösten Bluts. Die besten Gegenmittel bei Vergiftungen dieser Pflanze sind Milch, Kali und Seifenwasser.	Lustseuche entstanden sind. 5) Bei entzündlichen Krankheiten, als bei der Lungenentzündung. 6) Als beruhigendes schmerzlinderndes Mittel.			deln einen Bestandtheil ausmacht, ist das stärkste Gift, was wir besitzen; es tödtet blitzschnell und löst das Blut schnell auf. XII. Cl. I. Ord.
Marcorisch, Urin treibend, die Reizbarkeit und das Empfindungsvermögen schnell zerstörend.	1) Bei Wechselfiebern. 2) Gegen den Bandwurm. 3) Als Diureticum bei verminderter Thätigkeit der Nieren. 4) Bei der Epilepsie. 5) Bei der Wassersucht.	Emul. sio. Del.	3j — ▽ ℥j.	Ursprünglich im nördlichen Afrika, gegenwärtig im südlichen Europa. Vielen Thieren sind sie ein Gift; im menschlichen Organismus, erregen sie in Menge Genossen, Uebelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerz. XII. Cl. I. Ord.

Class- Acid-

Die Säuren sind Producte der ganzen Natur; das Pflanzenreich und noch seltener das Thierreich dar. von Kali aus. Beide verbunden erzeugen ein Mittelsalz; Sowohl die mineralischen, als vegetabilischen Säuren Wärme, vermindern die Thätigkeit des Blutsystems und antiseptisch. Außerdem wirken die mineralischen Säuren auf Blut; vermehren die Energie der irritablen Faser higen; wirken nicht nur styptisch, sondern zerstören auch Miasmata, und mindern die profusen Schweiß. Die mehr schwächend, weniger antiseptisch, nicht den Schweiß weniger den Magen an und sind daher oft vorzuziehen. als bei Nerven- und Faulfiebern, in allen Krankheiten züglich des Bluts gründen, in allen Profluvien aus asmatische Stoffe im Körper vorhanden sind.

1. Acida

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Acidum s.	Bitriol.		1) Acidum sulphuricum concentra-	1) Sauerstoff.
Oleum Vitrioli, s.	Schwefelsäure.		2) Acidum sulphuricum dilu-	2) Schwefelstoff.
Acidum sulphuricum.			3) Mixtura sulphurico-acida s. Elixir	





s i s IX.

d a.

Mineralreich bietet sie uns am concentrirtesten, weniger
 Der Hauptkarakter der Säure spricht sich im Gegensatze
 wodurch das Wesen jedes einzelnen aufgehoben wird.
 wirken kühlend, entziehen dem Organismus direkt die
 die erhöhte Reizbarkeit des Nervensystems, und wirken
 zusammenziehend, nicht nur auf die Faser, sondern auch
 und vermindern die Reizbarkeit der Nerven, ohne zu er-
 die im Organismus vorhandenen fremden Körper oder
 vegetabilischen Säuren wirken auf den Organismus weit
 mildernd, sondern ihn sogar befördernd, doch greifen sie
 Anwendung: bei Krankheiten mit und von Schwäche,
 die sich auf Auflösung und Zersetzung der Säfte, vor-
 Schwäche und in allen Krankheiten, wo fremdartige, mi-

mineralia.

Wir- fung.	Anwendung.	Form.	Dosiß.	Anmer- kungen.
Mäßig und an- haltend reizend.	Die concentrirte Schwefelsäure kann für sich als inneres Arzneimittel gar nicht gebraucht werden, höchstens äußerlich. Die verdünnte Schwefelsäure und das hallersche Sauer aber: 1) Bei fauligen, sie-berhaften Krankhei-ten. 2) Bei allen Blutun-gen aus Schwäche.	A.. s. d. M.s.a.	3ß — j — ▽ in 24 St. gtt xx — 3ß.	Die Schwefelsäure wird im Großen entweder durch trockne Destillation aus schwefelsaurem Eisen (soge- nannte Nordhäuser Schwefels.)

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			acidum Halleri.	
			4) Mixtura vulnera- ria acida s. Aqua— Thed.	
			5) Elixir. acidum Dippelii.	
			{ 6) Aether sulphuri- cus.	
			{ 7) Spiritus sulphuri- co - ae- thereus.	
Acidum muriati- cum s.	Salz- säure.			
Spiritus sa- lis acidus, s. Acidum salis com- munis.	Roß- salz- säure.			






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	3) Bei gallichten Krankheiten.	E.a.D.	—	oder durch Verbrennung des Schwefels,
	4) Bei profusen Schweißen.			mit etwas Salpeter
	5) Bei Aphthen und der brandigen Bräune.			vermischt,
	Neußerlich als blutstillendes Mittel, beim Scorbut, bei Schwämmen, Contusionen. —	A. s. d.	q. s.	in großen bleiernen Gehäusen (englische Schwefels.) gewonnen.
		M.v.a.	—	

Ist schwächer als die Schwefelsäure, doch greift sie den Magen mehr an und erregt leicht Husten. Die verdünnte Salzsäure ist ein gelinder	1) Beim fauligen Zustande des Darmkanals, Trommelsucht.	Mit schleimigen Mitteln		Als Gas dient die Salzsäure bloß zur Reinigung der Luft bei ansteckenden Krankheiten.
	2) Beim Scorbut, vorzüglich bei der Mundfäule.	Mitteln		Um die Luft in einem Saale
	3) Bei eingewurzelter Krätze und Flechten.	verdünnt	gtt viii — x.	von 40 Kranken zu reinigen, kann man auf 9 Unzen Salz nach und nach 4 Unzen concentrirte
	4) Specifisch gegen Fieber überhaupt. Neußerlich bei brandigen Hals- und Mundgeschwüren, gegen Grind und beim Beinfrass.			

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Acidum nitricum dilutum s. Spiritus nitri acidus.	Salpetersäure.		1) Unguentum oxygenatum.	1) Rauchende Salpetersäure. 2) Wasser. aa.
Acidum nitricum concentratum s. Spiritus nitri fumans.	Rauchende Salpetersäure.		1) Acidum nitricum dilutum.	1) 1 Theil Salpetersstoff (Stickstoff.) 2) 4 Theile Sauerstoff.
Acidum Phosphori,	Phosph-		1) Acidum phospho-	1) Gebrannte Knochen.

2. Acida






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
reizen- des Mit- tel.				Schwefel- säure gießen.
Unhal- tend ge- braucht, vermin- dert sie den Ap- petit, erregt Uebels- keit, Kopf- weh, schweren Athem, Husten und Speichel- fluß.	1) Bei der Lustseuche, da wo schon viel Quecksilber ge- braucht ist und wo die Haut und Kno- chen leiden. 2) Als Specifikum bei der Harnruhr. 3) Bei typhösen Fie- bern. 4) Bei Hautkrankhei- ten, Krätze. 5) Bei scorbutischen Geschwüren.	Mit schlei- mi- gen Mit- teln.	Binnen 24 St. 3j — jß	Man be- dient sich der salpeter- sauren und salpetrig- sauren Dämpfe, die man aus dem Salpeter durch all- mähliges Hinzugießen von concen- trirter Schwefel- säure ent- wickelt, ebenfalls zur Reini- gung der Luft.
Hefig reizend, kaustisch.	Als Aetzmittel bei Fleischauswüchsen, Beinfraß, Feigwar- zen u. f. w.			Sie wird aus dem gereinigten Salpeter durch con- centrirte Schwefel- säure aus- geschieden.
animalia.				
Sie ist milder,	1) Bei Nervenschwäche mit großer Reiz-			Die mit drei Theilen

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
s. Acidum phosphori- cum s. ossium.	phor- säure.		ricum ex ossibus. 2) Acidum phospho- ricum purum.	2) Wasser. 3) Conc. Schwefel- säure. 1) Salpe- tersäure. 2) Phos- phor.

3. Acida

Acidum tartari- cum.	Weins- stein- säure.		1) Pulvis refrige- rans.	1) Kohlen- stoff. 2) Wasser- stoff. 3) Sauer- stoff.
Acidum Tartari es- sentiale, s. Sal essen- tiale Tar- tari.	Wesent- liches Weins- steinsalz.		(Citronen- denpulver.)	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
und leichter zu vertragen als die mis- nerali- schen Säuren, verdient daher bei reizba- ren Subjek- ten den Vorzug.	barkeit des Gefäß- systems. 2) Bei Nervenfie- bern. 3) Bei Haemorrhagien nervöser Art. 4) Bei Krankheiten der Knochen.	—	Täglich 3j —	Wasser ver- dünnte. Phosphor- säure kann man zu 10 bis 60 Tropfen geben, und sie mit Chi- na, Zimmt- tinktur, Pomeran- zensyrup — verbinden.

vegetabilia.

Kühlend, die Thä- tigkeit des Blut- stems herab- stim- mend, die Funktio- nen des Darm- kanals beför- dernd, fremd- artige im Kör- per vor- handene	1) Bei allen fieber- haften Krankheiten mit erhöhter Reiz- barkeit des Gefäß- systems. 2) Beim galligten Faulfieber und chro- nischen Gallenkrank- heiten. 3) Bei activen Blut- congestionen, Hae- morrhagien und lo- calen Entzündun- gen. 4) Bei allen Indige- stionen.	Aust.	3i — ▽ 3vj.	Diese Säure wird vom Cremor Tartari durch reine Kreide ab- geschieden, und von dieser wie- der durch Schwefel- säure ge- trennt. Die erhaltene Flüssigkeit wird dann bis zur Ho- nigdicke abgedampft, und schießt in der Käl-
---	--	-------	----------------	--

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Acidum aceticum s.			1) Acidum aceticum dilutum s. Acetum vini destillatum.	
Alcohol Aceti.	Essig-		2) Acidum aceticum concentratum s. Acetum per frigus concentra-	
Acidum Aceti concentratissimum.	säure.		tum. 3) Acidum aceticum concentratissimum s. Acetum glaciale s. crystallisabile, s. Alcohol Aceti.	
			4) Acetum vini.	
			5) Oxymel simplex.	

Offcineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Acidum benzoi- cum, s.	Benzoe- säure.		1) Tinctu- ra Opii benzoica.	
Flores Benzoes.	Benzoe- blume.			
Acidum oxalicum s. Acidum Sacchari.	Klee- oder Zucker- säure.			





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	mittel der Luft, auf glühende Steine gegossen.			und nach dem Getränke, aus dem sie erhalten wird, Wein, Bieressig u. s. w. nennt.
Besonders kräftig reizend, die Secretionen der Haut, Lunge und des Uterus vermehrend.	1) Bei schleimigten Brustbeschwerden als ein gutes Expectorans.	Pulver.	gr. v — xx.	Die Benzoesäure kann man theils als Educt, theils als Produkt aus vielen vegetabilischen und animalischen Substanzen gewinnen. Wir finden sie im Benzoeharze, im Storax, in der Vanille u. s. w.
	2) Bei hysterischen Beschwerden.	Emulsio.		
	3) Bei unterdrückter Menstruation.			
	Sie ist in der Wirkung und Anwendung der Weinsäure gleich, doch da sie kostbarer als jene ist, wird sie selten benutzt.			Scheele entdeckte diese Säure zuerst, als er Zucker mit Salpetersäure behandelte. Hernach fand man

Officinerlicher Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Acidum succini- cum s.	Bern- stein- säure.			
Sal Succini volatile.				

Wirkung.	Anwendung.	Form	Dosis.	Anmerkungen.
				daß sie im Sauerflse (Oxalis Acetosella) vorhanden sey.
Kräftig reizend, die Ausdünstung der Haut und der Lunge befördernd, etwas erhitzend, krampfstillend.	1) Im Typhus, bei gesunkener Lebens- thätigkeit und Reizung zum Brande. 2) In chronischen Nervenkrankheiten, bei Krämpfen und Lähmungen verschiedener Art. 3) Da wo man die Hautthätigkeit erwecken will, bei Gicht, Hautausschlägen u. s. w.	Pul- ver. Aufl.	gr. j — — xx —	Sie wird durch Des- stillation aus dem Bernstein erhalten.

C l a s-

A l e a-

Die Alkalien sind Produkte der ganzen Natur und bilden das Mittelsalz. Ihr Grundstoff scheint dem Kohlen- und Wasserstoff sich befindet. Sämmtliche die Flüssigkeit der organischen Natur, sie zerlegen mehr sie kaustisch. Anhaltend gebraucht schwächen sie die Irrir- Drydation des Organismus, sondern sie carbonisiren zu- tirend aufs Nervensystem, vorzüglich wirken sie auf die die Thätigkeit des lymphatischen Systems, verstärken die ren und gehen in die Säfte des Organismus selbst über. fungen, in der Wassersucht, bei der Gicht, bei Steinen, der Brust, wie z. B. bei der Gelbsucht, bei Knoten in dungen, die sich zu Ausschwizungen hinneigen, bei hart- frampf, gegen Rhachitis, Vergiftungen, vorzüglich von Aeußerlich finden wir dieselben sehr wirksam gegen stark wuchernde Geschwüre, bei Krankheiten der Blase

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Ammoni- um s.	Ammo- nium.		Stehe unter Aetherea.	
Alcali vo- latile.	Flüchti- ges Laugen- salz.		9) Linimen- tum am- monia- tum, s. volatile. 10) Lini- mentum ammonia- tum cam- phora- tum.	





S i s X.
l i n a.

erscheinen als absoluter Gegensatz von Säure, beide ver-
der Stickstoff zu seyn, der in verschiedener Mischung mit
Alkalien vermindern die Cohæston der lebenden Faser und
oder weniger feste und flüssige Theile; ganz rein wirken
tabilität und Sensibilität, sie vermindern nicht bloß die
gleich. Auß Blutssystem wirken sie weniger, stärker exci-
Secretion der Nieren und des Darmkanals, vermehren
Absorption, zerstören die im Körper vorhandenen Säu-
Anwendung: Innerlich als Absorbentia, bei Verstop-
bei Verhärtungen einzelner Eingeweide des Unterleibs,
den Lungen. Außerdem wenden wir sie an, bei Entzün-
näckigen eingewurzelten Nervenerkrankheiten, Colik, Starr-
Metallen, gegen Contagien, selbst gegen die Lustseuche.
Verhärtungen, Milchknoten, Scropheln, Exantheme,
u. s. w.

Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	Den innern Gebrauch siehe unter Aetherea.			Man erhält das Ammonium bei der Zerlegung fast aller thierischen Körper durch das Feuer, auch bildet es sich aus ihnen durch die Fäulniß. Auch ist es in
	Aeußerlich benutzt man das Ammonium als Riechmittel, dann bei allen asthenischen Entzündungen innerer Organe; bei Schmerzen und Krämpfen asthenischer Art, bei			

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			11) Lini- mentum sa- ponato-cam- phoratum, s. Opodel- doc.	
Kali. s. Alkali vegetabile.	Kali. Ge- wächse- alkali		1) Liquor Kali car- bonici s. Oleum tartari per deli- quum. 2) Liquor Kali cau- sticus, s. Lixivium saponari- um. 3) Kali car- bonicum, s. Alkali vegetabile depura- tum. 4) Aqua nephritica, s. Aqua mephitica alcalina. 5) Tinctura kalina s. Tinctura antimo- nii acris, s. Tinc- tura salis tartari. 6) Kali cau-	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	kalten Geschwülsten, Paralyse u. dgl. den caustischen Liquor gegen Frostbeulen und Hornhautflecken.	m. Del.		gewissen Pflanzen, z. B. im Weizen, Taback, enthalten.
— In Verbindung mit Säuren entwickelt sich kohlensaures Gas, wodurch es Brechen tilgend wirkt. In mäßigen und seltenen Gaben	1) Als auflösendes Mittel bei Steinbeschwerden.	Liq. k. carb.	gtt xv — 3ß.	Struß hat in neueren Zeiten entdeckt, daß der abwechselnde Gebrauch des Liquor Kali carbonici und des Opiums ein ganz vorzüglich wirksames Mittel bei krampfhaften Beschwerden
	2) Bei Nervenkrankheiten chronischer Art.			
	3) Bei chronischen Hautausschlägen.	Kali carb.	gr. v — x.	
	4) Bei Sicht und Rheumatismus.	Liq. K. caust.	— gtt x —	
	Außerlich bei Nervenkrankheiten in Bädern, bei Schleimabsonderungen in Einspritzungen, bei Drüsenkrankheiten in Umschlägen, bei Milchverhärtungen in den Brüsten. —	Tinct. Kalin.	gtt xx — xl.	


Officinneller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			sticum, siccum, s. Alkali causticum.	
Natrum s. Alkali minerale. (Soda depurata.)	Natron. Soda- salz.		1) Natrum carbonicum crystallisatum. 2) Natrum carbonicum siccum. 3) Natrum causticum. 4) Pulvis aërophorus.	
Sapo.	Seife.	Arten. Sapo domesticus. „ medicatus. „ Venetus. „ Hispanicus. „ guajacinus. „ jalappinus. „ stibiatus.	1) Spiritus saponatus. 2) Emplastrum saponatum. 3) Sapo medicatus exsiccatus.	



Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
vermehrt, und in häufigen Gaben vermindert es die Erregung.				
	Das kohlensaure Natron giebt man als Brechen tilgendes Mittel, mit irgend einem sauren Salze, oder läßt gleich darauf eine saure Flüssigkeit nachtrinken.	—	gr. v — x — xv.	Das Natron wird durchs Verbrennen der an den Seeküsten wachsenden Pflanzen erhalten. In Ostindien und Persien wittert es aus dem Erdboden aus.
Auflösend, einhüllend, beruhigend, zertheilend.	1) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten. 2) Bei Verhärtungen, Verstopfungen der Eingeweide, als bei Wassersucht, Atrophie. — 3) Bei langwierigen Säuren in den ersten Wegen.	Pill. Klyst.	3j — ij 3ij —	Eine gute Seife löst sich in destillirtem Wasser vollständig auf, ferner in Weingeist, fetten und aetherischen Oelen. Zerlegt wird sie

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
		Sapo terebinthinatus.		
Spongia marina usta s. Carbo Spongiae.	Berkohler Meeresschwamm, oder Waschschwamm.	Spongia officinalis.	1) Spongiae ceratae. 2) Pulvis contra strumas. R. Spong. mar. ust. 3jx Rad. Pyrethri Amm. muriat. aa 3jj. Cort. Cinnam. 3ß. Sacchari albi 3ß. M.	1) Salzsäure Zalkerde 2) Natron 3) Thierische Stanz.






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	4) Bei der Sicht. 5) Bei Steinbeschwer- den.	Bäder.	℥ij - ℥ijj	durch alle Säuren, Ammonia- kalsalze, erdigte Al- kalisalze, Metallsalze und Kalt- wasser.
Flüchtig relzend.	1) Soll specifisch gegen den Kropf und ge- gen die Anschwel- lung der schilddör- migen Drüse seyn. 2) Gegen die Wasser- sucht. Den Preß- schwamm benutzt man zur Erwelte- rung enger Fi- steln.	Pul- ver. Aufl.	℥ß — ℥ß täglich. ℥i — ▽ ℥j.	Im mittel- ländischen Meere.

C I a s s - T e r -

Die Erden sind Produkte der ganzen Natur, vor-
natürlicher Substanzen, die in ihrem chemisch reinen Zu-
ständig, und nicht metallisch reducierbar sind. Der Stick-
oder weniger Kohlenstoff verbunden erscheint. In ihrem
doch durch die Verbindung mit Säuren wieder verlohren
fördern die Secretion des Urins und der Schleimmem-
alle Säuren. Anwendung: 1) als Antispasmodika,
Mittel.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Magnesia, s. Terra amara, Terra mu- riatica.	Salzer- de, Bitter- erde.		1) Magne- sia car- bonica, s. Mag- nesia Sa- lis ama- ri, s. Magne- sia muri- atica. 2) Magne- sia usta s. calci- nata. { 3) Magne- sia sul- phurica s. Sal amarum. Siehe bei den Sal- zen. }	






S i s

XI.

r e a.

zöglich aber des Mineralreichs, sie sind eine elgne Art
 stände farbentlos, geruchlos, unentzündbar, höchst feuerhe-
 stoff scheint ihr Hauptbestandtheil zu seyn, der mit mehr
 reinsten Zustände sind sie kaustisch, welche Wirkung je-
 geht. Sie vermindern die Reizbarkeit und beruhigen, be-
 branen, wirken auflösend auf die Drüsen und absorbiren
 2) als Absorbentia und 3) als auflösendes, zertheilendes

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Einsau- gend, gelinde laxi- rend.	1) In allen Krank- heiten der Kinder die sich auf Säure und Verstopfung des Unterleibs gründen. 2) Bei chronischem Erbrechen, Magen- krämpfen. 3) Bei Säure die sich in der Milch der Ammen findet. 4) Gegen metallische Vergiftungen.	Pul- ver.	℥ß — j. Rinder- gr. ij — x — xv.	Die Talk- erde findet sich häufig in der Na- tur, aber nie rein, sondern immer mit Kohlen- säure ver- bunden. Unter allen absorbiren- den Mitteln verdient die Magnesia den Vor- zug, weil sie gewöhn- lich mit der Magensäure ein gelindes abführendes Neutralsalz bildet.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Mäßig reizend, zusammenziehend.	Siehe das Nähere unter Alaun (Alumen), Classis V.			Der gemeine eisenfreie Thon (Argilla) ist ein Produkt der natürlichen Mischung von Kiesel-erde und einer ganz eigenthümlichen Erdart, welche Thonerde (Terra argillacea) oder auch Alaunerde (Terra aluminosa) genannt wird.
Vorzüglich auf das Lymphsystem und die Schleimabsonderungen des Darmkanals; daher auch Haut-, Stuhl-	1) Vorzüglich bei Drüsenkrankheiten, gegen Scropheln und deren verschiedene Formen. 2) Bei Verhärtungen und Anschwellungen der Brüste, Hoden, der Ohr- u. a. Drüsen.	Aust.	p. dos. gr. $\frac{1}{16}$ - - $\frac{1}{8}$ - - $\frac{1}{4}$ -	Die Baryterde ist eine eigenthümliche Erdart, die mit Kohlensäure verbunden im Witherit (einer vorzüglich zu Anglezart vorkommenden Steinart) und mit Schwe-

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Calcaria, s. Terra cal- cis, s. Calx.	Kalk- erde. Kalk.		1) Calcaria cruda, s. Calcaria carbonica. 2) Calcaria usta, s. Calx usta. 3) Aqua Calcaria usta s. Aqua Calcis. 4) Calcaria muriati- ca, s. Sal	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
und Urin ausleerend. Ein zu langer und starker Gebrauch bewirkt Uebelkeit, Kopfweh, Erbrechen, Beängstigung, Durchfall, Magen- schwäche, Schwindel u. s. w.	3) Hufeland empfiehlt es bei Anhäufungen von zähem Schleim im Darmkanale; bei Schleim- und Wechselfiebern. 4) Bei Menstrualun- ordnungen.			felsäure verbunden, im Schwerspat (Spatum ponderosum) gefunden wird.

Beruhigend, krampfstillend. Die kohlensaure Kalkerde wirkt milder als	Die animalische Kalkerde wendet man an: 1) Bei Erbrechen, wenn dasselbe von Säuren oder auch von Krampf her- rührt. 2) Bei allen andern Krankheiten die sich auf vorhandene Säure des Magens gründen. 3) Bei Durchfällen. 4) Bei Drüsenverhärtungen.	Pulver.	3ß — j.	Kalkerde (Terra Calcis, s. Calcarea) nennt man eine eigenthümliche Erd- art, die in den Pro- dukten al- ler Natur- reiche vor- kommt. Sie ist aber nie rein, sondern
---	--	---------	------------	--

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			ammoniacum fixum.	
			5) Calcaria sulphurata, s. Hepar sulphuris calcareum.	
			6) Calcaria sulphurato-stibiat, s. Calx Antimonii cum Sulphure.	
			7) Calcaria acetica.	
			8) Aqua concharum ustorum.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
die reize, und ihre Wirksamkeit bleibt mehr auf den Darmkanal beschränkt, wo sie die Säure tilgt.	5) Bei Wassersuchten 6) Beim weißen Fluß 7) Als Reinigungsmittel bei verdorbenen, unreinen Zähnen. Die mineralische Kalkerde (Kreide) wendet man an: 1) In allen Krankheiten mit Säure in den ersten Wegen. 2) Gegen hartnäckige Verschleimungen und Verstopfungen der Eingeweide. 3) Bei Krankheiten der Urinwerkzeuge, Steinen. 4) Bei eingewurzelter Gicht. 5) Bei der Windkolik. 6) Gegen Verhärtungen des lymphatischen Systems. 7) Bei langwierigen innern und äußern Geschwüren. Außerlich als Heilmittel bei Muttermälern, das Kaltwasser bei Geschwüren und Excoriationen der Harnröhre und Blase u. s. w.	Pulver.	℥ss — j.	immer mit Kohlenstoffsäure verbunden, daher auch Calcaria carbonica, s. cruda genannt. Zu den officinellen Produkten, welche eine solche rohe Kalkerde ausmachen, gehören: 1) Die Kreide. (Creta). 2) Die Austerfchalen. (Testae ostrearum). 3) Die Krebssteine. (Lapides cancerorum). 4) Die weißen Corallen. (Corallium album). 5) Die rothen Corallen. (Corallium rubrum).

C l a s s S a l i a n e u

Die Neutral- oder Mittelsalze sind Produkte der auf den Darmkanal, die Secretion befördernd, zuerst so ableitend bei Krankheiten des Kopfs u. s. w.; außerdem ren die Lebenskraft und stimmen die Irritabilität des Ge- allen sthenischen Fiebern, bei activen Localaffectionen, als Unreinigkeiten im Darmkanal, bei der Wassersucht, wenn sonderungen und in allen Krankheiten wo eine erhöhte Grunde liegt.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Kali citra- tum, s.	Mit Zi- tronen-			
Sal absyn- thii, citra- tum.	safft ge- sättigtes Kali.			
Calcaria citrata, s.	Mit Zi- tronen-		1) Conchae	1) Kalk-
citrica.	safft ge- sättigte Kalk- erde.		citratae.	erde.
			2) Lapides	2) Zitronen-
			cancro- rum ci- trati.	säure.






s i s XII.
t r a, s. m e d i a.

Säuren, Erden und Alkalien. Ihre Wirkung ist zunächst cal und dann consensuell auch auf andre Organe, daher befördern sie auch andere Ge- und Excretionen, deprimi- fäßsystems herab, wirken kühlend. Anwendung: bei Congestionen, Entzündungen; bei Anhäufungen und der Charakter sthenisch ist, bei fehlerhaften Schleimab- Energie des Herzens und des arteriellen Systems zum

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerk- ungen.
	1) Als das beste An- tiemetikum.			Hierher ge- hört auch die Riveri- sche Mix- tur, welche als Magi- stralformel verordnet und auf der Stelle berei- tet wird, indem man den frisch gepreßten Zitronen- saft mit Kali, oder Natrium, oder mildem Ammonium- neutralisirt, und in li- quider Form gebrauchen läßt.
	2) Bei Krämpfen, Congestionen und anfangender Ma- genentzündung.	Pul- ver.	ʒi —	
	3) Bei gelinden Fie- bern mit erhöhter Reizbarkeit der Nerven.	Aufl.	—	
—	Ältere und selbst noch einige neuere Ärzte rühmten ihre kühlende Eigenschaf- ten.	—	—	

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Natrum phosphoricum, s. Soda phosphorata.	Phosphorsau- res Na- tron.			1) Natron 2) Phosphorsäure 3) Wasser.
Kali aceticum, s. Terra foliata Tartari, Tartarus aceticus.	Essigsaures Kali.		1) Liquor Kali acetici s. Liquor Terrae foliatae Tartari. 2) Liquor Kali acetici spirituosus, s. Tinctura antimonii Thedenii.	1) Essigsäure. 2) Vegetabilisches Laugen- salz. (gesättigt).
Natrum aceticum, s. Terra foliata Tartari crystallisata.	Essigsaures Natron.			1) Essigsäure. 2) Mineralisches Laugen- salz. (gesättigt).





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	Man gebraucht es als ein gelindes Laxirmittel bei reizbaren, zärtlichen Subjekten. Es kann auch mit Nutzen bei Aphthen, gegen Milchschorf u. s. w. gegeben werden.	Aufl.	3ij — 3ß.	Man sättigt verdünnte Phosphorsäure mit kohlensaurem Natron, so daß Letzteres etwas vorschlägt, filtrirt die Flüssigkeit, dampft sie ab und läßt sie krystallisiren.
In kleinen Gaben etwas reizend, auflösend und Harn treibend; in größern laxirend.	In allen Krankheiten die sich auf Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibs gründen; als bei der Gelbsucht und Wassersucht, bei der Melancholie, Hysterie und Hypochondrie, bei Wechselfiebern u. s. w.	Aufl.	p. d. gr. x.	Es kann dies Salz in seinen Wirkungen dem weinstein-sauren Kali zur Seite gesetzt werden; nur wirkt es noch milder.
In seiner Wirkung ist es dem essigsauren Kali vollkommen ähnlich; nur noch				

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Ammoni- um aceti- cum.	Essig- saures Ammo- nium.		1) Lignor Ammonii acetici. 2) Spiritus Mindereri.	1) Essig- säure. 2) Flüchti- ges Lau- gensalz.
Kali nitri- cum pu- rum, s. Nitrum depura- tum.	Reines salpeter- saures Kali. Salpe- ter.		1) Acidum nitricum concen- tratum. 2) Acidum nitricum dilutum. 3) Spiritus nitrico- aethere- us. 1) Gewäch- salkali. 2) Salpe- tersäure. Siehe un- ter Säuren und Aethes- rea.	






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosß.	Anmer- kungen.
milder und an- geneh- mer.				
Gelinde reizend, vorzüg- lich auf die Hautge- fäße, Schweiß beför- dernd, Krampf- stillend, Urin treibend.	1) Bei gelinden rhe- matischen Fiebern, vor- züglich da wo die Funktion der Haut gestört ist, als bei Rheumatismus, acuten Exanthemen. 2) Bei chronischen Brust- und Unter- leibsbeschwerden, bei Gelbsucht, Asthma. 3) Bei chronischen Ausschlägen, als Krätze, Flechten. 4) Bei gastrischen Leiden. Außerlich bei kalten Geschwülsten, verhärteten Drüsen.—	Aufl.	3j — 3i.	Das Essig- saure Am- monium gehört zu unsern un- entbehrlich- sten Reiz- mitteln.
Sehr schwä- chend, den Ma- gen und Darm- kanal angrei- fend, er- schlaf- fend, kühlend, stark diure- tisch,	1) In allen Entzün- dungsfebern, nächst dem Aderlaß. 2) Bei allen activen Congestionen. 3) In der Wassers- sucht. 4) Beim acuten Rheu- matismus. 5) Bei Krankheiten der Urinwege. Außerlich bei Entzündungen.	Aufl. Pulv.	3j — iii p. d. 3ß — j.	Der Salpe- ter wird besonders in heißen Gegenden in großer Menge auf der Ober- fläche der Erde er- zeugt; bei uns aber durch Kunst bereitet und gereinigt.

Officinneller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Tartarus depuratus, s. Cremor Tartari, s. Crystalli Tartari.	Geret- nigter Wein- stein.		1) Acidum Tartari- cum, s. Sal essen- tiale Tar- tari, 2) Liquor pyro-tar- taricus, s. Spiritus Tartari. 3) Oleum Tartari empyreu- maticum, s. foeti- dum.	Es ist ein natürliches saures Salz, welches aus mit Wein- steinsäure übersättig- tem vegeta- bilischen Laugensalze besteht.
Kali tarta- ricum, s. Tartarus tartarisa- tus, s. Tar- tarus solu- bilis.	Wein- steinsäu- res Kali.			Es besteht aus der mit vegetabili- schem Lau- gensalze vollkommen gesättigten Weinstein- säure.



Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Tartarus natronatus, s. Sal Seignette.	Natronisirter Weinstein.			Besteht aus dem mit Weinstein- säure gesättigtem mi- neralischen Laugensalze.
Tartarus ammoniacatus, s. Tart. solubilis am- moniaca- lis.	Ammonium- haltiger Weinstein.			Weinstein- säure. Kali. Ammonium.
Tartarus boraxatus, s. Cremor Tartari solubilis.	Borax- weinstein.			1 Theil Bo- rax. 10 Theile Wasser. 1 ½ Theil Weinstein.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	und catarrhalisch entzündlichen Fiebern.			vorwaltet, filtrirt die Flüssigkeit und raucht sie bis zur Trockenheit ab.
Ganz dem Vorigen gleich, nur schwächer wirkend.	— — —	—	—	Es ist eins der wohl- schmeckend- sten, aber auch theu- ersten Salze.
Steht zwischen dem gereinigten Weinstein und dem Salmiak; wirkt mehr auf die Haut, aber weniger laxirend.	— — —	—	—	Man berei- tet es, in- dem man gereinigten Weinstein in kochendem Wasser auf- löst und mit reinem Ammoni- um sättigt.
—	— — —	Aufl.	3j — ij	Man ge- winnt es, daß eine Auflösung von gerei- nigtem Weinstein und Borax

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Kali sul- phuricum, s. Tarta- rus vitrio- latus, s. Arcanum duplica- tum.	Schwe- felsäu- reß Kali.			1) Kali. 2) Schwe- felsäure.
Natrum sulphuri- cum, s. Sal mirabi- le Glau- beri, Soda vitriolata.	Schwe- felsäu- reß Na- tron. Glanz- bersalz.			1) Natron. 2) Schwe- felsäure.



Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Magnesia sulphuri- ca, s. Sal amarum, s. Sal angli- canum.	Bitters oder Engs lischsalz.			1) Talkerde. 2) Schwefelsäure.
Borax. Borax cru- da et raf- finata.	Borax.		1) Borax calcinata.	


Magnesiæ Sulphas (Sulphate of Magnesia)



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
				Salmiak gewonnen.
— — Ist das stärkste Pur- gangs.	1) Berühmt bei Fleus und incarcerirten Brüchen. 2) Bei Bleikolik und 3) da, wo es um ei- nen schnellen Effekt zu thun ist.	Emul- sio. Aust.	3vj — 3j p. d. 3j — 5j	Grew schied dieses Salz zuerst aus dem Wasser zu Ebbsham; Hoyle lehrte es aus Meers- wasser be- reiten. Später in mehreren Salzquels- ten.
Weniger auf den Darm- kanal; specifisch auf das Uterin- system.	1) Gegen Verstopfun- gen der Eingeweide des Unterleibes. 2) Bei Halsentzündun- gen; specifisch ge- gen die Bräune. 3) Zur Beförderung der Menstruation. Aeußerlich bei Exul- cerationen des Mun- des, Aphthen, gegen Flecke der Hornhaut, gegen Krätze, gegen schmerzhaftes Hae- morrhoidalknoten, ge- gen Sommersprossen und gegen Unreinig- keiten der Haut.	Pulv. Aust.	3ß — 3ß. 3ß — 1 ▽ 3j.	Dies Salz, welches in Indien, Sibet und Persien theils gegraben, theils aus dem Wasser einiger Ge- sen — ge- wonnen wird, kommt als roher Bo- ray oder Zinkal nach Europa, wo es jetzt in England von den Unreinigkei- ten durch


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Natrium muriati- cum, s. Sal culina- re, com- mune.	Salz- saures Natron. Koch- salz.		1) Acidum muriati- cum.	1) Natron. 2) Salzsäu- re.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
				Lösen in heißem Wasser, Durchseihen und Krystallisiren gereinigt wird.
Auf alle Secretionsorgane reizend, auflösend, gelinde abführend, Durst erregend. In starker Gabe bewirkt es Hitze im Magen und Durst, anhaltend gebraucht verursacht es einen scorbutischen Zustand.	1) Bei großer Magenschwäche. 2) Gegen Verschleimungen und Würmer. 3) Beim kalten Fieber. 4) Beim Blutspucken. 5) Bei Verhärtungen der Drüsen, Scropheln. 6) Bei Verstopfungen der Eingeweide. Neußerlich als Klystier; bei chronischen Exanthemen in Bädern und als Waschung bei Eicht, Geschwülsten u. s. w.	Puls. — Auß.	3j. 3ß.	Man findet es theils in trockenem Zustande als Steinsalz, und wenn es unrein ist, als Salzslein, theils im Meerwasser und in Quellen gelöst.


Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Ammoni- um muria- ticum de- puratum, s. Sal am- moniacum depura- tum.	Reines salzsaure res Am- monia- um. Salmi- ak.			1) Ammo- nium. 2) Salz- säure. 3) Krystall- sations- wasser.
Baryta muriatica, s. Terra ponderosa salita.	Salz- saure Schwer- erde.			1) Schwer- erde. 2) Salz- säure. 3) Krystall- sations- wasser.





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
schwächend, fleischig, aufblühend, groß, purgirend; äußerlich reizend.	1) Bei allen gastrischen Uebeln. 2) Bei syphilitischen Krankheiten und Entzündungsfiebern; nur nicht bei Entzündung des Darmkanals. 3) Gegen Wechselfieber. 4) Bei Wassersuchten. 5) Bei Verstopfungen der Unterleibs Eingeweide. Außerlich als auflösendes, zertheilendes Mittel, bei Quetschungen, Krätze, Drüsenverhärtungen.	Aufl.	3j — ii p. d. gr. v — x.	Der Salzmiaf wird in Fabriken aus thierischen Stoffen gewonnen.
Reizend, auflösend. In größern Gaben Uebelkeit, Magenskrämpfe, Colik, Schwindel und Erbrechen verursacht. Vorzüglich auf Lymph- und	1) Bei Krankheiten des Drüsen- und Lymphsystems, Scropheln, Scirrhen, Hodenverhärtungen. 2) Bei Wassersuchten. 3) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten, Krätze —. 4) Gegen Würmer. Außerlich bei Verhärtungen, Haut- und Augenkrankheiten.	Puls	gr. ii — v. Aufl. 3ß — ▽ 3j gtt. xxx	Sollte ein Kranker eine zu große Gabe genommen haben und dadurch Uebelkeiten entstanden seyn, so läßt man Milch und schleimige Getränke trinken und Glaubersalz nehmen.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Calcaria muriatica.	Salz- saure Kalk- erde.			1) Kohlensäure- Kalkerde. 2) Salzsäure.




Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Drüsen-System.				
	Bei Scrophulösen Krankheiten und Verschleimungen.	Aust.	gr. x.	Siehe unter Erden.

Die Metalle machen eine ganz eigne Art natürlicher
 kommen, obschon einige derselben auch in thierischen Kör-
 Manganee gefunden werden. Die chemische Beschaffen-
 ein in sich geschlossenes Ganze, kann wohl verändert
 Die officinellen metallischen Arzneimittel lassen sich billig
 regulina), welche das Metall im regulinischen Zustande
 welchen das Metall mit Sauerstoff verbunden oder oxy-
 data sulphurata) und 4) in mittelsalzige (Med. metall.
 Heilmittel gar nicht anzuwenden, daher man sie durch
 Jedes Metall scheint einen eigenthümlichen chemisch-anis
 gründet sich die Annahme, daß Metalle lange gebraucht,
 alle (Eisen ausgenommen) reizend, auf den Organismus
 Erbrechen, Colik, Diarrhoe, und in starken Gaben Ver-
 Eigenthümlichkeiten, so wirkt z. B. das Eisen belebend,
 fördernd; das Quecksilber desoxydirend und die Lebens-
 narcotisch; das Antimonium flüchtig auf die Secretions-
 Gegengifte sind nächst den öligen und schleimigen

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Carbo.	Kohle.		1. Carbo lignorum praepa- ratus. { 2) Carbo spongiae marinae. 3) Carbo testarum ovorum. 4) Carbo os- sis sepieae. }	Wenig be- nußt.





s i s XIII.

t a l l a.

Substanzen aus, welche vorzüglich im Mineralreiche vorkommen, z. B. Eisen, andere in Pflanzenkörpern, z. B. des Weizens derselben ist uns noch sehr dunkel, jedes Metall ist zu werden, behält aber dennoch seine wesentliche Wirkung. unterscheiden 1) in regulinische (Medicamenta metallica) enthalten; 2) in oxydirte (Med. metall. oxydata), in die ist; 3) in geschwefelt-oxydirte (Med. metall. oxy-neutralisata). In ihrer gewöhnlichen Form sind sie als Beimischungen (durch die Oxydation) assimilirbar macht. malischen Prozeß im Körper zu veranlassen; hierauf. Chronische Vergiftungen verursachen können. Sie wirken zerstörend, affiziren den Magen und Darmkanal, erregen giftung. Außerdem hat jedes Metall seine besondern den Tonus der Faser vermehrend und die Oxydation be- kraft schwächend; das Blei zusammenziehend, lähmend, organe, vorzüglich auf die Haut. Mitteln, Kali und Schwefel.

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Die Kohle zieht den Sauer- stoff in sich, wirkt desoxy- dirend, reizend, antisep- tisch.	1) Bei putriden Fie- bern mit gastrischer Complication, wenn gleichzeitig Meeo- rismus vorhanden ist. 2) Bei der Ruhr von fauligen Unreinig- keiten. 3) Bei krampfhaften Zufällen. 4) Bei Hämorrhagien.	Pul- ver. Latw.	℞ — j. ℥i. — Syr. ℥iii.	Die reine Kohle berei- tet man ge- wöhnlich aus Linden- holz (Lig- num tiliae) und gewinnt dabei, bei der Destilla- tion, ein saures Flui-

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Sulphur.	Schwe- fel		1) Sulphur depura- tum s. Flores sulphuris. 2) Kali sul- phura- tum s. Hepar Sulphuris salinum. 3) Calcaria sulphu- rata, s. Hepar Sulphuris calca- reum. 4) Liquor vini pro- batorius, s. Aqua sulphura- to-acidu- la. 5) Sulphur praecipi- tatum, s. Lac Sul- phuris.	Noch unbe- kannt.





Wir- fung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Numer- fungen.
	5) Beim übeln Geruch aus dem Munde, bei bössartigen Ge- schwüren, z. B. der Lunge. Aeußerlich bei der Kräße, bei fauligen Geschwüren, als Zahn- pulver u. s. w.	Sal- be. Pul- ver.		dum (Aci- dum pyro- oleosum) und ein em- pyreumati- sches Del.
Sehr flüchtig, schnell durch- drin- gend, reizend. Er theilt dem Schweiß, und dem Urin einen schwef- lichten Geruch mit, be-	Innerlich: 1) Als eröffnendes Mittel bei Obstruc- tionen des Unter- leibs. 2) Als Specifikum bei Hämorrhoiden. 3) Bei chronischen Hautausschlägen, Kräße. 4) Bei Gicht, Rheu- matismus. 5) Bei chronischen Metallvergiftungen. 6) Gegen chronische Brustbeschwerden.	Pul- ver. Sulph. dep. Kali sulph. Calc. sulph. Sulph. prae- cip. Amm. sulph. aufgel.	℥i—3℥ gr. iij — vj gr. jv — vj gr. viij — xj gr. vj — x	Der Schwes- fel, welchen man größ- tentheils auf einigen Hütten durch Sub- limation aus Schwes- felfiesen er- hält, kommt im Handel theils in Stangen zusammen- geschmolzen, theils noch in Pulver- form vor. Auch finden wir ihn rein kristalli- nisch, ge- meinlich in Gängen in Gips und in falkerdi- gen Steinen eingesetzt: in Italien,

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Be- th
			6) Ammonium sulphuratum, s. Ammonium hydroge- nato-sulphuratum. 7) Oleum Lini sulphuratum, s. Balsamum sulphuris simpl. 8) Oleum Sulphuris terebinthinatum s. Bals. sulph. terebinthinatum. 9) Oleum Anisi sulphuratum. 10) Oleum Juniperi sulphuratum. 11) Unguentum sulphuratum compositum. 12) Unguentum sulphuratum simplex.	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
fördert die Diaphoresis, die Diuresis, und die Excretionen	Außerlich bei chronischen Krankheiten der Haut, bei der Gicht, beim Rheumatismus, bei Geschwüren, Contracturen, Lähmungen, Stockungen und Verhärtungen der Unterleibseingeweide.	Bad. Salbe. Oele.	℥j—iij	Spanien und in den Gegenden der Vulkanne, gediegener oder Jungfernschwefel (Sulphur nativum s. virgineum) genannt. Der Schwefel besitzt eine ganz eigenthümliche gelbe Farbe, ist spröde, etwas fettig, von einem eigenthümlichen Geruch, wenn er erwärmt oder gerieben wird. Er ist geschmacklos, geruchlos und in reinem Wasser, so wie im Weingeist unauflösbar. Er verbindet sich aber gern mit den alkalischen
der Brust und des	Bei Frostbeulen und schwammigen Geschwären.	Ol. lin. sulph.		
Darmkanals.	Bei chronischen Brustbeschwerden.	Ol. anis. sulph.		
	Bei Wassersuchten und Harnbeschwerden.	Ol. jun. sulph.		

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			13) Acidum sulphuricum concent. 14) Acidum sulphuricum dilutum. 15) Mixtura sulphurica acida. 16) Mixtura vulneraria acida. 17) Aether sulphureus. 18) Spiritus sulphurico-aethereus.	Siehe unter Säuren und Aetherea.
Ferrum s. Mars.	Eisen.		1) Ferrum pulveratum s. Limatura Martis praeparata. 2) Ferrum oxydatum fuscum, s. Crocus martis aperitivus. 3) Ferrum oxydula-	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
				Salzen, mit Erden, mit Metallen und mit fetten und aetherischen Oelen.
Die Erfahrung lehrt, daß das Eisen den Cruor, die Röthe und die Wärme des Bluts erhöht, und daß die	1) In allen Krankheiten die sich auf Schwäche, Exsiccation, Cachexie und Cachymie gründen. 2) In Krankheiten die sich auf Schwäche der Verdauungswerkzeuge gründen, als chronische Diarrhoeen, Magenkrampf. 3) Bei Nervenkrankheiten von Schwäche entstanden, als Epilepsie, Blödsinn.	Pulv. Wein. Li- mat. F. oxy- du- lat. n. A. mu- mar. Fer- rum tart.	gr. v — xx — gr. v. — x — xv. — xx.	Das Eisen ist unter den Metallen am weitesten über den Erdboden verbreitet, und hat unter allen, welche in der Heilkunst angewendet werden, die größte Cohäsion.


Officineller Name.	Tribtal.	Systematis- cher Name.	Präparate.	Bestands- theile.
			tum ni- grum, s. Aethiops martialis.	
			4) Ferrum sulphuri- cum cri- stallisa- tum, s. Vitriolum Martis.	
			5) Ammo- nium mu- riaticum martia- tum s. Flores sa- lis am- moniaci martiati.	
			6) Ferrum Tartari- satum s. Tartarus chalybea- tus.	
			7) Ferrum muriati- cum.	
			8) Globuli martiales s. Globu- li Tarta- ri martia- ti.	
			9) Extrac- tum ferri pomatum.	
			10) Tinctu-	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.	
Grundmischung und Stärke der Organisation dauerhaft verbessert. Außer dem steigert und vermehrt es die Reproduktionskraft, wirkt stärkend, belebend auf den Darmkanal. Die Auflösung und gute Verarbeitung desselben sind Bedingungen; was wir durch folgende	4) Bei allen passiven Profluvien.	Tinct. f. pom.	gtt. xx — xl	Für immer steht also das Eisen in der innigsten Beziehung zum Muskelsystem: es wirkt theils als Nahrungsmittel auf dasselbe vermöge seiner kohlenstoffigen Natur, theils bewirkt es eine lebhaftere Erregung desselben dadurch, daß es die Absetzung des Sauerstoffes an den Organismus vermehrt.	
	5) Bei Unterdrückung gewohnter und nothwendiger Absonderungen des Blutes.	Ferrum sulph.	gr.j - jj —		
	6) Bei Verstopfungen einzelner Eingeweide durch Schwäche verursacht.	Ferrum muriat.	3j — ▽ 3j gtt xxx.		
	7) Gegen Würmer.	Spirit. mart.	gtt. x — xx.		
	8) Zur Hebung der Unmannbarkeit.	Globuli zum Bad.	3j — jjj		
	Contraindicationia:				
	1) Plethora.				
	2) Entzündliche Diathesis.				
	3) Fieberhafter Zustand.				
	4) Unreinigkeiten der ersten Wege.				
	5) Idiosynkrasie.				
	6) Neigung zu Blutungen.				
	7) Hartnäckige Verstopfungen einzelner Organe.				
	8) Straffe und trockne Faser.				

Officinneller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			ra ferri pomati. 11) Tinctura ferri acetici aetherea. 12) Tinctura ferri muriatici. 13) Spiritus sulphurico-aethereus martiatus, s. Liquor anodynus martialis. 14) Vinum Martis, s. martiatum.	
Hydrargyrum, s. Mercurius.	Quecksilber.		Sie lassen sich abtheilen: 1) in regulinische (Praeparata hydrargyri regulina) 2) in oxydirte (Praep. hydr. oxydata) 3) in geschwefelte.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Zeichen erkennen: 1) Die Faeces sind ganz schwarz. 2) Das Aufstoßen und die Winde haben einen fauligen widerlichen Geruch.				
1) Specifikt auf das Lymph- und Drüsen-system, reizend, die Absorption befördernd. 2) Specifikt auf die Spei-	1). Specifikt gegen die Lustseuche. 2) Bei allen Krankheiten des Lymph- und Drüsen-systems. 3) Bei hartnäckigen Verstopfungen der einzelnen Eingeweide. 4) Gegen Wurmkrankheiten. 5) Bei hartnäckigen Verschleimungen.			Das Querc-silber vereinigt in sich die größte Schwere mit der höchsten Flüchtigkeit und dem geringsten Grade der Cohäsion; und nimmt


Officinneller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			(Praep. hydr. sulphurata), und 4) in Mittelsalzige (Praep. hydr. salina). I. Das reine Metall. a) Hydrargyrum purum s. Mercurius vivus. II. Die einfachen Dryde. a) Hydrargyrum oxydulum nigrum, s. Mercurius solubilis Hahnemann. b) Hydrargyrum alcalisatum, s. Mercurius alcal. c) Hydrargyrum gummosum, s.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Cheloro- gane. 5) Aufß Haut- system. 4) Rei- zend aufß Nerven- und Ge- fäßsy- stem. 5) Aufß- leerend auf den Darm- kanal, die Ge- und Ex- cretio- nen be- för- dernd. 6) Die Cohae- sion ver- min- dernd. 7) Die Produc- tivität schwä- chend. 8) Ge- gen Un- geziefer als star- kes Gift. 9) Lange	6) Gegen die Läuse- sucht. 7) Bei chronischen Hautkrankheiten und hartnäckigen Geschwüren. 8) Bei hartnäckigem Rheumatismus. 9) Bei Wechselfiebern. 10) Bei localen Ent- zündungen. 11) Bei Wasseran- häufungen, Wasser- suchten. 12) Gegen alle Con- tagien und Mias- men. 13) Beim Starr- krampf. Aeußerlich bei der Luftseuche um die in- nere Wirkung zu ver- stärken, um Saliva- tion zu erregen; bei Verhärtungen, Rheu- matismus, Wasser- sucht, Entzündungen, Starrkrampf, Tollens- hundslbiß und gegen	Ungt. hydr. ciner.	7ß — 3ß — 3ijj.	erst bei 32° unter 0R. eine feste Consistenz an. Bei einer Tem- peratur, die einige Gra- de über die des Kochen- den Wassers steigt, ver- flüchtigt es sich in Dämpfe. Contrain- dicantia : 1) Scorbu- tische An- lage, Scorbut. 2) Große Neigung zu Blus- tungen. 3) Krebs.—


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			Solutio mercuria- lis Plen- kii. d) Hydrar- gyrum sacchara- tum, s. Merc. sacchar. e) Unguen- tum hy- drargy- ri ci- nereum. f) Empla- strum hy- drargyri.	
Hydrar- gyrum.	Queck- silber.		III. Die Verbin- dungen des Queck- silbers mit Schwefel. a) Hydrar- gyrum sulphu- ratum ni- grum, s. Aethiops minera- lis. b) Hydrar- gyrum stibiato- sulphura- tum, s. Aethiops	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
verursacht es Salivation, Exulcerationen f. w.	die Läusesucht u. f. w.			
Diese Präparate wirken vorzüglich auf die Haut, und zwar theils auf die Gefäße,	1) Bei hartnäckigen Hautausschlägen, Krätze. — 2) Bei Drüsenverstopfungen, Scropheln. 3) Gegen Würmer. 4) In der Lustseuche.	Pulv.	gr. j — vjij — x — xx. — gr. v — x.	

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			antimo- nialis.	
			c) Hydrar- gyrum sulphura- tum ru- brum oxyda- tum s. Cinnaba- ris prae- parata.	
			d) Pulvis alterans Plum- meri.	
			IV. Die Quecksil- ber-Sal- ze.	
			a) Hydrar- gyrum muriati- cum cor- rosivum s. Mer- curius sublima- tus, s. Hydrar- gyrum muriati- cum oxy- datum.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
theils auf die Drüsen an der Ober- fläche.	Als Räucherung bei venerischen Kno- chenauftreibungen, Hodenverhärtungen, Augenentzündungen, Wassersüchen.			
	1) Bei Gicht und Rheumatismus. 2) Bei chronischen Hautkrankheiten. 3) Bei Catarrhen. 4) Bei Menstrualfeh- lern.	Pulv. Pillen.	gr. j.	
In Pul- ver an- gewen- det er- regt es Nebel- keit, Er- brechen, stechende Schmer- zen und Entzün- dung.	1) Im höchsten Gra- de der Eustache und bei hartnäckig- en syphilitischen Hautkrankheiten: 2) Bei hartnäckiger Gicht. 3) Bei Drüsenver- härtungen. Außerlich bei allen venerischen Ge- schwüren und Exul- cerationen, bei Schleimflüssen, Au- genkrankheiten, Krätze —.	Pillen. Aust. Aust.	p. d. gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$. — gr. j — ▽ 3j.	In größe- rer Gabe verursacht es Bren- nen und Entzün- dung mit Blasen im Munde, im Schlunde und im Ma- gen; Durst, Erbrechen, Kolik, Angst, Herzs- klopfen, blutige Stuhl- gänge, u. s. w.

Officinaler Name.	Erstmal.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			b) Hydrar- gyrum muriati- cum mite, s. Calo- melas, Mercurius dulcis, Hydrar- gyrum oxydula- tum mu- riaticum, Calomel.	
			c) Hydrar- gyrum sul- phuricum flavum, s. Turpe- thum minerales.	
			d) Hydrar- gyrum nitricum,	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Es erregt sehr leicht Speichelfluß und Purgiren. u 4 — Gran verursacht es Erweichungen des Peritoneum. Durchfall, biszuweilen auch Erbrechen, zu 2 Drachmen wirkt es tödtend.	1) In der Lustseuche. 2) Gegen Würmer. 3) In der Wasserscheu. 4) Bei Wassersuchten. 5) Bei Verstopfungen des Unterleibs, Drüsenverhärtungen. 6) Bei örtlichen Entzündungen des Halses, der Lungen —. 7) Bei allen acuten Exanthemen. 8) Bei der häutigen Bräune. 9) Gegen Nervenkrankheiten.	Pulv. Symplic. 	gr. $\frac{1}{2}$ - j - jj. gr. jv — viij.	Der Kalomel kann sowohl durch Sublimation, als durch Präcipitation gewonnen werden.
Heftig reizend, draßstisch.	Ehemals empfahl man dieses Mittel vorzüglich gegen die Wasserscheu.		gr. β — x.	Es erregt, zu gr. j gegeben, meist stärkern Stuhlgang, in größern Gaben Erbrechen, Schweiß, Harnabgang.
Schweiß und Harn	Bei eingewurzelten venerischen Krankheiten.	In ▽ aufgel.	gr. jj —	Zuweilen erregt es


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			s. Mercurius nitrosus. (Liquor hydrargyri nitrici).	
			e) Hydrargyrum aceticum, s. Mercurius acetatus.	
			f) Hydrargyrum muriaticum praecipitatum, s. Mercurius praecipitatus, Hydrargyrum muriaticum ammoniatum.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
abson- derung vermeh- rend, das Drüsen- und Lymph- system erhält- end.	Aeußerlich in Krebshaften und übeln Geschwüren, bei hart- näckiger Kräße.	—		Uebelfeit, Erbrechen, auch wohl Durchfall.
Stuhl- und Harn- absonde- rung vermeh- rend; Kolik und Krämpfe verur- sachend.	Es wurde früher äußerlich bei Haut- krankheiten empfoh- len.	Auff. Salbe.		
	Boerhaave, van Swieten und andere ältere Aerzte brauch- ten es in venerischen Krankheiten, gegen Kräße und Würmer.			Aeußerlich wenden wir dieses Prä- parat bei Flechten, Kräße, Kopfschind — an; Unguent. hydrargyri album.


Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			g) Hydrargyrum oxydatum rubrum, s. Mercurius praecipitatus ruber.	
			h) Liquor Hydrargyri muratici corrosivi s. Aqua phagedaenica.	
			i) Aether mercurialis.	
Antimonium, s. Stibium.	Spießglanz. Antimonium.		I. Das regulinische Spießglanz. a) Stibium purum s. Regulus Antimonii. (Setzt außer Gebrauch).	





Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			II. Das oxydirte Spießglanz. a) Stibium oxydatum fuscum, s. Crocus metallicum. α. Aqua benedicta Rulandi. b) Stibium oxydatum album non ablutum. c) Stibium oxydatum album ablutum. III. Geschwefeltes Spießglanz. a) Stibium sulphuratum nigrum laevigatum. b) Stibium sulphuratum au-	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
und ungen, specifisch auf den Darmkanal, Brechen erregend und in starken Gaben laxirend, beruhigend als Nervensystem und specifisch auf das ganze Lymphsystem.	2) Bei Krankheiten der Haut, um die Transpiration zu befördern. 3) Bei Krankheiten des Darmkanals, gastrischen Unreinigkeiten. 4) Bei Krankheiten des Lymphsystems oder Störungen einzelner Eingeweide des Unterleibs. 5) Bei chronischen Nervenkrankheiten.	Puls. Aufl.		gen: unbesiegliches Erbrechen und Purgiren, heftige Unterleibsschmerzen, Aufblähung, Entzündung, auch wohl Brand des Magens; heftige Krämpfe, Zuckungen, trockner Husten, Bangigkeit, selbstWahnsinn, Lähmung u. s. w.
vorzüglich auf die Haut und das Lymphsystem, weniger auf den Darmkanal.	1) Bei Krankheiten der Haut. 2) Bei Rheumatismus, Gicht. 3) Bei chronischen Geschwüren. 4) Bei Scropheln. 5) In der Syphilis.	Puls. Pillen.	℞ —	
reizend, rhithend,	1) Bei hartnäckigen Hautkrankheiten.			


Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			rantia- cum, s. Sulphur antimo- nii aua- tum. c) Sulphur stibi- atum rubrum, s. Ker- mes mi- nerale. d) Calcäria sulphura- ta - stibi- ata, s. Calx An- timonii cum Sul- phure. e) Liquor saponis stibiati, s. Sulphur auratum liquidum. f) Sapo sti- biatus.	
Antimoni- um, s. Sti- bium.	Spieß- glanz.		IV. Die Antimo- nial- Salze. a) Liquor Stibii mu- riatici, s. Buty- rum An- timonii.	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
sehr stark auf Haut und Lungen, Ekel, Brechen erregend.	2) Bei Wechselfiebern. 3) Bei Rheumatismus und Gicht. 4) Als Expectorans im 2ten Stadium der Pneumonie.	Puls.	gr. $\frac{1}{2}$ — j —	
Stuhl- und Harn- und Schweiß treibend.	1) Bei Gicht und chronischem Rheumatismus. 2) Bei Hautausschlägen.	Aufl.	gr. jj — vj.	
Auflösend, zertheilend.	Bei hartnäckigen Hautkrankheiten und Krankheiten der Leber, bei Rheumatismus, Gicht —.	Pillen. Aufl.	gtt v — x gr. v gtt x —	
Höchst ätzend, zerstörend.	Außerlich als Heilmittel bei caridosen Knochen, Auswüchsen, Warzen, beim Staphyлом.		gtt j.	Dieses Mittel erfordert bei seiner Anwendung die größte Behutsamkeit.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			b) Tartarus stibiatus, s. emeti- cus.	
			α. Vi- num stibia- tum, s. Vinum emeti- cum, s. Vinum	
			anti- monia- tum, s.	
			Tinc- tura anti-	
			monii Huxha- mi.	
			β. Un- guen- tum stibia- tum.	



Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Brechen erre- gend, laxi- rend, die Haut- absonde- rung beför- dernd.	Innerlich: 1) Als Brechmittel in gastrischen Krank- heiten, doch nicht da wo Durchfall und metallische Ver- giftungen zugegen sind. 2) Bei allen einfachen unbestimmten Fie- bern, eben so bei allen entzündlichen und nervösen Fie- bern und bei allen Fiebern mit Brust- affection. 3) Bei acuten und chronischen Exan- themen. 4) Bei Drüsenkrank- heiten. 5) Bei Wassersuchten. 6) Bei Rheumatis- mus. 7) Bei der Apoplexie nach einem Ader- laß. 8) Bei chronischen Nervenkrankheiten, bei Lähmungen, Amaurosis. Außerlich gegen Hautkrankheiten, bei Lähmungen, Krankhei- ten der Augen.	Pulv. Aufl. Pulv. Aufl.	gr. $\frac{1}{2}$ — j — jv. — — gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$. 3j — ∇ ℞. gr. j — 3j.	Bei Men- schen, deren Nervensys- tem nicht besonders affigirt ist, pflegen höchstens 4 Gran Brech- weinstein eine hin- längliche Wirkung zu äußern. Nur in sol- chen Krank- heiten, wo das Ner- vensystem vorzüglich angegriffen, geschwächt, betäubt — ist, z. B. beim Wahnsinn, muß man zuweilen 6 - 8 - 10 - 20 Gran ge- ben, um Er- brechen her- vorzubrin- gen. Bis 64 Gran sah ich anwen- den, ehe Wirkung erfolgte.


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Argen- tum. Luna.	Silber.		1) Argen- tum ni- tricum cristalli- satum. 2) Argen- tum ni- tricum fusum, s. Lapis in- fernalis. 3) Argen- tum oxy- datum.	
Zincum.	Zink. Spian- ter.		1) Zincum oxydatum album, s. Flores Zinci. 2) Zincum sulphuri- cum, s. Vitriolum Zinci s. album. 3) Nihilum album. 4) Tutia. 5) Lapis Calami- naris. 6) Unguen- ti Zinci.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Reiz- zend, etzend.	Innerlich bei chronischen Nerven- krankheiten, Epilepsie, Catalepsie —.	Pfl.	gr. $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ —	Das Sil- ber wird hauptsäch- lich von Salpeter- säure und oxygenirter Salzsäure gut aufge- löst; mit Schwefel, Phosphor und Hydro- thionsäure geht es leicht Ver- bindungen ein, aber nicht mit Alkalien.
	Außerlich beim Tripper, bei Fisteln, bei stark eiternden Geschwüren, bei Warzen —.	Aust.	gr. β — auf 3j.	
Vorzüg- lich auf Nerven- und Lymph- system, beruhi- gend, Krampf stillend, Schmerz- lin- dernd; in größern Gaben Brechen erre- gend.	1) Als Antispasmodi- kum bei Epilepsie, Magenkrampf —.	Zinkbl. Pulv.	gr. j-iii	Gaubius machte zu- erst bei Krämpfen von den Zinkblumen Gebrauch.
	2) Gegen Würmer.			
	3) Als Emetikum bei Vergiftungen durch Narkotika.	Zink- vitri- ol. Aust.	gr. vj — 3 β .	
	Außerlich als austrocknendes, rei- nigendes Mittel.			
	2) Bei Augenentzün- dungen.	—	gr. iv - Δ 3j.	
	3) Gegen flechtenar- tige Ausschläge und Krätze.	Salbe.		
	4) Gegen Aphthen.			

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Cuprum. Aes. Venus.	Kupfer.		1) Limatura cupri. 2) Cuprum sulphuricum, s. Vitriolum caeruleum, s. cupri. 5) Cuprum sulphuricum ammoniatum, s. Cuprum ammoniacale. 4) Aerugo, s. Viride aeris. (Grünspan). a. Oxy- mel aeruginis s. Unguentum aegyptiacum.	
Bismuthum, s. Wismuthum, s. Marcasitum.	Bismuth. Wismuth. Aschblci.		1) Bismuthum oxydatum album, s. Magisterium Bismuthi.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	Sonst gegen Wassersüchen.			Aretaeus empfahl
Hefig reizend und Erbrechen erregend.	In chronischen Nervenkrankheiten und bei heftigen krampfhaften Krankheiten, Epilepsie —. Außerlich gegen Hautausschläge und als blutstillendes Mittel.	Puls. Emetic. Ausz.	gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$. gr. j — jj ℥β — j ▽ 3j	das Kupfer schon gegen die Epilepsie. In größern Gaben erregen die Kupferpräparate Uebelkeit,
—	1) In chronischen Nervenkrankheiten. 2) Bei Wassersuchten. 3) Bei Wechselfiebern.		gr. $\frac{1}{4}$.	Magen-schmerzen, Erbrechen, heftigen zuweilen blutigen Durchfall, oder hartnäckige Verstopfung, Unruhe, Beängstigung, Mattigkeit, fieberhafte Bewegungen u. s. w.
Es erregt leicht Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall.	Blos äußerlich bei Flechten und Geschwüren. Bei unreinen speckigten Geschwüren, vorzüglich des Mundes.	Ausz.	℥β — j — 3j ▽	Nagel, Beängstigung, Mattigkeit, fieberhafte Bewegungen u. s. w.
Krampf, stillend, beruhigend.	Specifisch gegen Magenkrämpfe und Wurmbeschwerden.	Puls.	gr. — j jj.	Dies Mittel ist nicht zu empfehlen, theils weil wir wirksamere


Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Plumbum. Saturnus.	Bley.		1) Lithar- gyrum. (Bleiglät- te, Sil- berglätte.) 2) Plum- bum oxy- datum rubrum, s. Minium. 3) Plum- bum ace- ticum, s. Saccharum saturni. Man giebt dies Mit- tel zu gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ und äußerlich bei Augen- entzün- dungen, als Ein- spritzung beim Tripp- er zu gr. j - x auf ▽ 3j. 4) Acetum saturni- um, s.	Beide Präp. wer- den nur zu Pflastern benutzt.






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
				Mittel besitzen, theils aber auch weil es mit dem Blei Aehnlichkeit hat.
Das Blei ist für den menschlichen Körper ein gefährliches und langsam tödtendes Gift, vorzüglich im verkalkten Zustande. Innerlich genommen zerstört es die Erregbarkeit und bringt nach und nach Auszehrungen, fürchterliche Co-	Innerlich: 1) Paracelsus wendete das Blei zuerst gegen Asthma und Wassersucht an. 2) Im letzten Stadium der exulcerirten Schwindsucht. 3) Bei Haemorrhagien typhöser Art. 4) Bei chronischen Nervenkrankheiten, Epilepsie, Wasserscheu, Starrkrampf. 5) Bei Durchfällen und 6) Beim Tripper.	Puls. — gr.]		Sind Zufälle einer Bleibergiftung wirklich eingetreten, so sind Oel und Schwefelleber die zweckmäßigsten Mittel, indem sie das Bleioxyd gleichsam einhüllen und neutralisiren.


Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			Extrac- tum sa- turni Goulardi. a. Aqua saturnina, s. Aqua vegeto - minera- lis Gou- lardi. b. Un- guentum saturni- num.	
			5) Plum- bum car- bonicum, s. Magi- sterium Saturni, s. Cerus- sa alba. Daß Blei- weiß be- nutzt man als Streu- pulver bei Flech- ten, Ge- schwüren, der Rose; doch nicht so gefähr- lich ist es in Salben oder Pfla- sterform. a. Ungu- entum	






Wir- kung:	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
likem mit Ver- stop- fung, Engbräu- tigkeit, Fäh- mungen, und Con- tractu- ren der Glieder hervor. In flei- chen Ga- ben wirkt es zusam- menzie- hend, ver- mehrt die Co- haesion der Fa- ser, ver- mindert die Se- und Ex- cretio- nen, hemmt Proflu- vium und depri- mirt die Sensibi- lität und Irrita- bilität,	Außerlich bei chirurgischen Verlet- zungen, Quetschungen, Entzündungen, Ver- brennungen, Frostbeu- len, Durchliegen, Rothlauf u. s. w. Man muß jedoch dieses Mittel nur in den äußersten Fällen anwenden und dann dabei sehr vorsichtig seyn; bei Kindern wende man es wegen der großen Reizbar- keit gar nicht an.	Auß. Salbe. Pflast.		Ist Verstop- fung einge- treten, so muß man diese durch Purgir- mittel he- ben; Durch- fall und Kolik- schmerzen sucht man durch Opium zu stillen.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			Cerussae, s. Unguentum album simpl. b. Unguentum Cerussae camphoratum. c. Emplastrum Cerussae. d. Emplastrum Lithargyri simplex, compositum et cum Resina Pini.	
Arsenicum.	Arse- nif.		1) Arsenicum nativum, s. Regulus Arsenici. 2) Arsenicum album. 3) Arsenicum rubrum. 4) Arsenicum citrinum, s. Aurum pigmentum. (Operment	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
daher beruhigend, schmerzlin-dernd.				
Höchst corro-sivisch und alle Vitali-taet zerstörend.	Gegen hartnäckige Wechselstieber gerühmt. Außerlich gegen Krebs und hartnäckige chronische Hautkrankheiten. Das beste Gegenmittel ist die aufgelöste Schwefelleber, wenn sie frühzeitig	Aufl. Coß-mische Pulv.	p. d. $\frac{1}{60}$ — $\frac{1}{30}$ Gran.	Wird der Arsenik in größeren Gaben gereicht, so entstehn unerträglich heftige, brennende Magen-schmerzen, Schmerzen im Schlun-de und auf


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			oder Kausch- gelb.) 5) Pulvis Cosmi. R. Cinnab. ℞ Pt. 3jj. Cornu ustae gr. vjjj. Sang. Dracon. gr. xjj. Arsenici albi 3jj.	
Stannum. Jupiter.	Zinn.		1) Limatu- ra Stanni.	
Manga- nesium.	Manga- nes. Braun- steinme- tall.		1) Manga- nesium oxydatum nigrum s. Magnesia vitriario- rum. 2) Manga- nesium oxyda- tum al- bum. 3) Manga- nesium sulphuri- cum. 4) Manga- nesium	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	genug angewandt wird. Außerdem Seifenwasser mit Del, alle Fette, Oele, Milch —.			der Brust, Kolik, Uebelkeit, Erbrechen, Exiren, Durst u. s. w.
Mechanisch Wurm treibend.	Es wird gegen den Bandwurm und chronische Nervenkrankheiten, Epilepsie — gerühmt.	Pulv. Syrup	3j —	Das beste Zinn erhalten wir aus Ostindien und England.
	Man benutzte den Braunstein bisher hauptsächlich zur Darstellung des Sauerstoffgases, welches er in großer Menge und Reinheit liefert. In neuern Zeiten hat man ihn auch gegen Nervenkrankheiten, Epilepsie und chronische Hautkrankheiten empfohlen.	Pulv. Salbe.	gr. v — xx.	Das Braunstein-Metall, welches erst in neueren Zeiten entdeckt, kommt in England, Ungarn und in Deutschland vor.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			muria- ticum. 5) Mangan- esium aceti- cum.	
Aurum. Sol. Rex me- tallorum.	Gold.		1) Aqua Regis. 2) Aurum fulminans. 3) Aurum potabile.	
Plumbago. Graphites.	Gra- phit. Reiß- blei.			



Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
SODA	Das Gold wurde früher bei Nervenkrankheiten, bei der Wassersucht und zur Verlängerung des Lebens benutzt. Neuerdings gegen hartnäckige venöse Krankheiten empfohlen.	Pillen.	gr. i —	
Gold specifisch auf die Haut wirken.	1) Bei Chronischen Hautausschlägen. 2) Bei scrophulösen Verhärtungen. 3) Bei der Gicht.	Latw. Pill. Salbe.	3) bin- nen 8 Tagen.	

C I a s- A-

Das Wasser, in der Form wie es uns von der Na-
eine tropfbare Flüssigkeit dar, die geschmacklos, geruchlos,
flüchtig ist. Es ist an sich ein concreter Stoff, der seine
dankt, die ihn in einem Zustande des Schmelzens erhält.
neralwasser dar.

1. Aqua

Die nächsten Bestandtheile des einfachen Wassers
fernten Bestandtheile oder dessen Elemente, woraus es
Wärmestoff, (auch Kohlensäure und erdige Theile). Das
säure, das Flußwasser weniger und das Regenwasser noch
Flüssigkeiten in der Natur; es wirkt daher auch auf den
nend, sondern auch im Allgemeinen belebend; es besör-
Sanguifikation, und wirkt dabei nährend.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Aqua fri- gida. (Aqua commu- nis.)	Kaltes Wasser. Ge- wöhn- liches Wasser.		NB. Ein gu- tes Was- ser muß crystall- hell, ge- schmack- und ge- ruchlos seyn, leicht kochen und bald wieder er- kalten, beim Still- stehen nicht trübe	Sauerstoff. Wasserstoff. Kalkerde. Kochsalz.





s i s

XIV.


q u a.

tur dargeboren wird, stellt in seinem reinsten Zustande farbenlos, durchsichtig und in der Wärme vollkommen liquide Form einer gewissen Quantität Wärmestoff vor. Die Natur bietet uns einfaches und gemischtes oder *simplex*.

sind concretes Wasser oder Eis und Wärmestoff; die entsteht in der Natur erzeugt ist, sind Wasserstoff, Sauerstoff und Quellwasser ist das reinste und enthält die meiste Kohlenwasserstoff. Es ist Grund und Element alles Lebens, aller menschlichen Organismus nicht nur die Säfte verdünnt vorzüglich die Digestion, die Assimilation und die


Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Zusammenziehend, antiseptisch; die Cohäsion der Faser vermehrend, das Nervensystem ex-	Innerlich: 1) Bei Faulfebern, fauligen Exanthemen. 2) Bei großer Mangelgeschwäche. 3) Bei Haemorrhagien. 4) Bei Steinbeschwerden. 5) In chronischen Nervenkrankheiten und Gemüthskrankheiten. 6) Gegen Würmer und 7) Bei localen Congestionen.	Quellwasser.	Tägl. iv - vj Quart. q. s.	Bei der Anwendung des Wassers unterscheiden wir nach der Temperatur folgende Grade: 1) Eiskaltes Wasser, von 0° R. 2) Kaltes Wasser von 5° — 11° R. 3) Frisches,

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			werden, noch einen Bo- densatz machen, die Seife leicht auflösen und damit bald Schamm ge- ben, beim Eintropfen der Silber- auflösung in Scheide- wasser und der Kalz- auflösung sich nicht trüben.	
Aqua frigida.	Kaltes Wasser.			





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
citirend, die Ver- dauung beför- dernd, und kühl- end, weil es dem Körper Wärme entzieht.	Außerlich bei Quetschungen, Blu- tungen, Congestionen nach dem Kopfe und anderen Organen, Brüchen, chronischen Geschwüren, Erfrie- rungen und als Stärkungsmittel bei localer Schwäche der Nerven, auch so bei äusseren mehr passiven Entzündungen.	Um- schl. Bad. Eis. Schne.	q. s.	kühles Wasser von 12° — 23° R. 4) Lauwarmes Was- ser von 23° — 27° R. 5) Warmes Wasser von 27° — 36° R. 6) Heißes Wasser von 35° — 50° R. 7) Siedend- heißes Wasser von 70° — 80° R.
Zusam- menzie- hend, stärkend, u. s. w.	1) In die Harnröhre und Urinblase, bei großer Schwäche und profusen Schleimflüssen — 2) In die Scheide und den Uterus, bei passiven Blus- tungen, profusen Schleimflüssen und Schwäche. 3) In den Mastdarm, bei großer Schwäche, hart- näckiger Verstop- fung und Hae- morrhoidalbeschwer- en.	Als Ein- spritz- ung.	q. s.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	den; bei Hypochon- drie, Mastdarmvor- fall und bei großer Schwäche der nahen Theile.	Als Ein- sprit- zung.	q. s.	
Heftig erschüt- ternd, einem elektri- schen Schlage ähnlich; zusam- menzie- hend, die Fas- ser und Mus- keln der äußern Ober- fläche stär- kend.	1) Bei allgemeiner großer Nerven- schwäche. 2) Nach allen gich- tischen und rheuma- tischen Krankheiten als Nachcur.	Kaltes Bad 15° R.	$\frac{1}{4}$ St.	Regeln beim Ba- de. Patient muß nicht plethorisch und vor- her nicht er- hitzt seyn; darf keine festen Spei- sen genießen und gastris- che Unrei- nigkeiten bei sich ha- ben; er muß immer Kopf und Brust zu- vor wa- schen, nicht zu lange baden und sich nachher wieder be- wegen.
Von ei- ner solchen Anwen- dung darf	1) Bei lokalen krampfhaften Affec- tionen, Magen- krampf.	Tropf- Tausch- und	q. s.	Bei schwä- chen Perso- nen läßt man das Wasser durch ein Sieb auf


Officiner Name.	Erbial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Aqua calida.	Warmes Wasser.			






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
man höchstens nur $\frac{1}{4}$ Stunde Gebrauch machen.	2) Bei Stockungen, Verhärtungen. 3) Bei Lähmungen. 4) Bei heftigen Gemüths- und Nervenkrankheiten.	Sturzbad.	q. s.	den Kopf fallen; sonst eimerweise von einer Höhe herabgessen oder durch eine Spritze mit Kraft gehen.
Expansivend, weniger reizend, den Magen belästigend, Flatulenz; erregend und viel Gas entwickelnd; allgemein er schlaffend, die Secretionen befördernd, auflösend, zertheilend.	1) Als krampfstillen- des Mittel bei Krankheiten der Unterleibseingeweide. 2) Bei allen Entzündungskrankheiten. 3) Bei Verstopfungen und Stockungen der Unterleibseingeweide. 4) Bei allen Krankheiten mit rigider Faser. 5) Bei Gicht und chronischem Rheumatismus. 6) Bei Brustkrankheiten, Catarrh —	Thee. Bad. umsch. u. s. w.	q. s.	Zum Getränk benutzen wir das warme Wasser allein nicht, es dient nur zur Bereitung anderer Getränke, des Thees, Kaffees u. s. w. Außerlich macht man auf verschiedene Weise davon Gebrauch.

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Aqua calida.	Warmes Wasser.		1) Lauwar- mes Bad. 20° — 26° R.	
			2) Warmes Bad. 27° — 30° R.	
			3) Locals Bäder.	






Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Bele- bend, beruhi- gend, erschlaf- fend; die Trans- piration schnell beför- dernd und krampf- stillend. Die An- fangs etwas beschleu- nigte Respira- tion und Circula- tion werden bald langsa- mer; nach dem Ba- de er- folgt Schlaf und Haut- ausdün- stung.	1) In allen Nerven- krankheiten als be- ruhigendes Mittel. 2) Bei allen gichti- schen und rheuma- tischen Zufällen. 3) Bei allen chroni- schen Hautausschlä- gen, Krätze. 4) Bei lokalen Ent- zündungen. 5) Bei chronischen Durchfällen und Ruhr. 6) Bei eingeklemmten Brüchen. 7) Bei Haemorrhoi- dalbeschwerden. 8) Bei Strangurie und Ischurie. 9) Bei chronischem Er- brechen und hefti- gen Magenkräm- pfen. 10) Bei großer Reiz- barkeit der Haut.	Al- ge- met- nes Bad.	$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{4}$ — Stb.	Contrain- dicantia: 1) Unreinig- keiten der ersten Wege. 2) Entzünd- liche An- lage. Sollte man das warme Bad auch beim Ty- phus und acuten Ex- anthemen, als Blattern anwenden wollen, so darf der Kranke nie über 5 — 8 Minuten sich darin aufhalten.
	Wir wenden sie an um eine Ableitung zu bewirken, um eine			Wir wen- den das warme

Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			a. Fußbänder. b. Armbänder.	
			4) Dampf- und Dampfbänder.	
			5) Fomentationen und Cataplasmata.	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	unterdrückte Thätigkeit des Organismus wieder hervorzurufen und um einen leidenden entzündeten Theil zu erweichen. Armbäder: bei Krankheiten der Brust, Entzündungen oder Krämpfen. Fußbäder: zur Hervorrufung des Fußschweißes, der unterdrückten Menstruation und um eine Ableitung zu bewirken.	—	$\frac{1}{4}$ St. —	Wasser auch als Einspritzungen, Klystiere und Umschläge an. Gewöhnlich setzt man noch Senf, Salz, Asche, Kräuter u. s. w. zu, um einen größern Reiz hervorzubringen
	Bei hartnäckigen Gichtkrankheiten, Lähmungen, Schwäche. Örtlich um eine Geschwulst oder Verhärtung zu zertheilen, und um Schmerzen zu lindern.		$\frac{1}{4}$ St.	Bei den Russen sind die Dampfbäder sehr gebräuchlich. Sie sind entweder örtlich durch einen Trichter, oder allgemein in großen Gefäßen.
	Um Abscesse zur Reife zu bringen, dann bei Verhärtungen und in allen Fällen wo Krampf und Entzündung zugegen ist.		q. s.	


2. Aqua mixta,

Die gemischten oder Mineralwasser, welche höchst der Kohlensäure noch durch andere salinische, kalinische sämmtlich Produkte der unterirdischen Kunst und nie- und eng verbundene Flüssigkeiten, in welchen alle Sub- der Mineralquellen scheint auf einer großen Erregung, starke Beförderung aller Ge- und Excretionen. Un- tern und wo möglich im Sommer genießen, fängt mit lich, läßt nach dem Genuße desselben den Kranken bewes- sorgt dabei stets für offenen Leib. — Außerlich benutzt örtliches Bad, und wendet sie ebenfalls des Morgens selbst an.

Contraindicantia: 1) Unreinigkeiten in den er- Speisen, geräuchertes Fleisch und Hülsenfrüchte, die der Erhitzungen und Gemüthsaffekte.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile
Aqua mu- riatica, s. salina.	Muria- tisches oder salini- sches Mine- ral- wasser.		1) Das Seewas- ser. 2) Die mu- riatisch- kalinischen Wasser. a) Das Sel.	1) Rochsalz. 2) Salpeter. 3) Selenit. 4) Bitter- salz. 5) Harzstoff. 6) Bitter- erde.





s. mineralis.


verschieden in der Natur vorkommen, zeichnen sich außer
oder sonstige mineralische Beimischungen aus. Sie sind
mand kann sie nachahmen, denn sie sind innig gemischte
stanzen auf das feinste aufgelöst sind. Die Wirksamkeit
Reizung des Blutsystems zu beruhen und verursacht eine
wendung: innerlich läßt man das Mineralwasser nuch-
kleinen Gaben an (℥iv — vjij) und steigt dann allmäh-
gen, ihn eine leichte und nahrhafte Diät genießen und
man die Mineralquellen sowohl als allgemeines und als
gleich nach dem innern Gebrauche und an der Quelle

sten Wegen, 2) allgemeine Vollblütigkeit, 3) Säure, fette
Kranke stets vermeiden muß, 4) heftige Anstrengungen,

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Die Ner- ven stär- kend, profuse Se- und Excre- tionen min- dernd, die Ir- ritabi- lität er- höhend.	1) Gegen chronische Hautausschläge, Flechten, Krätze. 2) Bei Nervenkrank- heiten und Lähmun- gen. 3) Gegen Würmer. 4) Bei Scropheln 5) Bei chronischen Geschwüren. 6) Zur Beförderung der schwachen Ver- dauung.			Innerlich wird das Seewasser nur selten, desto mehr äußerlich als kaltes und war- mes Bad angewen- det.
Küh- lend, auflö- send, stärkend,	1) Bei Verstopfungen der Unterleibseins- geweid, Leber. 2) Bei Blutflüssen. 3) Bei Schwindsuchten.			

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
			terwasser. b) Das Wasser zu Bilin in Böhmen. c) Das Geilnau- erwasser.	— — —
Aqua amara.	Bitter- wasser.		1) Das Saldschitzerwasser. 2) Das Sedlitzer- wasser. 3) Das Stein- wasser. 4) Das Ebshamer Bitterwasser in Eng- land.	1) Glaubersalz. 2) Rochsalz. 3) Salzsauererz. 4) Kohlensaurer Kalk. 5) Salzsaurer 6) Kohlensaure Magnesia.
Aqua kalina.	Alkali- nisches Wasser.		1) Die alkalischen erdigen Wasser: a) Das Pfeffersbad in der Schweiz. b) Das Embserbad. c) Das	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
auf den Darm- kanal eröff- nend, diure- tisch. Erfri- schend, kühlend.	4) Bei unterdrückten Haemorrhoiden. 5) Bei Steinbes- chwerden, und Krankheiten der Urinwerkzeuge.			
Eröff- nend, auflö- send, ab- führend.	1) Bei Haemorrhoi- dalbeschwerden und Störungen des Unterleibs. 2) Gegen chronische Hautausschläge. 3) Bei unterdrückter Menstruation. 4) Als Ableitungsmittel bei starken Congestionen.		Zwei Wein- gläser voll.	Es be- kommt vor- züglich phlegmati- schen ver- schleimten Personen.
Auflö- send, zerse- tzend, krampf- stillend, beruhi- gend, diure- tisch, diapho- retisch.	1) Bei Chronischen Hautkrankheiten. 2) Gegen Nerven- krankheiten. 3) Gegen Sicht und Lähmung. 4) Bei Haemorrhoi- den. 5) Gegen Steinbes- chwerden. 6) Bei anfangender Schwindsucht. 7) Gegen Krämpfe. 8) Bei Störungen			Diese alkas- linischen Wasser ha- ben einen laugenhaf- ten Ge- schmack, färben blaue Pflan- zensäfte grün, und brausen mit Säuren.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			Schlanguenbad. 2) Die alkalischsalinischen Wasser. a) Das Carlsbad. b) Das Wiesbadenerbad. c) Das Teplitzerbad. 3) Die alkalisch-eisenhaltigen Wasser: a) Das Egerbad. b) Das Brücknauerbad bei Teplitz. c) Das Alexanderbaderbad bei Eger.	
Aqua martialis, s. ferrina.	Eisenhaltiges Wasser.		1) Die martialischsalinischen Wasser. a) Der Brunnen	Das Eisen ist in Kohlensäure oder in



Officiner Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
			zu Pyrmont. b) Der Brunnen zu Dryburg bei Paderborn. c) Der Brunnen zu Spaa. d) Der Brunnen zu Wildungen, Meyerberg, Schwalheim, Rüfingen 2) Die martialisch-salinisch-alkalischen Wasser: a) Der Brunnen zu Liebenstein bei Eisenach. b) Der Brunnen zu Rheinerz, Geismar.	Mineralsäure, oder in hepatischen Gas aufgelöst.
Aqua sul-	Schwefelhalt		1) Die alkalisch-geschwe-	






Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
röther, die Wärme größer, die Muskelfaser gespannter und derber. Die Verdauung, Ernährung, Absonderung und Aussonderung wird verbessert.	Menstruation, Bleichsucht. 3) Bei Haemorrhoidalbeschwerden. 4) Beim weißen Fluß und Pollutionen. 5) Bei Lähmungen, Schwindel, Scropheln und andern Uebeln, deren Grund in einer wirklichen Schwäche liegt; so wie auch bei jeder Schwäche die nach andern hitzigen oder chronischen Krankheiten zurückgeblieben ist,			den, ihr Eisen in Gestalt eines gelbes rothen Kaltes fallen, und bekommen auf der Oberfläche eine blaue schillernde Haut.
Höchst durchdringend	1) Bei chronischen Hautkrankheiten. 2) Bei chronischen			Die Schwefelwasser riechen wie

Officinaler Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestands- theile.
phura- ta.	tiges Wasser oder Schwe- felbrun- nen.		felten Wasser: a) Der Brunnen zu Uchen. b) Warm- brun in Schle- sien. c) Der Brunnen zu Weils- bach bei Mainz. 2) Die sa- linischen Schwe- felwasser: a) Der Brunnen zu Kenn- dorf, Eil- sen, Nords- heim, Landeck. 3) Die eis- senhalti- gen sall- nischen Schwefel- wasser: a) Der Brunnen zu Lippe, Baden bei Wien u. a. m.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
gend, reizend, vorzüglich auf die Haut und auf den Darmkanal; auflösend, eröffnend, abführend.	Nervenkrankheiten, Lähmungen. 3) Bei Sicht und Rheumatismus. 4) Bei Schleimflüssen und Haemorrhagien.			Schwefel- leber oder faule Eier, am meisten bei warmer Bitterung. Sie enthal- ten den Schwefel entweder als Schwefel- leber, oder als he- patisches Gas.
— —	1) Bei Drüsenverhärtungen und Verhärtungen der Leber, bei der Gelbsucht. 2) Bei Menstrualverstopfung. 3) Bei Verschleimungen. 4) Bei Metallvergiftungen.			
— — — —				

C l a s - Aërea

Unter Luft oder Gas (Gas) versteht man jede expan- permanente Elasticität von denen in der Kälte verdicht- Luft- oder Gasart vorzüglich zwei bildende Bestandtheile, Jene ist in jeder Gasart verschieden, und von ihr hän- Wärmestoff hingegen ist in allen Gasarten derselbe, und Luftform verdankt.

Officineller Name.	Trivial.	Systemati- scher Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Aër s. Gas at- mosphae- ricum. (Aër com- munis.)	Atmo- sphäri- sche oder ge- meine Luft.			Stickstoff- gas. Sauerstoff- gas.





s i s XV.


s. Gas.

stille permanent elastische Flüssigkeit, die sich durch ihre baren Dünsten auszeichnet. Man unterscheidet in jeder die feste Grundlage oder Basis, und den Wärmestoff. gen die specifischen Eigenschaften der Gasart ab. Der macht dasjenige Wesen darin aus, welchem die Basis die

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
Die Ein- wirkung der at- mosphä- rischen Luft, in so fern sie aus Sauer- stoffgas und Stick- stoffgas in einem gewissen Verhält- nisse zusam- men ge- setzt ist, haben wir zum Prozeß des Athem- holens, er mag	1) Bei chronischen Nervenkrankheiten, die sich auf erhöhte Reizbarkeit gründen. 2) Die Seelust als stärkendes Mittel bei Schwindsucht und großer Nerven- schwäche. Hektischen Per- sonen ist vorzüglich eine Gegend mit hei- terem Klima und an- genehmer Bitterung zu empfehlen, z. B. wie zu Nizza in Ita- lien, zu Nîmes und Montpellier in Frank- reich.	Luft- bad, oder Be- we- gung in der- sel- ben.		Um die Luft in Zimmern rein zu er- halten, ist das Oeffnen der Fenster, das Spren- gen mit Essig, mit Kalkwasser und die sauren Räucherun- gen zu empfehlen.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
Aër vitalis, s. dephlogisticatus, s. Gas oxygenium.	Lebensluft. Sauerstoffgas, Feuerluft.		NB. Am reinsten liefern diese Luftart, der durch Salpetersäure bereitete rothe Quecksilberkalk und der Braunstein.	1) Sauerstoff. 2) Wärmestoff.
Aër fixus, s. Gas carbonicum, s. carbonium. Acidum aëreum.	Fixe Luft. Kohlenstoffgas. Luftsäure.			Reiner Kohlenstoff. Sauerstoff. Wärmestoff.





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerk- ungen.
in Dry- dation oder Decar- banisa- tion des Bluts beste- hen, be- ständig nöthig.				
Exciti- rend auf den mensch- lichen Orga- nismus, den Pro- zeß der Respira- tion vermeh- rend, die Cir- kulation beschleu- nigend.	1) Bei Asphyrien. 2) Bei Chronischen Brustkrankheiten. 3) Bei der Bleich- sucht. 4) Beim Scorbut. 5) Bei zu großer Fetttheit, Wasser- sucht. 6) Bei der Schwind- sucht.	—		Es ist der- jenige Be- standtheil der atmo- sphärischen Luft, wel- cher dieselbe zur Unter- haltung des Athemho- lens und des Feuers einzig ge- schickt macht.
Reizend auf den Darm- kanal und Nerven- system, den Um- trieb des Bluts be-	1) Bei chronischem Erbrechen. 2) Bei Faulstiebern. 3) Beim Scorbut. 4) Bei Unterdrückung der Menstruation	Kali car- bon. cum acido ad Sat.	q. s.	Man läßt die Kohlen- säure im Magen selbst ent- wickeln, als durch die Riberi- sche Potion, die Brause- pulver.

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Gas hy- drogeni- um, s. Aër in- flamma- bilis.	Wassers- stoffgas.			
Gas nitro- genium, s.	Salpes- terstoff- gas.			





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
schleu- nigend; Brechen stillend, fäulniß, widrig.	und Haemorrhoi- den. 5) Bei Blasen- und Nierensteinen. 6) Bei Exulceratio- nen der Blase und Nieren. 7) Bei der Schwind- sucht.	Sel- ter- Dry- burg- Pyr- mont- Waf- ser.	q. s.	Die Luft in den Ruh- ställen ist Schwind- süchtigen, scorbuti- schen, Krebs- behafteten Personen sehr zu empfehlen.
Ge- wöhn- lich ent- steht da- rauf ein eigenes Gefühl von Leichtig- keit auf der Brust und spä- ter eine blaulich graue Farbe des Ge- sichts, die sich bald wieder ver- liehrt.	Ist beim Schleim- husten, bei Heiserkeit und bei Schwindsuch- ten empfohlen.			Das Was- serstoffgas kann nicht für sich, son- dern nur in Verbin- dung mit gleichen Theilen at- mosphäri- scher Luft eingeathmet werden.
	Bei Lungen- schwindsuchten will			An einigen sehr gas- reichen Ba- deorten, z. B.





Wirs- fung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
	man davon sehr auffallende Hilfe bemerkt haben.			in Eilsen, Meyenberg u. a. sind in neuern Zeiten solche Vorrichtungen getroffen, wodurch das Gas in zweckmäßigen Behältern angesammelt, und von den Kranken anhaltend durch die Lunge und Haut eingeathmet werden kann.

Class- Agentia

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestand- theile.
Calor.	Wärme.		Der Wärmestoff kann sich unsern Sinnen auf eine dreifache Weise offenbaren; nemlich: a) frey, b) gebunden; c) adhärirend.	





Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandstheile.
Frigus.	Kälte.			

Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
lation- beför- dernd.				
Phy- sich: zusam- menzie- hend, bindend, die Co- haesion der Fa- ser ver- meh- rend. Chem- isch: die Zer- setzbar- keit hin- dernd, die Pro- ductivi- taet min- dernd. Dyna- misch: die Sen- sibilität und Reizbar- keit her- abstim- mend; Gefühl- losigkeit, Taub- heit und	Als kaltes Bad; in kalten Umschlägen, Uebergießungen oder in der kalten Luft u. 1) Bei Faulfieber. 2) Bei großer Exi- taet der Faser. 3) Bei Nervenkrank- heiten, die sich auf zu große Sensibi- lität und erhöhte Reizbarkeit grün- den, z. B. Magen- krampf, Schluck- zen.			


Officineller N a m e.	Trivial.	Systemati- scher N a m e.	Präparate.	Bestand- theile.
Lux s. Lumen	Licht.			Das Licht ist ein Pro- dukt der neutralen Mischung aus Wär- mestoff, und einem an- dern eigen- thümlichen Element, welches Lichtstoff (Photoge- nium) ge- nannt wird.
Electrici- tas. Contrain- dicantia: 1) Ein ho- her Grad von Er- regbar- keit. 2) Stheni- sche An- lage und Wallun- gen. Besonders sey man bei Frau-	Electri- cität.	NB. Allge- meine Re- gel. Man fange im- mer mit den schwächsten Graden und mit weni- gen Minu- ten an, gehe nur allmählig zu den stär- kern Gra-	Man ge- braucht die Electricität als Heil- mittel auf eine fünf- fache Weise: 1) Als elec- trisches Bad. 2) Die Aus- strömung. 3) Die Strah- lenbu- schel.	





Wirkung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmerkungen.
Tod hervorb bringend.				
Belebend, die Vegetation der ganzen Natur bewirkend, erhöhend. Metalloxyde reducirt es, mehreren Säuren entraubt es den Sauerstoff etc.	1) Bei Krankheiten von erhöhter Reizbarkeit, sowohl des Auges, als des Nervensystems überhaupt (negativ). 2) Bei Krankheiten des Nervensystems mit torpider Schwäche, bei der Amaurosis (positiv).			Das Licht scheint ein der belebendsten Agentien für die ganze organische Natur auszumachen: alle Thiere und Pflanzen folgen seinem Reize.
Reizend auf das Nervensystem, erschütternd auf Gelenke und Knochen, die Irritabilität verstärkend, das Blut	1) Als starkes Reizmittel; die positive bei verminderter Lebensthätigkeit; die negative beim erhöhten Lebensprozeß, Lähmung, Taubheit, Amaurosis.			Bei einer sehr starken und heftigen Anwendung bringt sie Lähmungen, und selbst einen schnellen Tod hervor, und solche getödtete Geschöpfe gehen schnell in Fäulniß über,


Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
ensperso- nen, wäh- rend der Menstrua- tion vor- sichtig.		den und längeren Zeiten über, und setze die- selbe nie bis zur Ermüdung des Kran- ken fort.	4) Die ein- fachen Funken. 5) Die Er- schütte- rung.	
Galva- nismus.	Galva- nismus.			Der positi- ve Pol zeichnet sich durch Bo- walten d






Wir- fung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
system erres- gend; die Se- cretio- nen be- för- dernd, auflö- send und stark durch- drin- gend; auf die Haut ein prickeln- des Stechen verur- sachend, an mus- kulöse Theile ge- bracht, erregt sie Zu- sammen- ziehun- gen.	2) Bei Asphyxie. 3) Bei chronischem Rheumatismus. 4) Bei unterdrückter Menstruation. 5) Bei krampfhaft convulsivischen Krankheiten. 6) Bei Stockungen und Verhärtungen der Drüsen. 7) Bei Würmern &c.			als andere, woraus man schlie- ßen darf, daß in der Mischung der organi- schen Ma- terie eine wesentliche Verändes- rung vor- gegangen, und daß das Princip der Erregbar- keit schnell- und gänz- lich zerstört ist.
Der Electri- cität analog.	1) Bei Asphyxie. 2) Bei Taubheit. 3) Bei Krankheiten der Geschmacks- Organe.			Ohne Zwei- fel ist die- ses Mittel, eben so wie die Electrici- tät ein

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
				Oxygens der negati ve durch Hy drogen aus
Magnetis- mus.	Magne- tismus.		1) Der mi- neralische Magnetis- mus durch unmittel- bare Ein- wirkung eines Mag- nets auf den fran- ken Orga- nismus.	
NB. Hufeland sagt: „Wir kennen weder das Wesen dieser wunderbaren Kraft, noch ihre Grenzen. Aber Alles zeigt uns, daß sie in die Tiefen des Organismus ein- greift, und das innerste Leben des Nervensystems, ja selbst das geistige zu afficiren, und aus seinen gewöhnlichen Verhältni- ßen zu setzen vermag. Wer also sich dieser Kraft zu bemächtigen, und sie zu handhaben unternimmt,			2) Der ani- malische Magnetis- mus. a) Durch Anhauchen b) Durch Fligiren der Augen. c) Durch Fi- giren der Gedanken. d) Durch Manipu- lation: α) vagi- rende-	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	4) Bei Krankheiten des Auges, vorzüglich bei der Amaurosis. 5) Bei unterdrückter Menstruation. 6) Bei nervösem Kopfschmerz und Paralyse			großes kräftiges Heilmittel, nur fehlt es uns noch jetzt an den wahren Anzeichen zu seinem Gebrauch.
	1) Bei heftigen Magenkrämpfen. 2) Beim nervösen Zahnschmerz und Kopfschmerz. 3) Bei Sicht. 4) Bei nervösen Wechselstößen.			Die Benutzung des mineralischen Magnetismus ist sehr alt.
	1) In allen Nervenkrankheiten, vorzüglich bei denen, die sich auf torpide Schwäche, und erhöhte Reizbarkeit gründen. 2) Bei Störungen, Verhärtungen aller Art; bei unterdrück-			Das Wesen desselben ist uns noch gänzlich verborgen. Erhöhte Sensibilität und ungewöhnliche Steigerung in den Functionen der Reproduces

Officineller Name.	Trivial.	Systematischer Name.	Präparate.	Bestandtheile.
der unternimmt wahrlich ein kühnes Wagestück — vielleicht den größten Eingriff in die höchsten Gesetze der Natur, der möglich ist — und dies bedenke er wohl u.			β) figirtes γ) Dorsal= δ) Margi= nal= ϵ) Polar= Manipu= lation. α) Palmar= β) Digital= Manipu= lation. ζ) Mani= puliren mit Con= tact. η) Manipu= liren in Distanz u.	
Balneum animale.	Thierisches Bad.		1) Die unmittelbare Berührung, und Umwicklung eines animalischen Theils. 2) Die Blutbäder von eben geschlachteten Thieren. 3) Die Gasbäder bei eben geschlachteten Thieren.	





Wir- kung.	Anwendung.	Form.	Dosis.	Anmer- kungen.
	ten Hämorrhoiden und Menstruation, bei Metastasen der Gicht &c. 3) Bei allen Entwickelungs - Krankheiten.			tion schei- nen die wes- sentlichsten und charakt. Erscheinun- gen zu seyn.
	Die Blutbäder wende man früher bei chronischen Nervenkrankheiten, und bössartigen Ausschlägen, wie z. B. beim Aussatz und der Elephantiasis an. Frische Thierhäute benutzt man bei Parasysen, chronischer Gicht, bei örtlich sehr schmerzhafter Entzündung. Am zweckmäßigsten bleibt das neuere Verfahren, den leidenden Theil in die Unterleibshöhle eines eben frisch geschlachteten Thieres zu stecken.			

U e b e r s i c h t

der in der Preussischen Pharmacopoe aufgestellten neuen
Arzneimittel-Namen und der bis dahin gebräuchlichen
alten Benennungen.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Acetum bezoardicum s.	
prophylacticum	Acetum aromaticum.
Acetum per frigus concen-	
tratum	Acetum concentratum.
Acetum Lithargyri	Acetum saturninum.
Acetum radicale	Acetum aceticum.
Acetum vini crudum . . .	Acetum.
Acidum muriaticum oxy-	
genatum	Aqua oxymuriatica.
Acidum tartari essentielle .	Acidum tartaricum.
Aethiops antimonialis . . .	Hydrargyrum stibiato-sul-
	phuratum.
Aethiops martialis	Ferrum oxydulatum ni-
	grum.
Aethiops mineralis	Hydrargyrum sulphuratum
	nigrum.
Alkali causticum siccum . .	Kali causticum siccum.
Alkali minerale aeratum . .	Natrum carbonicum cry-
	stallisatum.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Alcali vegetabile crystalli- satum	Kali carbonicum.
Alcali volatile siccum . . .	Ammonium carbonicum.
Alcali acetici	Acidum aceticum.
Alcohol vini	Spiritus vini rectificatissi- mus.
Antimonium crudum	Stibium sulphuratum ni- grum.
Antimonium diaphoreticum .	Stibium oxydatum album.
Aqua benedicta Rulandi . .	Vinum stibiatum.
Aqua Calcis	Aqua Calcariae ustae.
Aqua cephalica et Embryo- num	Aqua aromatica.
Aqua laxativa	Infusum Sennae composi- tum.
Aqua Naphae	Aqua florum Aurantii.
Aqua phagedaenica	Liquor Hydrargyri muria- tici corrosivi.
Aqua vegeto-mineralis . .	Aqua saturnina.
Aqua vulneraria Thedeni .	Mixtura vulneraria acida.
Arcanum duplicatum . . .	Kali sulphuricum.
Arquebasade	Aqua vulneraria vinosa.
Axungia Porci	Adeps suilla.
Balsamum Arcaeii	Unguentum Elemi.
Balsamum Commendatoris .	Tinctura Benzoes compo- sita.
Balsamum mercuriale . . .	Unguentum Hydrargyri ci- trinum.
Balsamum ophthalmicum .	Unguentum Hydrargyri ru- brum.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Balsamum Opodeldoch.	Linimentum saponato-camphoratum
Balsamum Sulphuris anisatum	Oleum Anisi sulphuratum.
Balsamum Sulphuris simplex	Oleum Lini sulphuratum.
Balsamum Sulphuris terebinthinatum	Oleum Terebinthinae sulphuratum.
Balsamum vitae externum	Sapo terebinthinatus.
Balsamum vitae Hoffmanni	Mixtura oleosa balsamica.
Bitumen judaicum	Asphaltum.
Butyrum Antimonii	Liquor Stibii muriatici.
Butyrum Cacao	Oleum Cacao.
Butyrum Majoranae	Unguentum Majoranae.
Calomelas	Hydrargyrum muriaticum mite.
Calx	Calcaria.
Calx Antimonii cum sulphure	Calcaria sulphurato-stibiata.
Calx viva	Calcaria usta.
Cera viridis	Ceratum Aeruginis.
Ceratum citrinum	Ceratum Resinae Pini.
Ceratum Saturni	Unguentum saturninum.
Cereoli exploratorii	Cereoli simplices.
Cereoli mitigantes	Cereoli saturnini.
Cinorea clavellati	Kali carbonicum crudum.
Cinnabaris	Hydrargyrum sulphuratum rubrum.
Colla Piscium	Ichthyocolla.
Cermor Tartari	Tartarus depuratus.
Cermor Tartari solubilis	Tartarus boraxatus.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Crocus Martis aperitivus.	Ferrum oxydatum fuscum.
Crocus Metallorum	Stibium oxydulatum fuscum.
Crystalli Tartari	Tartarus depuratus.
Cuprum ammoniacale	Cuprum sulphurico-ammoniatum.
Electuarium lenitivum	Electuarium e Senna.
Electuarium stomachicum	Electuarium aromaticum.
Elixir acidum	Mixtura sulphurica acida.
Elixir paregoricum	Tinctura Opii benzoica.
Elixir pectorale	Elixir ammoniato-opiatum.
Elixir roborans s. stomachicum	Tinctura Chinæ composita.
Elixir viscerale	Elixir Aurantium compositum.
Elixir vitrioli Mynsichti	Tinctura aromatica acida.
Emplastrum adhaesivum	Emplastrum Lithargyri cum Resina Pini.
Emplastrum album coctum	Emplastrum cerussae.
Emplastrum cephalicum	Emplastrum opiatum.
Emplastrum Cicutæ	Emplastrum Conii.
Emplastrum Diachylon compositum	Emplastrum Lithargyri compositum.
Emplastrum Diachylon simplex	Emplastrum Lithargyri simplex.
Emplastrum mercuriale	Emplastrum Hydrargyri.
Emplastrum nigrum sulphuratum	Emplastrum sulphuratum.
Emplastrum resolvens	Emplastrum foetidum.
Emplastrum Spermatis Ceti	Ceratum Cetacei.
Emplastrum stomachicum	Emplastrum aromaticum.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Emplastrum vesicatorium ordinarium	Emplastrum Cantharidum ordinarium.
Emplastrum vesicatorium perpetuum	Emplastrum Cantharidum perpetuum.
Essentia Lignorum	Tinctura Pini composita.
Essentiae	Tincturae.
Extractum catholicum	Extractum Rhei compositum.
Extractum Martis cum Succo pomorum	Extractum Ferri pomatum.
Extractum Panchymagogum	Extractum Rhei compositum.
Extractum Saturni	Acetum saturninum.
Flores Benzoës	Acidum benzoicum.
Flores Salis ammoniaci martiales	Ammonium muriaticum martiatum.
Flores Sulphuris	Sulphur depuratum.
Flores Zinci	Zincum oxydatum album.
Fructus Tamarindorum	Tamarindi.
Globuli martiales	Globuli Tartari martiati.
Gummi Ammoniacum	Ammoniacum.
Gummi Arabicum	Gummi Mimosae.
Gummi Gambiense	Kino.
Gummi Guajaci	Resina Guajaci nativa.
Gummi Guttae	Gutti.
Hepar Antimonii	Kali sulphuratum stibiatum.
Hepar Sulphuris calcareum	Calcarea sulphurata.
Hepar Sulphuris salinum	Kali sulphuratum.
Hepar Sulphuris volatile	Liquor Ammonii sulphurati.
Julapium e Camphora	Mixtura camphorata.
Kermes minerale	Sulphur stibiatum rubrum.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Lac Sulphuris	Sulphur praecipitatum.
Lapis causticus	Kali causticum fusum.
Lapis divinus	Cuprum aluminatum.
Lapis infernalis	Argentum nitricum fusum.
Laudanum liquidum Sydenhami	Tinctura Opii crocata.
Limatura Martis praeparata	Ferrum pulveratum.
Limatura Stanni	Stannum limatum s. pulveratum.
Linimentum volatile	Linimentum ammoniatum.
Liquor anodynus mineralis	Spiritus sulphurico-aethereus.
Liquor anodynus martialis	Spiritus sulphurico-aethereus martiatus.
Liquor anodynus vegetabilis	Spiritus acetico-aethereus.
Liquor Cornu Cervi succinatus	Liquor Ammonii succinici.
Liquor probatorius Hahnemanni	Aqua sulphurato-acidula.
Liquor Terrae foliae Tartari	Liquor Kali acetici.
Lixivium causticum	Liquor Kali caustici.
Magisterium Bismuthi	Bismuthum nitricum praecipitatum.
Magnesia Salis amari	Magnesia carbonica.
Magnesia vitriariorum s. nigra	Manganum oxydatum nativum.
Marcasita	Bismuthum.
Mellago	Extractum liquidum.
Mercurius acetatus	Hydrargyrum aceticum.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Mercurius alcalisatus . . .	Hydrargyrum alcalisatum.
Mercurius dulcis	Hydrargyrum muriaticum mite.
Mercurius nitrosus	Hydrargyrum nitricum, Li- quor Hydrargyri nitrici.
Mercurius phosphoratus . .	Hydrargyrum phosphori- cum.
Mercurius praecipitatus al- bus.	Hydrargyrum ammoniato- muriaticum.
Mercurius praecipitatus ru- ber	Hydrargyrum oxydatum ru- brum.
Mercurius solubilis	Hydrargyrum oxydatum ni- grum.
Mercurius sublimatus . . .	Hydrargyrum muriaticum corrosivum.
Mercurius tartarisatus . . .	Hydrargyrum tartarisatum.
Mercurius vivus	Hydrargyrum.
Mixtura simplex	Mixtura pyro-tartarica.
Naphtha aceti	Aether aceticus.
Naphtha nitri	Aether nitricus.
Naphtha vitrioli	Aether sulphuricus.
Nitrum	Kali nitricum.
Nitrum cubicum	Natrum nitricum.
Olea cocta	Olea infusa.
Oleum animale Dippelii . .	Oleum animale aethereum.
Oleum Cornu Cervi foetidum	Oleum animale foetidum.
Oleum Myrrhae per deli- quium	Liquor Myrrhae.
Oleum Petrae	Petroleum.
Oleum Tartari per deli- quium	Liquor Kali carbonici.

alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Oleum Vitrioli	Acidum sulphuricum concentratum.
Pilulae purgantes	Pilulae e Resina Jalappae.
Piper hispanicum	Fructus Capsici annui.
Pulvis Doweri	Pulvis Ipecacuanhae opiatus.
Pulvis pectoralis	Pulvis Liquiritiae compositus.
Pulvis resolvens simplex	Pulvis stibiatus.
Regulus Antimonii	Stibium purum.
Resina communis	Resina Pini.
Roob	Succus inspissatus.
Saccharum Saturni	Plumbum aceticum.
Sal Absinthii	Kali carbonicum.
Sal Absinthii citratum	Kali citratum.
Sal Acetosellae	Oxalium.
Sal amarum	Magnesia sulphurica.
Sal ammoniacum	Ammonium muriaticum.
Sal ammoniacum fixum	Calcaria muriatica.
Sal culinare	Natrum muriaticum.
Sal digestivum	Kali muriaticum.
Sal mirabile Glauberi	Natrum sulphuricum crystallisatum.
Sal Seignette	Tartarus natronatus.
Sal Sodae	Natrum carbonicum.
Sal Succini	Acidum succinicum.
Sal sedativum	Acidum boracicum.
Sal Tartari	Kali carbonicum.
Sal Tartari essentielle	Acidum tartaricum.
Sal volatile Cornu Cervi	Ammonium carbonicum pyro-oleosum.
Sal volatile Salis ammoniaci	Ammonium carbonicum.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Sapo antimonialis	Sapo stibiatus.
Soda	Natrum carbonicum crudum.
Soda phosphorata	Natrum phosphoricum.
Spathum ponderosum . . .	Raryta sulphurica nativa.
Species pro Cucuphis . . .	Species aromaticae.
Species Diatragacanthae . .	Pulvis gummosus.
Species pro Femo	Species ad suffiendum.
Sperma Ceti	Cetaceum.
Spiritus Cornu Cervi . . .	Liquor Ammonii pyro- oleosi.
Spiritus matricalis	Spiritus Mastichés compo- situs.
Spiritus Mindereri	Liquor Ammonii acetici.
Spiritus Nitri acidus	Acidum nitricum.
Spiritus Nitri dulcis	Spiritus nitrico-aethereus.
Spiritus Salis acidus	Acidum muriaticum.
Spiritus Salis ammoniaci anisatus.	Liquor Ammonii anisatus.
Spiritus Salis ammoniaci aquosus	Liquor Ammonii carbonici aquosus.
Spiritus Salis ammoniaci cum Calce	Liquor Ammonii caustici.
Spiritus Salis ammoniaci vinosus	Liquor Ammonii vinosus.
Spiritus Salis dulcis	Spiritus muriatico-aethereus.
Spiritus Tartari	Liquor pyro-tartaricus.
Spiritus theriacalis	Spiritus Angelicae compo- situs.
Spiritus Vitrioli acidus . . .	Acidum sulphuricum dilu- tum.
Spongiae ustae	Carbo Spongiae.

Alte Benennungen.

Neue Benennungen.

Sulphur Antimonii auratum	Sulphur stibiatum aurantia- cum.
Sulphur Antimonii liquidum	Liquor Saponis stibiati.
Syrupus Acetositis Citri .	Syrupus Succī Citri.
Syrupus Diacodion	Syrupus opiatus.
Syrupus emulsivus	Syrupus Amygdalarum.
Syrupus Papaveris rhoeados	Syrupus Rhoeados.
Tartarus chalybeatus . . .	Tartarus ferratus.
Tartarus emeticus	Tartarus stibialis.
Tartarus mercurialis	Hydrargyrum tartaricum.
Tartarus solubilis	Tartarus ammoniatus.
Tartarus tartarisatus . . .	Kali tartaricum.
Tartarus vitriolatus	Kali sulphuricum.
Terebinthina veneta . . .	Terebinthina laricina.
Terra foliata Tartari . . .	Kali aceticum.
Terra foliata Tartari cry- stallisata	Natrum aceticum.
Terra Japonica	Catechu.
Terra ponderosa salita . .	Baryta muriatica.
Theriaca Andromachi . . .	Electuarium Theriaca.
Tinctura Antimonii acris .	Tinctura kalina.
Tinctura Antimonii Jacobi .	Liquor Saponis stibiati.
Tinctura Guajaci volatilis .	Tinctura Guajaci ammo- niata.
Tinctura Lignorum	Tinctura Pini composita.
Tinctura Martis sum Succo pomorum	Tinctura ferri pomata.
Tinctura Martis salita . .	Tinctura ferri muriatici.
Tinctura salis Tartari . .	Tinctura kalina.
Tinctura Thebaica	Tinctura Opii simplex.
Tinctura Succini balsamica	Tinctura Succini aetherea.

	Pag.
Argentum nitricum fu-	
sum	534
Argilla	278
Arsenicum	342
Asa dulcis	220
— foetida	222
Asphaltum	218
Astragalus	96
Aurum	346
Axungia porc.	62

B.

Baccae berberis	74
— fragariae	74
— grossulariae	76
— juniperi	156
— mori	74
— myrtillorum	74
— ribium rubi	76
— rubi idaei	74
Balneum animale	388
Balsamum canadense	220
— copaivae	218
— indicum	218
— Mecca	218
— peruvianum	218
Baryta	278
— muriatica	300
Becoabunga	90
Benzoes	220
Beta rubra	86
Bismuthum	336
Bitumen judaicum	218
Borax	296
Bovista	136
Butyrum antimon.. . . .	330
— insulsum	62

C.

Cacao	60
Calcaria	28
— citrica	284
— muriatica	302
— sulphurata	282
— sulphurato - sti-	
biata	282
— usta	280
Calomelas	322
Calx	280
— antimonii cum sul-	
phure	282
— usta	280
Camphora	190
Canella alba	198
Cantharides	160
Carbo	304
Cardamomum	200
Caricae	84
Caryophylli	198
Castoreum	192
Catechu	132
Cera alba	62
— flava	62
Cerasa acida	80
Cerussa alba	340
Cetaceum	62
Cichorium	98
Cinnabaris	320
Colla piscium	52
Colocynthis	166
Colophonium	216
Conchae	284
Cornu cervi	52
Cortex angustur e	110

	Pag.
Cortex aurantiorum . . .	112
— canellae . . .	198
— cascarillae . . .	110
— cassiae . . .	196
— chinae flavus . . .	116
— — fuscus . . .	118
— — ruber . . .	118
— cinnamomi . . .	196
— fraxini . . .	114
— geoffreae . . .	174
— granatorum . . .	150
— hippocastani . . .	114
— Mezerei . . .	154
— nucum juglandis . . .	130
— pruni padi . . .	250
— quercus . . .	128
— salicis . . .	114
— simarubae . . .	114
— ulmi . . .	124
— Winteranus . . .	198
Cremor tartari . . .	290
Crocus . . .	242
— martis aperitivus . . .	310
— metallorum . . .	323
Cubebae . . .	84
Cucumeres . . .	82
Cuprum . . .	336
— ammoniacale . . .	336
— sulphuricum . . .	336

D.

Datura stramonii . . .	234
Daucus carotta . . .	72
— Digitalis purpurea . . .	248

E.

Electricitas . . .	382
--------------------	-----

	Pag.
Elixir acidum Halleri . . .	256
Emplastrum adhaesivum . . .	52
Woodstock . . .	52

F.

Faba coffea . . .	203
— pichurim . . .	200
Fel. tauri . . .	104
Ferrum . . .	310
— muriaticum . . .	312
— oxydatum fuscum . . .	310
— oxydulatum nigrum . . .	310
— pulveratum . . .	310
— sulphuricum . . .	312
— tartarisatum . . .	312
Flores anagallidis . . .	154
— arnicae . . .	140
— benzoës . . .	264
— chamomillae . . .	208
— lavendulae . . .	206
— malvae . . .	338
— meliloti . . .	1
— millefolii . . .	104
— rosarum F. . .	126
— sambuci . . .	210
— sulphuris . . .	306
— tanaceti . . .	106
— verbasci . . .	38
— violarum . . .	176
— zinci . . .	334

Folia rumecis acetosae . . .	90
— aurantii . . .	112
— brassicae . . .	88
— lauro-cerasi . . .	250
— nicotianae . . .	236
— polygalae amar. . .	140

	Pag.
Herba ledi palustris . . .	244
— linariae	38
— malvae	38
— mari veri	206
— marubii	108
— melissae	204
— menthae crisp.	204
— — piperit.	204
— millefolii	104
— nicotianae	236
— petroselini	90
— potentillae	128
— pulsatillae nigric.	248
— roris marini	206
— sabinae	160
— salviae	124
— scordii	108
— sedi minoris	150
— stramonii	234
— tanacetii	106
— taraxaci	93
— thymi	204
— trifolii aquat.	100
— uvae ursi	126
— verbasci	38
— verbenae	164
— veronicae	103
— violae tricolor.	164
— vitalbae	152
Hydrargyrum	314
— aceticum	324
— alcalisatum	316
— gummosum	316
— muriaticum	320
— corrosivum	320
— muriaticum	320
— mite	322

	Pag.
Hydrargyrum muriaticum	320
— praecipitat.	324
— nitricum	322
— oxydat. rubr.	326
— oxydulatum	316
— nigrum	316
— purum	318
— saccharatum	318
— stibiato-sulphuratum	318
— sulphuratum	318
— nigrum	318
— sulphuratum	318
— rubr. oxydatum	320
— sulphuric. flavum	322

Humulus lupulus	108
---------------------------	-----

I.

Ichthyocolla	52
Ignatia amara	242
Juglans regia	32
Juniperus commun.	156
— sabinae	160

K.

Kali aceticum	286
— carbonicum	270
— citratum	284
— nitricum	288
— sulphuricum	294
— tartaricum	290
Kermes minerale	330
Kino	132

L.

Lac	30
---------------	----

	Pag.
Lac sulphuris	306
Lapides cancerorum	284
Lapis infernalis	334
Lichen islandicus	54
Lignum campechian.	130
— guajaci	226
— quassiae	102
— sassafras	196
— santali	136
Limaces	56
Limatura cupri	336
— martis	310
— stanni	344
Linimentum ammoniat.	268
— camphorat.	263
— saponato-camphorat.	270
Liquor ammonii acetici	288
— — anisati	212
— — carbon. aquo- sus	178
— — caustici	180
— — pyro-oleosi	180
— — succinici	180
— — vinosus	178
— anodynus Hoffm.	184
— cornu cervi succinat.	218
— hydrargyri muriati- ci corrosivi	326
— — nitrici	324
— kali acetici	286
— — carbonici	270
— — caustici	270
— saponis stibiati	330
— stibii muriatici	330
Lumen	382
Lux	382
Lythargyrum	338

M.

	Pag.
Macis	198
Magnesia carbonica	276
— sulphurica	296
— usta	276
Magnetismus	386
Malthum hordei	46
Malum citri	76
— sinicum	78
Manganesium	344
— sinicum	78
Manna	84
Marcasitum	336
Marubium	108
Mastiche	220
Mel	72
Melo	82
Meloe majalis scarabaeus	162
Mercurius acetatus	324
— dulcis	322
— nitrosus	324
— praecipitatus albus	324
— — ruber	326
— solubilis Hahn.	316
— sublimatus	320
— vivus	314
Millepedae	162
Minium	338
Mixtura sulphurico-acida	256
— vulneraria acida	256
Moschus	192
Myrrhae	224

N.

Naphtha aceti	182
— salis	186

	Pag.
Naphtha vitrioli	184
Nasturtium aquaticum	90
Natrum aceticum	286
— muriaticum	298
— phosphoricum	286
— sulphuricum	294
Nihilum album	334
Nitrum	288
Nuces juglandis	32
— moschatae	198
— vomicae	240

O.

Oleum amygdalarum dul-	
cium	64
— animale Dippelii	182
— cajaput	204
— lini	64
— nucum jugl.	68
— olivarum	66
— ovorum	56
— papaveris	66
— petrae	216
— ricini	68
— vitrioli	254
Olibanum	220
Opium	230
Ova gallinacea	56
Oxymel aeruginis	336
— squilliticum	156

P.

Pastinaca	88
Petroleum	216
Petroselinum	90
Phosphorus	194
Pinus	214

	Pag.
Piper	148
— hispanicum	148
Plumbum	338
— aceticum	338
— carbonicum	340
— oxydatum	338
— rubrum	338
Poma acidula	80
— aurantiorum	78
— citri	76
Potio Riveri	285
Prunus	82
Pulpa colocynth.	166
— prunorum	82
— tamarindorum	84
Pulsatilla nigricans	248
Pulvis Doweri	232
— opiatue	230

Q.

Quassia	102
Quercus	128

R.

Radix althaeae	36
— allii	158
— angelicae	146
— ari	144
— armoraciae	150
— arnicae	140
— asari	176
— bardanae	94
— belladonnae	228
— bistortae	128
— bryoniae	174
— calami	112
— caryophyllatae	110

	Pag.		Pag.
Radix cepae	164	Radix valerianae	202
— chinae	94	— violae	176
— cichorii	98	— zedoariae	200
— columbo	102	— zingiberis	146
— consolidae major.	122	Regulus antimonii	326
— contrajervae	202	Resina communis	214
— dauci	72	— guajaci	226
— filicis maris	212	— pini	214
— gentianae	102	Rex metallorum	346
— graminis	92	Rhus toxicodendron	250
— gratiulae	168	Roob dauci	72
— helenii	146	— juniperi	156
— hellebori	172	— sambuci	210
— hirundinariae	162	Rosa centifolia	126
— jalappae	168		
— inulae	146	S.	
— ipecacuanhae	176	Saccharum	70
— iridis florent.	150	— lactis	30
— lapathi acuti	96	— saturni	338
— levistici	144	Sago	40
— liquiritiae	94	Sal absynthii citratum	284
— pimpinellae	144	— amarum	296
— polygallae am.	140	— ammoniacum depur.	300
— pyrethri	122	— anglicum	296
— raphani rust.	150	— culinare	298
— rhei	166	— essentielle tartari	260
— rubiae	126	— mirabile Glauberi	294
— salep.	40	— seignette	292
— saponariae	92	— succini	266
— sarsaparillae	92	— volatile cornu cervi	180
— scillae	156	Sanguis draconis	132
— senegae	138	Sapo	272
— serpentariae	202	— domesticus	272
— solani tuber.	46	— guacinus	272
— spigeliai	176	— hispanicus	272
— taraxaci	98	— jalappinus	272
— tormentillae	128	— medicatus	272

	Pag.
Sapo stibiatus	272
— terebinthinatus	274
Scammonium	174
Scarabaeus majalis	162
Semen anisi	212
— avenae	42
— cannabisi	34
— carvi	206
— cinae	212
— coriandri	200
— cydoniorum	36
— fabae	48
— fagopyri	42
— foeniculi	210
— hordei	46
— hyoscyami	234
— lini	64
— mais	42
— oryzae	42
— papaveris	32
— phellandrii aq.	142
— sabadillae	152
— santonici	212
— secalis	44
— sinapios	158
— stramonii	234
— tritici	44
Sol	346
Solanum tuberosum	46
Sperma ceti	62
Spiritus camphoratus	190
— cornu cervi rect.	180
— Mindereri	288
— nitri acidus	258
— — fumans	258
— nitrico-aethereus	184

	Pag.
Spiritus salis ammoniaci	178
— — anisatus	180
— — ammoniaci aquo-	
sus	178
— — ammoniaci cum	
calce	178
— — ammoniaci vi-	
nosus	178
— sulphur. aethereus	184
— — — martialis	314
— vini	188
— — Gallicus	188
Spongia marina	274
— usta	274
Stannum	344
Stibium	326
— oxydatum album	328
— oxydulatum fuscum	328
— purum	326
— sulphuratum suran-	
tiacum	328
— — nigrum	328
Stipites dulcamarae	238
— millefolii	104
Strobili lupuli	108
Storax	220
Sublimat	320
Succinum	216
Succus citri	76
— gastricus	58
Sulphur	306
— antimonii liquidum	
aurat.	328
— depuratum	306
— praecipitatum	306
— stibiatum aurant.	328
— — rubrum	330

Summitates arnicae . . .	Pag. 140
— millefolii . . .	104
Syrupus . . .	70

T.

Tamarindi . . .	84
Tanacetum . . .	106
Taraxacum . . .	98
Tartarus ammoniatus . . .	292
— boraxatus . . .	292
— depuratus . . .	290
— emeticus . . .	332
— natronatus . . .	292
— solubilis ammoniat. . .	292
— stibiatus . . .	332
— tartarisatus . . .	290
— vitriolatus . . .	294
Terebinthina . . .	214
Taxus . . .	240
Terra foliata tart. . .	286
— — — crystallis. . .	286
— ponderosa salita . . .	278
Testae concharum . . .	56
Thymus vulgaris . . .	204
Turiones asparagi . . .	88
— humuli . . .	108

Turpetum minerale . . .	Pag. 322
Tussilago farfara . . .	90
Tutia . . .	334

U.

Uvae vini . . .	76
-----------------	----

V.

Vanilla . . .	198
Veronica . . .	108
Vinum . . .	186
— martiatum . . .	314
— stibiatum . . .	332
Viride aeris . . .	336
Vitriolum album . . .	334
— martis . . .	312
— zinci . . .	334

W.

Wismuthum . . .	336
-----------------	-----

Z.

Zincum . . .	334
— oxydatum . . .	334
— sulphuricum . . .	334

B e r i c h t i g u n g e n .

- Seite 56 bei Ova Gallinacea fehlt der system. Name: Phasianus gallus (das Huhn.)
- 74 u. 75 bei Baccae Rubi Idaei fehlt in der Anmerkung: XII. Cl. V. Ordn.
 - 84 — 85 bei Cubebae fehlt in der Anmerkung: II. Cl. III. Ordn.
 - 94 bei Radix Bardanae statt Kettenwurzel, Klettenwurzel.
 - 96 u. 97 und 124 — 125 bei Radix Lapathi acuti fehlt in der Anmerkung: VI. Cl. III. Ordn.
 - 102 — 103 bei Herba Cardui benedicti fehlt in der Anmerkung: XIX. Cl. III. Ordn.
 - 118 — 119 bei Cortex Chinae unter system. Name statt Cinchona oblongifolia Mulis, Mutis. und bei den Präparaten daselbst fehlt: 10) Extractum Chinae aquosum.
 - 126 — 127 bei Flores rosarum unter Präparate statt Unguentum Rosarum, Unguent. rosatum. und unter Präparate fehlt: 7) Tinctura Rosarum acidula.
 - 131 bei Gummi s. Resina Laccae fehlt in der Anmerkung: XXIII. Cl. II. Ordn.
 - 140 — Flores Arnicae unter Präparate fehlt: 2) Tinctura Arnicae und daselbst statt Extractum arnicae, Extractum Arnicae.
 - 144 — Radix Ligustici unter Präparate fehlt: 1) Extractum Levistici.
 - 152 u. 153 bei Semen Sabadillae in der Anmerk. fehlt: XXIII. Cl. I. Ordn.

Seite 156 bei *Bacca Juniperi* unter Präp. ad 2) statt: *Aquae*
Aqua.

— 176 bei *Radix Violae adoratae* unter Präparate statt: *Syrupus Violae, Syrupus Violarum.*

— 190 bei *Camphora* unter Präparate fehlt: 6) *Mixtura camphorata s. Iulep e Camphora.*

— 234 statt *Herba Hyoscyamus, Herba Hyoscyami.*

— 245 steht 145.

— 252 bei *Amygdalae amarae* unter Präparate fehlt: 2) *Aqua Amygdalarum amararum concentrata.*

— 318 bei *Hydrargyrum* unter Präparate statt: *Unguentum hydrargyrum, e, Unguent. hydrargyri.*



Fourright of Lime



